



# Tsefalen

## 1000

## 500

## 4 добри причини да изберете TSEFALEN

1. Цефалексинът е свързан с по – малък риск от развитие на резистентност!
2. Идеален, не само за дерматологични инфекции, но и за лечение на инфекции на респираторна, урогенитална и костно-ставна система.
3. Липсата на овкусяващи съставки, предотвратява появата на непоносимост и/или алергични реакции.
4. По-ефективен.\*



Reserved for Veterinarians and Pharmacists

\*\*\*Usage of cephalaxin in the treatment of canine pyoderma: comparison of the efficacy at different dosage\*\*

E. Guaguere, C. Salomon, L. Maynard Prat Med Chir Anim Comp 1998, 33:237-246.

"A multicenter, controlled, randomized study, was conducted on 165 dogs to demonstrate the effectiveness of cephalaxin in the treatment of canine pyoderma. [...] The clinical results show a statistically significant ( $p < 0.05$ ) of cephalaxin (93% clinical cure) compared to amoxicillin - clavulanic acid (76% recovery) in the superficial pyoderma. [...] The study shows effectiveness of cephalaxin in vivo greater than efficacy in vitro.

## Tsefalen 500 mg - Tsefalen 1000 mg филмирани таблетки за кучета

Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg / 1000 mg cefalexin (под формата на cefalexin monohydrate). Оранжеви, продълговати филмирани таблетки с разделителна черта от едната страна. Гравирани с 'GP4' /500 mg/ , 'U60' /1000 mg/ от другата страна. Таблетките могат да бъдат разделени на две равни половини.

### Индикации

Цефалексинът има широкоспектърно действие и бактерициден ефект:

- Инхибитор на синтеза на бактериалната клетъчна стена при Gram+/Gram- микроорганизми;
- Активен също срещу пеницилиназа–продуциращи Стафилококи;

За лечение на:

- Кожни инфекции (рани, порязвания, ухапвания);
- Суперфициална и дълбока пиодермия;
- Урогенитални инфекции;
- Инфекции на респираторната система (ринит, бронхит, трахеит, пневмония);
- Локализирани инфекции на меките тъкани;
- Костно – ставни инфекции;
- Стомашно – чревни инфекции;

### Дозировка

Перорална употреба. Препоръчаната доза е 15 mg цефалоспорин на kg телесна маса 2 пъти дневно. При сериозни или остри състояния дозата може да се увеличи двукратно на 30 mg/kg два пъти дневно.

### Указания за употреба:

#### Tsefalen 500 mg таблетки

15-25 kg телесна маса	½ таблетка два пъти дневно
26-50 kg телесна маса	1 таблетка два пъти дневно

#### Tsefalen 1000 mg таблетки

26-50 kg телесна маса	½ таблетка 2 пъти дневно
-----------------------	--------------------------

### Продуктът трябва да се прилага най – малко 5 дни.

- 14 дни в случай на инфекции на пикочната система;
- Най – малко 15 дни в случай на суперфициален инфекциозен дерматит;
- Най – малко 28 дни в случай на дълбок инфекциозен дерматит;

За гарантиране на правилно дозиране на продукта, телесната маса трябва да се определи възможно най – точно за избягване на по – ниски дози.

Таблетките могат да се прилагат цели, или стрити и добавени към храната.

### Опаковка:

Tsefalen 500 mg – блистер от 12 таблетки

Tsefalen 1000 mg – блистер от 8 таблетки.



**VET-TRADE**

Distribution of veterinary pharmaceuticals & animal nutrition

Stara Zagora  
+ 359 42 636 858  
e-mail: info@my-vet-trade.com

ICF srl - Via G.B. Benzoni, 50  
Palazzo Pignano (CR) - 26020, Italy  
Tel. +39.0373.982024  
Fax +39.0373.982025

