

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата: Віоveta, а.s., Комельке о 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic. Tel. 00420 517 318 500 Fax 00420 517 318 319 e-mail — comm@bioveta.cz

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ CLOTEAN — inj. ad us. vet.

Серум против тетанус.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТА

1 ml съдържа:

Активна субстанция:

Нативен конски имунен серум против тетанус – мин. 300 IU/mi

Ексципиент:

Фенол - макс. 0.5%

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За пасивна имунизация на животните при операции, наранявания и др. Продуктът може да се използва с терапевтична цел при начало на тетанус.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Слаб едем, който изчезва спонтанно в течение на 3 дни, може да се наблюдава на мястото на приложение. Рядко, след повторно приложение, може да се прояви анафилактична реакция. Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Коне, говеда, овце, кози, свине, кучета,

коне, говеда, овце, кози, свине, кучета котки и ако е необходимо други засегнати видове животни.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН (И) НА ПРИЛАГАНЕ

Приложение: Подкожно, интрамускулно и интравенозно. Дозировка:

Профилактично

големи животни 4 000 – 6 000 IU (13 – 20 ml);
 малки животни 2 000 – 3 000 IU (7 – 10 ml).

Терапевтично

големи животни 40 000 IU (140 ml);
 малки животни 20 000 IU (70 ml).

Терапевтичните дози се прилагат ежедневно в продължение на 2 – 4 дни и след това, в зависимост от здравословното състояние на тоетираното животно.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

По-големи обеми дози, трябва да се разделят и приложат на няколко места. Преди употреба съдържанието на флакона се разклаща. Продуктът трябва да се темперира до телесна температура на водна баня, непосредственно преди приложение.

10. KAPEHTEH CPOK 78 879 20 988 Hand

Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Да се съхранява в хладилник тем от тост мусе о (2 °C - 8 °C). Да се пази от светлина. Да се съхранява на сухо място. Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен на етикета

или външната опаковка. Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт:

2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 10 дни.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Няма. интрами ввосия

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО. АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА Юли 2015.

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Да се отпуска само по лекарско предписание

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба:

Република Българиявляем во вножелф вн Перодуктът трябва да се темп ДА МООЭЯП Бул. "Цариградско шосе" 73 София 1113, Р.О.В.38 оп онневторедостя Тел.+359 02 973 37 85 e-mail: lekoom@abv.bg

CLOTEAN - Inf.

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА YHOTPESA WHA IPPOMSBOUNTERN. AKO TE CA PABRINGHIA Притежател на лицеиза за употре

> Tel. 00420 517 318 500 Fax 00420 517 318 319 BETERNHAPHOWEDNIJNHOKKA

683 23 Ivanovice na Hané

Активна субстанции: Нативен констан имунен серум против

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ в пасиена имунизация на животните ри операции, наранявания и др. родуктыт може да се използва терапевтична цел при начало а тетанус.

HEBRALOGRAFIAN PEAKLINN лаб едем, който изчезва спонтанно течение на 3 дни, може да се аблюдава на мястото на приложение ядко, след повторно приложение,

POTABOTOGASAHIRS

винизитична нав