

# Duplocillin LA

## Инжекционна суспензия за кучета и котки

### 1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

The Netherlands

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Intervet Production S.r.l.

Via Nettunese Km 20, 300

04011 Aprilia

Italy

### 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Duplocillin LA

### 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

1 ml съдържа:

**Активни субстанции:**

150 000 IU ( $\pm$  150 mg) procaine benzylpenicillin

150 000 IU ( $\pm$  115 mg) benzathine benzylpenicillin

### 4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на инфекции, причинени от бактерии, чувствителни към пеницилин.

### 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към пеницилин.

Да не се използва при наличие на  $\beta$ -лактамаза продуциращи стафилококи.

### 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Понякога може да се наблюдават поява на алергична реакция.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

### 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки и кучета.

### 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Два пъти x 1 доза (1 ml/10 kg т.м), интрамускулно или подкожно приложение, с интервал от 72 часа.

### 9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

При повторно приложение да не се инжектира на същото място.

### 10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

### 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C).

Да се пази от светлина.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 8 седмици.

## 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да не се използва при животни алергични към пеницилин.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Хора с установена свръхчувствителност към пеницилин трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Бременност:

Може да се прилага по време на бременност.

Лактация:

Може да се прилага по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Може да се наблюдава антагонизъм между Duplocillin LA и някои бактериостатични средства. Може да се появят бактерии с кръстосана резистентност към други  $\beta$ -лактами антибиотици. Наблюдаван е синергизъм с други бактерицидни продукти.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани други неблагоприятни реакции, освен описаните в т. 6.

Несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

## 13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

## 14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

07/2016

## 15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба:

Интервет България ЕООД

ул. Искърско шосе 7, гр. София

България