

INTRACOX Oral - разтвор за перорално приложение

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА:

Interchemie werken "DeAdelaar" BV,
Metaalweg 8, 5804 CGVenray, TheNetherlands
Тел.: + 31 402070 367, Факс:+ 31 402070 541
Електронна поща: registration@interchemie.com

ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА:

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS
Vanaperetee 14, Pringi, ViimsiParish, HarjuCountry 74001, Estonia
Тел.: + 372-6005006
Електронна поща: factory@interchemie.com

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

Toltrazuril 25.0 mg/ml

Ексципиенти:

Monoethanolamine
Propylene glycol

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение и профилактика на кокцидиоза при кокошки и пуйки.

INTRACOX Oral е ефективен срещу *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. mitis*, *E.adenoides*, *E. meleagridis*, *E.meleagrimitis*.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.

Да не се използва при животни с нарушени чернодробни и бъбречни функции.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кокошки и пуйки.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Разтвор за перорално приложение с питейната вода.

Препоръчителната доза е 7 mg толтразурил/kg телесна маса или 28 ml INTRACOX Oral / 100 kg телесна маса дневно.

При необходимост от определяне на точното количество, което трябва да бъде приложено, при липса на правилно съотношение между дневната консумация на вода и телесната маса на птиците, препоръчителната доза е 500 – 1500 ml INTRACOX Oral на 500 L вода, като единствен източник на водазапиене, 2 последователни дни.

По тази причина е препоръчително да се изчисли теглото на групата птици, които ще бъдат третирани и след това да се определи количеството INTRACOX Oral, което ще бъде приложено във водата, така че да се достигне обща терапевтична доза от 7 mg/kg телесна маса.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Няма.

КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи:

Кокошки - 18 дни.

Пуйки - 21 дни.

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява при температура между 15 °C и 25 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след разтваряне или разреждане, съгласно указанията: 24 часа.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Трябва да се избягва директния контакт на продукта с кожата, поради възможността от възникване на реакции на свръхчувствителност.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от синтетични гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

При попадене на продукта върху кожата или очите, незабавно да се измие с вода.

Да се измият ръцете или изложения участък след работа с продукта.

Яйценосене:

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни.

Не е препоръчително смесването на INTRACOX Oral с други продукти.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

В дози, надвишаващи до 30 пъти препоръчаните, телесната маса и дневната консумация на храна се увеличават значително, като единствено се проявява слаб ефект по отношение на кръвните параметри и чернодробна дисфункция.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

11/03/2014

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

“Синхроген Фарма” ООД, Бул. Христофор Колумб 43, 1592 София

Телефон: + 359 2 9651 557, Факс: + 359 2 9651 648