

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
НОВОКАИН 1% разтвор за инжекции
NOVOCAIN 1% solutio pro injectionibus
За всички животни

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител:

ВЕТПРОМ АД, България, гр.Радомир, ул. Отец Паисий №26

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

НОВОКАИН 1% разтвор за инжекции/ NOVOCAIN 1% solutio pro injectionibus

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В 1 ml лекарствен продукт се съдържат като активно вещество 0.01 g Procaine Hydrochloride и като помощни вещества Hydrochloric Acid, Water for Injections.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За предизвикване на инфилтрационна, проводна и гръбначномозъчна анестезия; анестезия на органите в гръдната кухина; при кожни заболявания /за намаляване на болката и сърбежа/; при мастити при кравите; за разтваряне на антибиотици.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към прокаин /прави се предварителна проба/.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Идиосинкразия, колапсни състояния, кожни реакции и др

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

За всички животни.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Доза

За проводна /регионална/ анестезия – 1%-ов разтвор /комбиниран с адреналинов хидрохлорид/ - при дребни преживни, свине, зайци, птици – 1 ml 1%/kg.m; за гръбначномозъчна анестезия /без адреналин/ - вкарва се в гръбначния канал 1%-ов разтвор. За лумбална /субарахноидална/ анестезия – при едри животни – 1-3 ml; при кучета – 1ml, при сакрална /епидурална, висока сакрална/ анестезия – при едри животни – 20-40 ml; при каудална /ниска сакрална/ анестезия – при едри животни – 5-10 ml; за интраартериално прилагане /при възпаления, локализирани в крайниците/ - за коне по 0.1-0.15 ml 1%/kg.m; за епиплеврално вкарване /анестезиране на органите в гръдната кухина/ - по 0.25 ml/kg.m от 1%; за мускулно прилагане /при възпалителни заболявания/ - за едри животни – 40 ml от 1%-ов разтвор.

Начин на приложение:

Парентерално.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте НОВОКАИН 1% разтвор за инжекции точно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху етикета!

КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява при температура под $<25^{\circ}\text{C}$, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Срок на годност след първо отваряне на опаковката- 28 дни, съхранение при хладилни условия при температура $+2$ до $+8^{\circ}\text{C}$.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Няма.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Февруари 2010 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ>

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба:

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" № 26,

тел.: 0777/8-24-93, 8-00-19; факс: 0777/8-23-91,

E-mail: vetprom@abv.bg