



ତୁମେ ତୁମ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛ କି ?

ତୁମର ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
ଦୟାକରି ପଚାରନ୍ତୁ !




ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା

- ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ।
- ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବଟିକା ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ନିମନ୍ତେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନୂତନ ପ୍ୟାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଦାଗ ପରି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ । ମାସିକ ରତ୍ନସ୍ରାବ ସମୟରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ମାସ ପରେ ଏହା ନିୟମିତ ହୋଇଥାଏ ।
- କିଛି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେତେ ଗୋଳମାଳ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ପରେ ଏହା କମି ଯାଇଥାଏ ।
- ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ । ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଖୁବ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
- ଯେ କୌଣସି ବୟସରେ କିମ୍ବାମହିଳାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାଆନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।
- ଏହା ରତ୍ନସ୍ରାବ ଜନିତ ଯେଟବ୍ୟଥା, ଅଧିକ ସ୍ରାବ, ରକ୍ତହୀନତା (ରକ୍ତରେ ଲୌହସାର କମିବା) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।



ମହିଳା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ

- ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି: ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁ ନ ଥିବେ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯତ୍ନ ସହ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ।
- ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ (ମାତ୍ର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ) ।
- ଏଥିରେ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ, ସାଧାରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆଦି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୂତ । ମହିଳା କାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି । ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅବରୋଧ କରିଦିଆଯାଏ ।
- ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବାର କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଟି ଫୁଲି ରହିବା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଖୁବ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
- କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହି ନ ଥାଏ । ଯୌନଗତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଭାବନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ ।
- ଏହା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।
- ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ମାସିକ ରତ୍ନସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିମ୍ବା ଏକ ମାସପରେ ଗର୍ଭ ପରୀକ୍ଷା ନେଗେଟିଭ ଆସିଥାଏ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ସାର୍ବିଫଳିକତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ।



ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ

- ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି । ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁ ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ସହ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ।
- ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ ନ କରିଛି, ପ୍ରଥମ ୩ ମାସ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ୩ ମାସ ପରେ ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ (ମାତ୍ର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ) ।
- ସୁରକ୍ଷିତ, ସାଧାରଣ, ସରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସଂପନ୍ନ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ଏହା ଦ୍ଵାରାଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲିବା ଆଦି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିରହିବ । କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ।
- ଏହା ଯୌନଗତ କ୍ଷମତା ବା ଭାବନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ ।



ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା

- ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସେବନ କଲେ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରେ ।
- ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ।
- ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ବା ସନ୍ତାନର କୌଣସି ହାନି କରିନଥାଏ ।
- ନିୟମିତ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । କୌଣସି ଏକ ନିୟମିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।



ଇଞ୍ଜେକ୍ସନସ୍ଥ ଗର୍ଭନିରୋଧକ

- ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ।
- ପ୍ରତି ୩ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଡିଏମ୍ପିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଏମ୍ପିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାତ୍ରା ନେବା ନିମନ୍ତେ ଅତିବେଶୀରେ ୪ ସପ୍ତାହଠୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
- କ୍ଲିନିକ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟରେ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।
- ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ଅନିୟମିତ ମାସିକ ରତ୍ନସ୍ରାବ ଏବଂ ଦାଗ ଲାଗିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଘଟିପାରେ । ବେଳେ ବେଳେ ମାସିକ ରତ୍ନସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଓଜନ ବଢିବା, ସାମାନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଯାହାକି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ।
- ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ । ଅନ୍ୟମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ, ଜଣେ ମହିଳା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ।
- ଯେ କୌଣସି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ତେବେ ମହିଳାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନ ଥାଆନ୍ତୁ ।
- ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଜଣେ ମହିଳା ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିବେ । ୩ ମାସର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ମାସ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ।
- ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ୬ ସପ୍ତାହ ପରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ।




ଏଲ୍ଏଏମ୍ (ଲାକ୍ଟୋସନାଲ ଆମେନୋରିଆ ପଦ୍ଧତି) ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ ରତ୍ନୋତ୍ତ ପଦ୍ଧତି

- ଏହି ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମର ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
- ଜଣେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳା ଲାକ୍ଟୋସନାଲ ଆମେନୋରିଆ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ,
 - ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେବଳ ମା' କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ତଥା ରାତି ଓ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବେ, ଏବଂ
 - ମାସିକ ରତ୍ନସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବ ଏବଂ
 - ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ମାତ୍ର ୬ ମାସରୁ କମ୍ ବୟସର ହୋଇଥିବ
- ଲାକ୍ଟୋସନାଲ ଆମେନୋରିଆ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ୍ ।



ପ୍ରୋଜେକ୍ସିନ- କେବଳ ବଟିକା ଗର୍ଭନିରୋଧକ

- ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମର ୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ।
- ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଅବିଳମ୍ବେ ଏହା ପୁନଃପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ ।
- ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବଟିକା ନିଅନ୍ତୁ ।
- ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉନଥିଲେ, ଦାଗ ଲାଗିବା ଭଳି ଦେଖାଯିବା ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଅତି ସାଧାରଣ ଅଟେ । ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ।



ପ୍ରଜନନ ସତେଜନତା ପ୍ରଣାଳୀ

- ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ମାସିକ ଚକ୍ରର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ ବିଷୟରେ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ ।
- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଦମ୍ପତ୍ତି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ କଣ୍ଡୋମ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।
- ସଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ।
- ସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ।
- ଏହାର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ପାର୍ଶ୍ଵପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ ।
- ଏହି ଗର୍ଭନିରୋଧକ ପଦ୍ଧତି ଛୁଇଁ କିମ୍ବା ଯୌନଗତ ସଂକ୍ରମଣ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ କିମ୍ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଠିନ ହୋଇପାରେ ।



ଇଣ୍ଟ୍ରାୟୁଟେରାଇନ କଣ୍ଡୋମ୍ ସେପ୍ଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ (ଆଇୟୁସିଡି)

- ତମ୍ବା ରହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ନମନୀୟ ଯନ୍ତ୍ର (ଡିଭାଇସ୍) ଯାହାକୁ ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ।
- ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ । ତମ୍ବା ଟିସିୟୁ- ୩୮୦ଏ ଆୟୁସିଡି ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କପର ଆୟୁସିଡି ୩୬୫ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ।
- କପର (ତମ୍ବା) ଆୟୁସିଡିକୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇପାରିବେ ।
- ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ସମୟରେ କିଛିମାତ୍ରାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ । ପ୍ରଥମରୁ କପର (ତମ୍ବା) ଆୟୁସିଡି ଦ୍ଵାରା ମାସିକ ରତ୍ନସ୍ରାବ ସମୟରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
- ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଖୁବ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆୟୁସିଡି ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ଯୌନ ସଂଚାରିତ ସଂକ୍ରମଣ (ଏସ୍ଟିଆଇ) ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଯେଲ୍ଡିଫ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ।
- ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ସ୍ଵତଃ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିପାରେ ।
- ଆୟୁସିଡି ବାହାର କରାଯିବା ପରେ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିବେ ।



କଣ୍ଡୋମ୍

- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯଦି ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଗର୍ଭଧାରଣ ରୋକିବା ସହ ଏଡ଼ିଆଇଭି/ଏଡ୍ସ ଭଳି କେତେକ ଯୌନ ଜନିତସଂକ୍ରମଣରୁ (ଏସ୍ଟିଆଇ) ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ।
- ଯୌନ ସଂଚାରିତ ସଂକ୍ରମଣ /ଏଡ଼ିଆଇଭି ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ କେତେକ ଦମ୍ପତି କଣ୍ଡୋମ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।
- ସାମାନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ ।
- ପ୍ରତିଥର ସଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । କେବେ କେବେ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନ ଥାଏ, କାରଣ
- କେତେକଙ୍କ ମତରେ କଣ୍ଡୋମ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ସହଜ ଲାଗିନଥାଏ ବା ପରସ୍ପରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।



ହରମୋନ ବିହୀନ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ସେଣ୍ଟକ୍ଳୋମାନ (ଛାୟା)

- ସେଣ୍ଟକ୍ଳୋମାନ ହେଉଛି ବେଶ୍ ସୁରକ୍ଷିତ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ।
- ଏହା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ।
- ଏହା ଏକ ହରମୋନ ବିହୀନ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୋପତ ବିହୀନ ସାପ୍ତାହିକ ବଟିକା ।
- ପ୍ରଥମ ୩ ମାସ ନିମନ୍ତେ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବଟିକା ଏବଂ ପରେ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ସେବନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ପ୍ରଥମ ବଟିକା ରତ୍ନସ୍ରାବର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ବଟିକା ୩ ଦିନ ପରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୋହରାଇବା ଜରୁରୀ ।
- ୪ର୍ଥ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ, ବଟିକାର ସେବନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବଟିକା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏବଂ ପରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସାପ୍ତାହିକ ମାତ୍ରା ହିସାବରେ କାରି ରଖିବା ଜରୁରୀ ।
- କେତେକ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସିକ ରତ୍ନସ୍ରାବ ସମୟରେ ରକ୍ତସ୍ରାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ମାତ୍ର ତାହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ । ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ ।



Government of Odisha



United Nations Population Fund
India