



ନବଜାତ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ



- ୧ ଜନ୍ମପରେ ଶିଶୁକୁ ମା'ପେଟ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛିନି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ।
- ୨ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସଫା ସୂତା କପଡାରେ ମୁଣ୍ଡ, ମୁହଁ ଓ ପିଠି ଭଲଭାବରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ।
୧ ରୁ ୩ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ ପାଖରୁ ୨.୫ ସେ.ମି. ଛାଡି ନାହିଁନାତ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ କାଟନ୍ତୁ । ନାଭିରେ କିଛି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ୩ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା' କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ । ଶିଶୁକୁ ଓଜନ କରାନ୍ତୁ ଓ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ତାର ମୁଣ୍ଡ,ପାଦ,ହାତ ଓ ଶରୀର ଘୋଡାଇ ହୋଇ ରହିବ ।
- ୪ ଜନ୍ମପରେ ଶିଶୁଟି ନ କାନ୍ଦିଲେ,ଜନ୍ମପରେ ୨୪ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝାଡା ଓ ୪୮ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ରା ନହେଲେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରାନ୍ତୁ ।

୧



୨



୩



୪



କମ୍ ଓଜନ (୨.୫କେ.ଜିରୁ କମ୍) ଶିଶୁର ଯତ୍ନ



- ୧ କମ୍ ଓଜନ (୨.୫ କେ.ଜି ରୁ କମ୍) ଶିଶୁକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ୨ ଏଥିପାଇଁ ମା' ର ଦେହକୁ ଲଗାଇ ଶିଶୁକୁ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଜ୍ୱର, କାଶ, ଅଣ୍ଡା, ଚର୍ମରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିଶୁକୁ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ୩ ମା' କ୍ଷୀର ଖାଇପାରୁଥିଲେ, ଅନ୍ତତଃ ୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ୪ ମା' ଓ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନରେ ଭଲଭାବରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ।



ସ୍ତନ୍ୟପାନ



- ୧ ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରସବ ଗୃହରେ ଶିଶୁକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କଷକ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ୨ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରତି ୨ ଘଣ୍ଟାରେ ମା' କ୍ଷୀର ଏବଂ ରାତିରେ ଅନ୍ତତଃ ୩ଥର ପିଆନ୍ତୁ ।
- ୩ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମୟରେ ମା' ଶିଶୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରି ଖୁଆନ୍ତୁ । ଅଧିକ କ୍ଷୀର ହେବା ପାଇଁ ମା' ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପାଣି ପିଇବା ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦରକାର ।
- ୪ ଶିଶୁଟି ଦିନକୁ ୬-୮ଥର ପରିଶ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପରେ ୨-୩ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିଶୁର ଓଜନ ନିୟମିତ ବଢିଲେ ମା' କ୍ଷୀର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବ ।

୧



ପିଲା କ୍ଷୀର ନ'ଖାଇବା

୨



ପାଟି, ନାକ ଓ ମଳଦ୍ୱାରରୁ
ରକ୍ତ ବାହାରିବା

୩



ପେଟ ଫୁଲିବା



୪



ପାଦ, ହାତ ହଳଦିଆ
ଦେଖାଯିବା

ନବଜାତ ଶିଶୁର ବିପଦ ଲକ୍ଷଣ



- ୧ ଶିଶୁଟି ମାୟା ବା ନିଷ୍ପେଜ ରହିଲେ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ନ କଲେ ।
- ୨ ଶିଶୁର ପାଟି, ନାକ ବା ମଳଦ୍ୱାରରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲେ । ଶିଶୁଟିର ନିଶ୍ୱାସ ମିନିଟ୍‌ରେ ୩୦ରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ୬୦ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ । ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ କୁହୁଲିଲେ ।
- ୩ ଶିଶୁଟିକୁ ବାତ ମାରିଲେ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯେତେ ଫୁଲିଲେ ।
- ୪ ହାତ, ପାଦ ହଳଦିଆ ଦେଖାଗଲେ । ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେ ବା ଜ୍ୱର ହେଲେ ।

ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଶିଶୁକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶା/ଏଏନ୍‌ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ
ପରାମର୍ଶ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ଜରୁରୀ ।

ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ
ସାଙ୍ଗରେ ଏମ୍.ସି.ପି.
କାର୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ



୧

ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ର



୨



୧ ଓ.ପି.ଜି.

୨ ରୋଟା

୩ ପେଣ୍ଟା

୩



ବର୍ଷକ ଭିତରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାକରଣ




୧ ଓ.ପି.ଜି.

୨ ରୋଟା

୩ ଆଇ.ପି.ଜି.

୪ ପେଣ୍ଟା

୪




- 97

ଜୋରରେ
ନିଶ୍ୱାସ ନେବା



୧

ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ



୨

ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ



୩

ମା'ସାର
ଖୁଆନ୍ତୁ



ନିୟମିତ
ଟୀକାକରଣ
କରାନ୍ତୁ



୪



ନିମୋନିଆରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ



୧ ପିଲାଟିକୁ ଜ୍ୱର ଓ କାଶ ହେବା ସହ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ।

ବୟସ	ମିନିଟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସର ଗତି
୨ ମାସରୁ କମ୍	୬୦ କିମ୍ବା ଅଧିକ
୨ ମାସରୁ ୧ ବର୍ଷ	୫୦ କିମ୍ବା ଅଧିକ
୧ ବର୍ଷରୁ ୫ ବର୍ଷ	୪୦ କିମ୍ବା ଅଧିକ

୨ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲାବେଳେ ଛାତି ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା, ନାକପୁଡ଼ା ଫୁଲିବା ନିମୋନିଆର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ।


୩ ନିମୋନିଆ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆଶା/ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

୪ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଧୂଆଁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୀକାଦିଅନ୍ତୁ । ଛଅ ମାସ ଯାଏ କେବଳ ମା'ସ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ।

୧



ନିଷ୍ଠେଜ ହେବା



ଚର୍ମ ଧୋକଡ଼ା

ପେଟ କାଟିବା



୨

ଓ.ଆର୍.ଏସ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ୍ ବଟିକା



୩

ଯଥାସମ୍ଭବ ଓ.ଆର୍.ଏସ୍ ପିଆନ୍ତୁ



୪





ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରୀ ରଖନ୍ତୁ
ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ

ଶିଶୁର ତରଳ ଝାଡ଼ା



- ୧ ଶିଶୁଟିକୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଇ ଦେହ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ଓ ପିଲାଟି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇପଡ଼େ, ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ, ଚର୍ମ ଧୋକଡ଼ା ହୋଇଯାଏ, ପରିଶ୍ରା କମିଯାଏ ।
- ୨ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବା ମାତ୍ରେ, ପିଲାକୁ ଓଆରଏସ୍ ପିଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ଜିଙ୍କ (ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ) ବଟିକା ୧୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ୩ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓଆରଏସ୍ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ଦ୍ରବଣ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- ୪ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା / ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ । ମା' କ୍ଷୀର ସହ ଖାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।



ଶିଶୁର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା



- ବୟସ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ଓଜନ ନ ବଢିବା
- ପିଞ୍ଜରାହାତ ଦେଖାଯିବା, ଚର୍ମ ଧୋକଡା ହେବା ,ପାଦ ଫୁଲିବା

ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆଶା / ଅଜ୍ଞାନତ୍ୱାଦି କର୍ମୀ/ ଏଏନଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତିକାର

- ୬ ମାସ ପରେ ଶିଶୁକୁ ସଠିକ୍ ଅନୁପୁରକ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା – ଛତୁଆ, ଖେଚୁଡି, ଖିରି, ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ଉଚିତ୍ ।
- ୯ ମାସ ଓ ୧୨ ମାସରେ ମିଳିମିଳା ଟିକା ସହ ୬ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ମାତ୍ରା ଦିଆଯିବା ଦରକାର ।
- ରକ୍ତ ହୀନତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ୬ ମାସରୁ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁକୁ ସପ୍ତାହକୁ ୨ ଦିନ ୧ ମିଲି ଆଇଏଫ୍ଏ ସିରସ୍ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଏହାସହ ୧ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି ୬ ମାସରେ ଶିଶୁଟି କୃମି ନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।



ଠିକ୍ ବୟସରେ ବିବାହ

୧୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅର ବାହାଘର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ସେଥିପାଇଁ ଘରର ବାପା ଓ ମା'କୁ ଜେଲ ଓ ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ ।



- ୧ କିଶୋରୀ ବୟସରେ ବାହାଘର ଓ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା' ଓ ଛୁଆ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ।
- ୨ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅଟିକୁ ବାହାଦିଅନ୍ତୁ । ବାହାଘରର ଦୁଇବର୍ଷପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଥା ଚିନ୍ତାକରନ୍ତୁ ।
- ୩ ଆଶା ଓ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
- ୪ ଗର୍ଭଧାରଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର କଥା ; ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।



ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମରେ ବ୍ୟବଧାନ



- ୧ ବିବାହର ୨ ବର୍ଷପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଲେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗର୍ଭଧାରଣ ୩ ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ ମା' ଓ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ ।
- ୨ ଜନ୍ମରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖେ କଷ୍ଟୋମ, ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ବଟିକା ଏବଂ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇୟୁସିଡି (୫ବର୍ଷ ଏବଂ ୧୦ବର୍ଷ) ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।
- ୩ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର (ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଦିବସ) ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ଗର୍ଭ ନିରୋଧ ପଦ୍ଧତି (ଏନ୍ଏସ୍‌ଭି/ ଭ୍ୟାସେକ୍ୟୁମି/ ମିନିଲ୍ୟାପ୍/ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ପଦ୍ଧତିରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର/ FRUରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
- ୪ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଟୁଣୁକା ଟୁଣିକି ବା ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଗର୍ଭପାତ କରାଇ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାନ୍ତୁ ।



ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ



- ୧ ଡାକ୍ତର ଖାନାକୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମା'କୁ ୧୦୨ ଆୟୁଲାନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ଯିବା ଓ ଆସିବା ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଏ ।
- ୨ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନନୀ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା, ଔଷଧ, ସେବା, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଖାଇବା ଏବଂ ଦରକାର ପଡିଲେ ରକ୍ତ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଏ ।
- ୩ ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ପ୍ରସବ କରାଇଲେ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମୀଣଙ୍କ ପ୍ରସୂତି ମା'କୁ ଟ ୧୪୦୦/- ଏବଂ ସହରାଂଚଳରେ ଟ ୧୦୦୦/- ମିଳିଥାଏ ।
- ୪ ମମତା ଯୋଜନା'ରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ, ଟୀକାକରଣ କରି ଟ ୫୦୦୦/- ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ।




← ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି

ନିଆଁଚେଇ →



ନିଆଁ ଟେଙ୍କ ଓ ଗୁଣିଗାରେଡି ଶିଶୁର ଜୀବନହାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ



- ୧ ନିଆଁ ଟେଙ୍କ, ଗାଁ ବଇଦ, ଚୁଣୁକା ଔଷଧ, ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ଫଳରେ ଅନେକ ମା' ଓ ଶିଶୁ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ।
- ୨ କୁକୁଡ଼ା ବଳି, ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା, ଗୁଣି ଗାରେଡି ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନାହିଁ ।
- ୩ ଶିଶୁକୁ ବାତ ମାରିଲେ / ଜ୍ୱର ହେଲେ ନିଆଁ ଟେଙ୍କ ଦେବା ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଶିଶୁର ଜୀବନହାନୀ ହୋଇଥାଏ ।
- ୪ ସାପ କାମୁଡ଼ା, ଡରଳ ଝାଡ଼ା ଓ କାମଳ ରୋଗ ହେଲେ ଗାଉଁଲି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନାହିଁ ।

ଶିଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆଶା/ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ଜରୁରୀ ।

