



ଅମ୍ଳାନ୍ ଆନିନିଆ ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିଯାନ



ରକ୍ତହୀନତାର ଚିହ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷଣ

ଲୌହସାର ମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ରକ୍ତ ହୀନତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ

ଚିହ୍ନ	ଲକ୍ଷଣ
- ତଳ ଆଖି ପତାର ଭିତର ଜିଭ ଚର୍ମ ନଖ ଓ ହାତ ପାପୁଲି ଶେଆଳିଆ ଦେଖାଯିବା - ଜିଭରେ ଘା ହେବା - ପାଟି ଘା - ନଖ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବା ଚାମଚ ଆକୃତିର ନଖ	- ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଅଳ୍ପ ଲାଗିବା - ହାଲିଆ ଲାଗିବା - ବ୍ୟାୟାମ କଲାବେଳେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦୃତ ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେବା - ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବା - ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡବିଷା - ଅଳସୁଆ ଲାଗିବା, ଖେଳିବା ଓ ପାଠପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା - ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ବା ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା - ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା - ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା

ରକ୍ତହୀନତା ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହେଲେ ଚିହ୍ନ ବା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଜୀବନଚକ୍ରରେ ଲୌହସାରର ଅଭାବ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତାର ପରଶାମ ?

ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ :

- ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବାରୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
- ଅଳ୍ପ ଲାଗିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ ।
- ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ ।
- ଶିଶୁ, ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ :
- ଦୁର୍ବଳ ଶାରୀରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
- ନବଜାତକ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ ।
- ଆୟୋଜିତ ଅଭାବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।
- ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ନିମନ୍ତେ କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୌହସାର କମ୍ ରହିତ ରହେ ବା ହ୍ରାସ ପାଏ ।

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ :

- ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଜଟିଳତା ଆଶଙ୍କା, ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ (ଶିଶୁ ଜନ୍ମ)
- କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ, ମା' ଓ ନବଜାତକର ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ ।
- ଲୌହସାର ଅଭାବରୁ ରକ୍ତହୀନତା ଭୋଗୁଥିବା ମା' ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ଲୌହସାର ରହିତ ଥିବାରୁ, ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ

ପ୍ରତିଷେଧକ ଓ ଚକ୍ରସ୍ଥାପନ

ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ଓ ପୁଷ୍ଟି ଦିବସ (VHSND) ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ଓ ପୁଷ୍ଟି ଦିବସ (UHSND) ଏବଂ T3 ଶିବିର ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ମାତ୍ରା :

ବୟସ	ମାତ୍ରା
୬ - ୫୯ ମାସର ଶିଶୁ	IFA ସିରପ 1ml, ସପ୍ତାହରେ ୨ ଥର (ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର) ଦିଆଯିବ ।
୫ - ୯ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ	1 IFA ଗୋଲାପୀ ବଟିକା, ସପ୍ତାହରେ ୧ ଥର (ସୋମବାର) ଦିଆଯିବ ।
୧୦ - ୧୯ ବର୍ଷ କିଶୋର / କିଶୋରୀ	1 IFA ବ୍ଲୁ ବଟିକା (ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋମବାର) (ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିବାର) ଦିଆଯିବ ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା	ପ୍ରଥମ ଡ୍ରେମାସିକ ପରେ ୧୮୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ IFA ଲାଲ୍ ବଟିକା ଖାଇବେ ।
ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମାଆ	ପ୍ରସବ ପରେ ୧୮୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ IFA ଲାଲ୍ ବଟିକା ଖାଇବେ ।
ପ୍ରଜନନ ବୟସ ବର୍ଗର ମହିଳା ମାନେ (୨୦ ବର୍ଷରୁ ୨୪ ବର୍ଷ)	ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ IFA ଲାଲ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବେ ।

- ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ IFA ବଟିକା / ସିରପ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ।
- ଭିଟାମିନ୍ ସି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଖାଦ୍ୟ (ଲେମ୍ବୁପାଣି) ସହିତ IFA ବଟିକା / ସିରପ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ଶରୀରରେ ଲୌହସାରକୁ ମିଶାଇଥାଏ ।
- କ୍ୟାଲ୍‌ସିୟମ୍ ଓ IFA ବଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଅତିକମ୍ରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
- IFA ବଟିକା / ସିରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାହା / କଫି / କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
- ୬ ରୁ ୫୯ ମାସ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ପ୍ରସୂତା ମା' ମାନେ IFA ବଟିକା / ସିରପ୍ ଖାଇବା ପରେ ମା' ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ (MCP Card) ରେ ବଟିକା / ସିରପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ ।
- ସେହିପରି ୫ ରୁ ୯ ବର୍ଷ ପିଲା, ୧୦ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ କିଶୋର / କିଶୋରୀ, ୨୦ - ୨୪ ବର୍ଷ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମ ମହିଳା ମାନେ ବଟିକା / ସିରପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଅମ୍ଳାନ୍ ଫଲୋଅପ କାର୍ଡରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ ।

ରକ୍ତହୀନତା ଚିହ୍ନଟକରଣ ନିମନ୍ତେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍‌ର ସ୍ତର (g/dl)

ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ	ରକ୍ତହୀନତା (g/dl)		
	ସ୍ତ୍ରୀ	ମଧ୍ୟମ	ଗୁରୁତର
୬ - ୫୯ ମାସ ବୟସର ଶିଶୁ	10 - 10.9	7 - 9.9	< 7
୫ - ୧୧ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ	11 - 11.4	8 - 10.9	< 8
୧୨ - ୧୪ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ	11 - 11.9	8 - 10.9	< 8
ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇନଥିବା ମହିଳା (୧୫ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ)	11 - 11.9	8 - 10.9	< 8
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା	10 - 10.9	7 - 9.9	< 7
ପୁରୁଷ (୧୫ ବର୍ଷ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ)	11 - 12.9	8 - 10.9	< 8

ଉତ୍ସ : ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ୨୦୧୭

ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ IFA ବଟିକା / ସିରପର ମାତ୍ରା

ବୟସ ସମୂହ	ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍‌ର ସ୍ତର	IFA ବଟିକା / ସିରପର ମାତ୍ରା	ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନ
୬ ରୁ ୫୯ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ	ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମଧ୍ୟମ	୬ - ୧୨ ମାସର ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୧ ml IFA ସିରପ୍ ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ । ୧୩ - ୩୬ ମାସ ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୧.୫ ml IFA ସିରପ୍ ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ । ୩୭ - ୫୯ ମାସ ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୨ ml ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ ।	ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ଓ ପୁଷ୍ଟି ଦିବସ VHSND ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ଓ ପୁଷ୍ଟି ଦିବସ UHSND
	ଗୁରୁତର	ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରେରଣ ସ୍ଥିତିର ଲାବରେ CHC / SDH କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ ।	
୫ ବର୍ଷରୁ ୯ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନେ	ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମଧ୍ୟମ	୨ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ବଟି IFA ଗୋଲାପୀ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ସେବନ କରିବେ ।	ବିଦ୍ୟାଳୟ
	ଗୁରୁତର	ପ୍ରଥମ ରେଫରାଲ୍ ସ୍ଥିତିର CHC / SDH / DHH କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ ।	
୧୦ ବର୍ଷରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନେ	ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମଧ୍ୟମ	୨ ଟି ନାଲି ରଙ୍ଗର IFA ବଟିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୩ ମାସ ପାଇଁ ସେବନ କରିବେ ।	ବିଦ୍ୟାଳୟ (ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉନଥିବା କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ VHSND / UHSND)
	ଗୁରୁତର	ନିକଟସ୍ଥ CHC / SDH / DHH କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ ।	
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା	ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମଧ୍ୟମ	ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୨ ଟି IFA ଲାଲ୍‌ରଙ୍ଗ ବଟିକା ସେବନ କରିବେ ।	VHSND / UHSND
	ଗୁରୁତର	ନିକଟସ୍ଥ CHC / SDH / DHH କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ ।	
ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମାଆ	ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମଧ୍ୟମ	୨ ଟି ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର IFA ବଟିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେବନ କରିବେ ।	
	ଗୁରୁତର	ନିକଟସ୍ଥ CHC / SDH / DHH କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ ।	
ପ୍ରଜନନ ବୟସର ମହିଳା (୨୦-୨୪ ବର୍ଷ)	ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମଧ୍ୟମ	୨ ଟି ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର IFA ବଟିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୩ ମାସ ପାଇଁ ସେବନ କରିବେ ।	
	ଗୁରୁତର	ନିକଟସ୍ଥ CHC / SDH / DHH କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ ।	