

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (41 / 113)

ゼナキル錠50



- 効能:** このお薬は、ニューキノロン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて保存して下さい。

セファレキシン錠250「マルコ」



- 効能:** このお薬は、セフェム系第1世代の抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 食事と一緒に投与して下さい。獣医師から指示された用法用量を必ず守り、指示のない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

セファクリア錠600



- 効能:** 本剤感受性のブドウ球菌、細菌性皮膚感染症に効果があります。
- 注意事項:** 本剤の成分又はセフェム系抗生物質に対する過敏症を有する人は本剤を取り扱わないでください。
- 使用方法:** 1日2回7日間、間隔を10時間以上あけて飲ませてください。
- 保存方法:** 直射日光、高温、多湿を避け、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (42 / 113)

セファクリア300



- 効能:** このお薬は、セフェム系第1世代の抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守ってください。指示のない限り、途中で投与を中止しないでください。
- 保存方法:** 機密容器に入れて保存してください。

セルセプト



- 効能:** このお薬は免疫抑制剤です。免疫機能を抑制するためなどに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用ください。
- 保存方法:** 高温多湿を避け、室温で保存してください。

セレニア錠16



- 効能:** このお薬は、制吐剤です。嘔吐や、乗り物酔いの予防に用いられます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用ください。乗り物酔い予防に用いる場合は、乗り物に乗る1時間前までに服用してください。また、服用する1時間前は、ごはんやおやつを与えるのを控えてください。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

AH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (43 / 113)

セレニア錠24



- 効能:** このお薬は、制吐剤です。嘔吐や、乗り物酔いの予防に用いられます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守ってご使用ください。
乗り物酔いの予防に用いる場合は、乗り物に乗る1時間前までに服用してください。また、服用する1時間前は、ごはんやおやつを与えるのを控えてください。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

セレニア錠60



- 効能:** このお薬は、制吐剤です。嘔吐や、乗り物酔いの予防に用いられます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用ください。
乗り物酔いの予防に用いる場合は、乗り物に乗る1時間前までに服用してください。また服用する1時間前は、ごはんやおやつを与えるのを控えてください。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

ゼンラーゼーU CAT



- 効能:** この製品は、フマル酸を主成分とする猫用のサプリメントです。
- 注意事項:** 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (44 / 113)

ゼンラーゼーU DOG



効能: この製品は、フマル酸を主成分とする犬用のサプリメントです。
注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。
保存方法: 室温で保存して下さい。

ゼンレリア錠4.8mg

ゼンレリア錠6.4mg

ゼンレリア錠8.5mg

ソムノペンチル



獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (45 / 113)

ソロキシン0.025mg

- 効能: このお薬は、甲状腺ホルモン剤です。甲状腺ホルモンを補充・治療するために使用されます。
- 注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法: 室温(15～30℃)で保存してください。

ソロキシン0.05mg

- 効能: このお薬は、甲状腺ホルモン剤です。甲状腺ホルモンを補充・治療するために使用されます。
- 注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法: 室温(15～30℃)で保存してください。

ソロキシン0.1mg



- 効能: このお薬は、甲状腺ホルモン剤です。甲状腺ホルモンを補充・治療するために使用されます。
- 注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法: 室温(15～30℃)で保存してください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (46 / 113)

ソロキシン0.2mg (海外薬)



- 効能:** このお薬は、甲状腺ホルモン剤です。甲状腺ホルモンを補充・治療するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温(15～30℃)で保存してください。

ソロキシン0.3mg

- 効能:** このお薬は、甲状腺ホルモン剤です。甲状腺ホルモンを補充・治療するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温(15～30℃)で保存してください。

ソロキシン0.4mg



- 効能:** このお薬は、甲状腺ホルモン剤です。甲状腺ホルモンを補充・治療するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温(15～30℃)で保存してください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (47 / 113)

ソロキシン0.5mg



- 効能:** このお薬は、甲状腺ホルモン剤です。甲状腺ホルモンを補充・治療するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温(15～30℃)で保存してください。

ダームワン

- 効能:** この製品は、皮膚に柔軟性をあたえ、バランスを保つ働きのあるスポット剤です。
- 注意事項:** 本剤使用後、異常がみられた場合は、使用を中止し、獣医師に相談して下さい。
- 使用方法:** 獣医師に相談の上、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

ダイアモックス250ml



- 効能:** 炭酸脱水素酵素阻害薬で、眼圧や脳圧を下げる薬です。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐ獣医師にご相談ください。お薬の返品、交換はお受けできませんのでご了承下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用ください。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (48 / 113)

ダイクロライド錠25mg



- 効能:** このお薬は、利尿剤です。うっ血性心不全や腹水等の症状を改善するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、過度に水を飲む、尿が少ない、落ち着きがない等の症状がみられた場合は、獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

ダイフェン

- 効能:** このお薬は、セフェム系1世代の抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 乾性角結膜炎がみられることがあります。本剤投与後、眼やにの増加、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。また、肝障害のある動物には与えないでください。
- 使用方法:** 食事と一緒に投与して下さい。獣医師から指示された用法用量を必ず守り、指示のない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

タウリン散98%「大正」



- 効能:** このお薬は、肝・循環機能改善剤です。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 密閉した容器に入れて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (49 / 113)

タベジール錠 1mg



- 効能:** このお薬は、抗ヒスタミン剤です。アレルギーの症状を誘発するヒスタミンなどの発生を抑えます。
- 注意事項:** 本剤投与後、眠くなったり、多飲になる場合があります。その他、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

タチオン錠100mg



- 効能:** このお薬は、還元型解毒剤です。肝疾患や中毒などの治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

タブ・ポケット



- 効能:** この製品は、錠剤を飲みにくい犬のためのタブです。
- 注意事項:** 錠剤をしっかり包み込み与えて下さい。給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (50 / 113)

ダントリウムカプセル50mg



- 効能:** このお薬は、排尿障害の治療薬です。尿道の筋肉の緊張を緩和し、排尿障害を改善します。
- 注意事項:** 本剤使用後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

ダラシンカプセル75mg



- 効能:** このお薬は、リンコマイシン系の抗生物質です。嫌気性菌にも有効です。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

ダラシンカプセル150mg



- 効能:** このお薬は、リンコマイシン系の抗生物質です。嫌気性菌にも有効です。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (51 / 113)

チョコラA錠1万単位



- 効能:** このお薬は、ビタミンA製剤です。視力低下、皮膚乾燥、抵抗力低下などの治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、過敏症が現れることがあります。異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光と湿気を避けて保存して下さい。処方期間を過ぎた薬は廃棄して下さい。

チラーヂンS錠100



- 効能:** このお薬は、甲状腺ホルモン剤です。甲状腺ホルモンを補充・治療するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

沈降炭酸カルシウム錠500mg



獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (52 / 113)

ツルデック75mg錠



- 効能:** このお薬は、H2ブロッカーです。胃・十二指腸の潰瘍などの治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光と湿気を避けて、室温で保存して下さい。

ディアバスター錠



- 効能:** このお薬は、犬猫用の抗下痢剤です。下痢における症状改善、腹痛、疝痛の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて、室温で保存して下さい。

dsピモハート錠1.25mg



- 効能:** このお薬は、心不全治療薬です。心不全の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常が見られた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しく与えてください。食事の1時間前に与えるようにしてください。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、直射日光と高温多湿を避け室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (53 / 113)

dsピモハート錠2.5mg



- 効能:** このお薬は、心不全治療薬です。心不全の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常が見られた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しく与えてください。食事の1時間前に与えるようにしてください。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、直射日光と高温多湿を避け室温で保存して下さい。

デキサメサゾン錠0.5mg「タイヨー」



- 効能:** このお薬は、副腎皮質ホルモン製剤です。炎症性疾患や免疫疾患に使用する場合もあります。
- 注意事項:** 本剤投与後、食欲増進や、多飲がみられる場合があります。過度な場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

デカドロン錠4mg



- 効能:** このお薬は、副腎皮質ホルモン製剤です。炎症性疾患や免疫疾患に使用する場合もあります。
- 注意事項:** 本剤投与後、食欲増進や、多飲がみられる場合があります。過度な場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (54 / 113)

デクトマックス



デソパン60mg持田製薬



効能: 副腎皮質機能亢進症の治療薬

注意事項: 副腎皮質の機能を抑制します。元気、食欲低下などの症状が現れた時には担当獣医師までご相談ください。
投薬の際は手袋などを着用し、素手で触れないようにしてください。

チロブロック錠1.25mg



効能: このお薬は、抗甲状腺剤です。甲状腺機能亢進症の治療に使用され、過剰な甲状腺ホルモンの合成を制御します。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。定期的な検診が必要になります。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法容量を守って正しくご使用ください。

保存方法: 光を避け、密閉した容器に入れて常温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

AH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (55 / 113)

チロブロック2.5mg



- 効能:** このお薬は、抗甲状腺剤です。甲状腺機能亢進症の治療に使用され、過剰な甲状腺ホルモンの合成を制御します。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
定期的な検診が必要になります。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法容量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光を避け、密閉した容器に入れて常温で保存して下さい。

トコンシロップ「ツムラ」



- 効能:** このお薬は催吐剤です。誤って飲み込んだ異物や薬物などを嘔吐させるために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 遮光した気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

トコフェロール酢酸エステル錠100mg

ドミトール



獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (56 / 113)

トラコナ錠100mg



- 効能:** このお薬は、トリアゾール系の抗真菌薬です。真菌感染の治療のために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 空腹時は避けて、脂肪分の多い食事とともに服用させて下さい。指示のない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

トラゾドン塩酸塩錠50mg



- 効能:** 抗不安、情動障害の緩和、術後安静補助、通院や診察ストレスの緩和
- 注意事項:** 本剤は初回投与後から一過性にふらつきなどがみられることがあります。異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守り、食事に混ぜて投与して下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

トリブリッセンタブレット

- 効能:** このお薬は、トリメトプリムとサルファ剤の複合剤です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 光を避けて25℃以下で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (57 / 113)

トリプタノール錠10



- 効能:** このお薬は、三環系抗うつ剤です。脳内の神経細胞の働きを抑制することによって、不安や緊張を和らげます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常が見られた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

トリロスタン 2.5mg

- 効能:** 副腎皮質機能亢進症の治療薬
- 注意事項:** 副腎皮質の機能を抑制します。元気、食欲低下などの症状が現れた時には担当獣医師までご相談ください。

トリロスタン 5mg

- 効能:** 副腎皮質機能亢進症の治療薬
- 注意事項:** 副腎皮質の機能を抑制します。元気、食欲低下などの症状が現れた時には担当獣医師までご相談ください。

トリロスタン10mg

- 効能:** 副腎皮質機能亢進症の治療薬
- 注意事項:** 副腎皮質の機能を抑制します。元気、食欲低下などの症状が現れた時には担当獣医師までご相談ください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (58 / 113)

ドロンシット錠



- 効能:** このお薬は、条虫駆除剤で、瓜実条虫、マンソン裂頭条虫、メソセストイデス属条虫、犬の多包条虫、猫条虫の駆除に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

ドロンタルプラス錠



- 効能:** このお薬は、犬用腸内寄生虫駆除剤です。犬回虫、犬鉤虫、犬鞭虫、瓜実条虫の駆除に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

ドロンタル錠



- 効能:** このお薬は、猫用腸内寄生虫駆除剤です。猫回虫、猫鉤虫、瓜実条虫、猫条虫の駆除に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (59 / 113)

トラマドール



- 効能:** オピオイド受容体アゴニストの鎮痛剤で、癌や術後鎮痛として使用されます。鎮咳効果もあります。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。お薬の返品、交換はお受けできませんのでご了承ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を必ず守って、ご使用ください。

トラマールOD錠50mg



トランサミン錠500mg



- 効能:** このお薬は、抗プラスミン剤です。外傷などにより出血したときや、様々な病気に伴い出血しやすいときに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

トンキー-200



獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当


お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (60 / 113)

ドンペリンDS1%



効能: このお薬は、消化管運動改善薬です。嘔吐をおさえるお薬です。また、犬のリーシュマニア症の治療薬でもあります。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

ドンペリン錠10



効能: このお薬は、消化管運動改善薬です。嘔吐をおさえるお薬です。また、犬のリーシュマニア症の治療薬でもあります。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

ニチファーゲン配合錠



効能: このお薬は、肝臓疾患用剤です。肝胆道系の治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当