

nard-tex-math-package

Fujita Shu

2025 年 7 月 14 日

1 commands/math_headers_ja

commands/math_headers_ja パッケージを読み込むと、以下のような数学の教科書の見出しのコマンドを使うことができる。

- `\Axiom`
 - 引数なし (`\Axiom`)
公理
 - `<>` で囲った引数あり (`\Axiom<1>`)
公理 1
 - `[]` で囲った引数あり (`\Axiom[選択公理]`)
公理 (選択公理)
 - `<>` で囲った引数、`[]` で囲った引数あり (`\Axiom<1>[選択公理]`)
公理 1 (選択公理)
- `\Def`
 - 引数なし (`\Def`)
定義
 - `<>` で囲った引数あり (`\Def<2>`)
定義 2
 - `[]` で囲った引数あり (`\Def[虚数]`)
定義 (虚数)
 - `<>` で囲った引数、`[]` で囲った引数あり (`\Def<2>[虚数]`)
定義 2 (虚数)

- \Formula
 - 引数なし (\Formula)

公式
 - <> で囲った引数あり (\Formula<3>)

公式 3
 - [] で囲った引数あり (\Formula[積和・和積の公式])

公式 (積和・和積の公式)
 - <> で囲った引数、[] で囲った引数あり (\Formula<3>[積和・和積の公式])

公式 3 (積和・和積の公式)
- \Th
 - 引数なし (\Th)

定理
 - <> で囲った引数あり (\Th<4>)

定理 4
 - [] で囲った引数あり (\Th[平均値の定理])

定理 (平均値の定理)
 - <> で囲った引数、[] で囲った引数あり (\Th<4>[平均値の定理])

定理 4 (平均値の定理)

同様に、

- \Lem - 補題
- \Prop - 命題
- \Cor - 系
- \Pf - 証明

も用いることができる。

2 commands/operators

`commands/operators` パッケージを読み込むと、以下のような数学の関数などのコマンドを使うことができる。

2.1 三角関数

- `\cosec` - cosec

2.2 逆三角関数

- `\Arcsin` - Arcsin
- `\Arccos` - Arccos
- `\Arctan` - Arctan
- `\Arccsc` - Arccsc
- `\Arcsec` - Arcsec
- `\Arccot` - Arccot

2.3 双曲線関数

- `\cosech` - cosech
- `\csch` - csch
- `\sech` - sech

2.4 ベクトル解析

- `\grad` - grad
- `\rot` - rot
- `\vdiv` - div
- `\curl` - curl

2.5 行列

- `\Tr` - Tr
- `\SO` - SO
- `\SU` - SU

2.6 複素数

- `\re` - Re
- `\im` - Im

注意

`\Re`, `\Im` はすでに定義されており、 \Re , \Im となる。

2.7 その他の演算子など

- `\sumprime` - \sum'_{def}
- `\DefArrow` - \Longleftrightarrow

3 commands/utils

commands/utils パッケージを読み込むと、以下のような数学に関する便利なコマンドを使うことができる。

- \Square - 2 乗

例

- \Square{x} - x^2

- \Inverse - -1 乗

例

- \Inverse{x} - x^{-1}

- \Sqrt - 平方根、 n 乗根

例

- \Sqrt{x} - \sqrt{x}
- \Sqrt[n]{x} - $\sqrt[n]{x}$

- \Abs - 絶対値 (少し広め)

例

- \Abs{x} - $|x|$

- \Choose - 二項係数

例

- \Choose{n}{k} - ${}_nC_k$

- \Conjugate - 共役 (少し広め)

例

- \Conjugate{A} - \overline{A}

- \Parentheses - 括弧 (少し広め)

例

- \Parentheses{x} - (x)

- \Sequence - 数列

例

- \Sequence{a_n} - $\{a_n\}$

3.1 黒板太字

- 自然数 - `\Natural` - \mathbb{N}
- 整数 - `\Zahlen` - \mathbb{Z}
- 有理数 - `\Quotient` - \mathbb{Q}
- 実数 - `\Real` - \mathbb{R}
- 複素数 - `\Complex` - \mathbb{C}
- ベクトル空間 - `\V` - \mathbb{V}
- 体 - `\K` - \mathbb{K}

3.2 点と座標

- `\Point` - 点

例

- `\Point{P}` - P
- `\Point{P}[a]` - $P(a)$
- `\Point{P}[1][2]` - $P(1, 2)$
- `\Point{P}[1][2][3]` - $P(1, 2, 3)$

- `\Coordinate` - 座標

例

- 2 次元 - `\Coordinate[1][2]` - $(1, 2)$
- 3 次元 - `\Coordinate[3][4][5]` - $(3, 4, 5)$

3.3 関数

- `\Exp` - 指数関数

例

- `\Exp{x}` - e^x

- `\Function` - 一般の関数

3 変数関数まで対応している。

例

- `\Function{f}[x]` - $f(x)$
- `\Function{f}[x][y]` - $f(x, y)$
- `\Function{f}[x][y][z]` - $f(x, y, z)$

3.4 微分

- \df

例

- $\backslash df\{\}$ - d
- $\backslash df\{x\}$ - dx
- $\backslash df\{f\}$ - df
- $\backslash df[2]\{\}$ - d^2
- $\backslash df[2]\{x\}$ - d^2x ($\backslash df\{x^2\}$ と異なることに注意)
- $\backslash df\{x^2\}$ - d^2x^2 ($\backslash df[2]\{x\}$ と異なることに注意)
- $\backslash df[n]\{\}$ - d^n
- $\backslash df[n]\{f\}$ - d^nf
- $\backslash int_{\{0\}^{\{1\}} x^{\{2\}} \backslash df\{x\}$ - $\int_0^1 x^2 dx$

- \Df

例

- $\backslash Df\{\}$ - $\frac{d}{dx}$
- $\backslash Df[2]\{\}\{x\}$ - $\frac{d^2}{dx^2}$
- $\backslash Df[n]\{\}\{x\}$ - $\frac{d^n}{dx^n}$
- $\backslash Df\{f\}\{x\}$ - $\frac{df}{dx}$
- $\backslash Df[2]\{f\}\{x\}$ - $\frac{d^2f}{dx^2}$
- $\backslash Df[n]\{f\}\{x\}$ - $\frac{d^nf}{dx^n}$
- 他のコマンドとの組み合わせ
 - $\backslash Df\{\}\{x\} \backslash Function\{f\}[x]$ - $\frac{d}{dx} f(x)$
 - $\backslash Df[2]\{\}\{x\} \backslash Function\{f\}[x]$ - $\frac{d^2}{dx^2} f(x)$
 - $\backslash Df\{\backslash Function\{f\}[x]\}\{x\}$ - $\frac{df(x)}{dx}$
 - $\backslash Function\{\backslash Df\{f\}\{x\}\}[x]$ - $\frac{df}{dx}(x)$

3.5 偏微分

- \pdf

例

- \pdf{} - ∂
- \pdf{x} - ∂x
- \pdf{f} - ∂f
- \pdf[2]{} - ∂^2
- \pdf[2]{x} - $\partial^2 x$ (\pdf{x^2} と異なることに注意)
- \pdf{x^2} - $\partial^2 x^2$ (\pdf[2]{x} と異なることに注意)
- \pdf[n]{} - ∂^n
- \pdf[n]{f} - $\partial^n f$

- \Pdf - 分数型表記 - 1 階偏微分...n 階偏微分に対応

例

- \Pdf{} - $\frac{\partial}{\partial x}$
- \Pdf[2]{}{x} - $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$
- \Pdf[n]{}{x} - $\frac{\partial^n}{\partial x^n}$
- \Pdf{f}{x} - $\frac{\partial f}{\partial x}$
- \Pdf[2]{f}{x} - $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$
- \Pdf[n]{f}{x} - $\frac{\partial^n f}{\partial x^n}$
- 他のコマンドとの組み合わせ
 - \Pdf{}{x} \Function{f}[x][y] - $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$
 - \Pdf[2]{}{x} \Function{f}[x][y] - $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x, y)$
 - \Pdf{\Function{f}[x][y]}{x} - $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$
 - \Function{\Pdf{f}{x}}[x][y] - $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$

- \Pdft - 1 階偏微分 熱力学でよく使う表記

例

- \Pdft{z}{x}{y} - $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$
- \Pdft{p}{S}{V} - $\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$

- \Ppdf - 分数型表記 - 2 階偏微分（異なる変数で 2 回偏微分する場合）

例

- \Ppdf{{x}{y}} \Function{f}[x][y] - $\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x, y)$
- \Ppdf{\Function{f}[x][y]}\{x\}{y} - $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y}$