UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI I EDUKIMIT
(PROGRAMI I AKM-së)
QENDRA NË GJILAN

BIODIVERSITETI I MALIT SHARR

(Punim diplome)

Mentori **Kandidati,**
Dr. Sc. Halil Ibrahimi **Naser Guri**

GJILAN, 2014

Parathënie

“Natyra dhe biodiversiteti, mjedisi jetësor dhe trashëgimia kombëtare, janë përgjegjësi për secilin”
KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Njeriu dhe natyra kanë bashkëjetuar në harmoni të plotë që nga epokat parahistorike,duke qenë gjithmonë pjesë të pandashme.Breza të tërë të njerëzimit kanë mbijetuar duke shfrytëzuar të mirat e natyrës dhe duke i përdorur ato në mënyrë të drejtë.

Pyjet,kullosat,burimet ujore,kafshët dhe bimët kanë luajtur rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e shoqërisë njerëzore.

Fatkeqësisht, brezi i njeriut të epokës moderne, më shumë se kurrë më parë është duke ndikuar në prishjen e baraspeshës ekologjike të natyrës në planetin tonë.Shkatërrimi i pyjeve, fragmentimi i habitateve, shfrytëzimi i pakontrolluar i resurseve natyrore janë vetëm disa prej aktiviteteve të njeriut, pasojat e të cilave tani më janë evidente.

Si asnjëherë më parë, numri i llojeve që zhduken dhe atyre që kërcënohen për zhdukje është duke marrë përmasa alarmante.Zvogëlimi i resurseve ujore, zgjerimi i thatësisë, katastrofat natyrore,shkrirja e akullnajave polare, janë vetëm disa prej manifestimeve të ndryshme klimatike që sot po i ndjejmë në secilën pjesë të globit.

Është në ndërgjegjen e njeriut të sotëm të mendoj për të ardhmen e brezave që do vijnë,është në dorën tonë të vendosim për fatin e shumë specieve që kërcënohen për zhdukje.Andaj, është koha e fundit që veprimet tona t’i orientojmë në dobi të natyrës dhe të ardhmes së planetit tonë.Edhe pse mbrojtja e diversitetit konsiderohet njëra prej sfidave më të mëdha me të cilat po përballet njerëzimi sot, ne duhet menduar se çdo qenie e gjallë e këtij globi ka rëndësinë dhe të drejtën për të ekzistuar,ashtu si edhe vetë njeriu.

Kosova edhe pse një vend i vogël në hartën e globit,karakterizohet me natyrë të pasur, me peisazhe, botë të larmishme bimore dhe shtazore.Edhe vlerat e trashëgimisë sonë natyrore po përballen me presionin e vazhdueshëm nga shfrytëzimi i pakontrolluar dhe i paplanifikuar. Përkundër kësaj, orientimi ynë duhet të jetë që të intesifikojmë përpjekjet për ruajtjen dhe konservimin e këtyre vlerave të rralla natyrore.Duke hartuar politika efikase për mbrojtjen e natyrës,duke rritur sipërfaqet e zonave të mbrojtura, duke ngritur cilësinë e menagjimit të këtyre zonave, duke mbrojtur llojet e rralla bimore dhe shtazore, duke mbrojtur pyjet dhe duke inventarizuar të gjitha speciet, ne përmbushim obligimin që gjeneratave pasardhëse t’u japim rastin t’i shijojnë vlerat e rralla natyrore të Kosovës, e në rastin konkret në veçanti të Malit Sharr.

Përmbajtja

Hyrja----------1

Gjendja mjedisore dhe hapësinore e parkut Kombëtar "Sharri"----------2

Sipërfaqet dhe veçoritë e tokave pyjore----------3

Sipërfaqet dhe veçoritë e kullosave----------4

Kullosat primare----------5

Kullosat sekondare----------5

Gjeomorfologjia----------6

Klima----------6

Hidrologjia----------7

Peisazhet----------8

Vegjetacioni----------9

1. **Territori kodrinor termofil i pyjeve të dushkut----------9**
2. **Territori kalues termofil i bungut----------9**
3. **Territori mezofil i pyjeve të ahut----------10**
4. **Vegjetacioni halor pyjor frigorifil i lartë malor----------10**
5. **Vegjetacioni kalues shkurror i kërlekës së maleve të larta----------10**
6. **Vegjetacioni barishtor dhe shkurror i maleve të larta----------11**

Flora----------11

- **Llojet bimore mjekësore----------12**
- **Disa lloje bimore karakteristike në PN"Sharr"----------13**
- **Tabela: Disa lloje të bimëve endemike në Malin Sharr----------14**
- **Foto të bimëve të rralla të Malit Sharr----------15**

Fauna e Sharrit----------16

- **Peshqit (Pisces)----------16**
- **Ujëtokësorët (Amphibia)----------17**
- **Zvarranikët (Reptilia)----------17**
- **Shpendët (Aves)----------18**

- **Gjitarët (Mammalia)----------19**
- **Insektet ----------20**

Rezervatet strikte natyrore----------21

1. **Maja e arnenit (KK Prizren)----------21**
2. **Oshlaku (KK Prizren)----------22**
3. **Pisha e madhe (KK Prizren)----------22**
4. **Rusenica (KK Suharekë)----------22**

Zonat me vlera të veqanta natyrore të propozuara për rezervate----------23

1. **Pashallarë (Ostrovica)----------23**
2. **Kopilica ----------24**
3. **Rajoni i burimit të Lumbardhit----------24**
4. **Luboteni----------24**
5. **Livadhi i Mbretit-Liqeni i Jazhincës (Bistra)----------25**

Gjendja mjedisore dhe e resurseve natyrore të parkut----------27

- **Degradimi i pyjeve----------28**
- **Gjendja e pyjeve të arnenit (Pinetum peucis)----------28**
- **Pyjet e ahut (Fagetum montanum, F. subalpinum)----------28**
- **Gjendja e ekosistemeve më të rëndësishme shkurrore----------29**
- **Gjendja e Faunës----------29**
- **Degradimi i tokës----------30**
- **Zonat e rrezikuara nga erozioni----------30**

Zgjërimi i Parkut Kombëtar”Sharri”----------31

- **Biodiversiteti ----------31**
- **Vegjetacioni në pjesën e zgjeruar të parkut (Komuna e Sharrit)----------32**
- **Flora ----------32**
- **Fauna----------32**

Humbja e biodiversitetit në Parkun Nacional “Sharri”----------33

- **Fatkeqësitë natyrore----------33**
- **Domosdoshmëria e ruajtjes së biodiversitetit----------34**

Përfundimi ----------35


Literatura dhe burimet----------36

Hyrje

Malet e Sharrit shtrihen në Jug-Lindje te Kosovës duke filluar nga afërsia e Prizrenit dhe shkojnë pjerrtas me majat në formë piramidale të radhitura njëra pas tjetrës prej nga supozohet ta kenë marrë emrin ,nga që u gjasojnë majave të sharrës.Malet e Sharrit janë të njohura qysh nga antikiteti në dokumente të autorëve të ndryshëm, që nga shekulli i V p.e.s. me emrin **Mont Skardus,** nga Herodoti. Më vonë me ardhjen e Osmanëve në Ballkan Malet e Sharrit u quajtën **Çar-dagh,**në dokumentet europiane dhe otomane. Në kuadër të Maleve të Sharrit, Kosovës i takojnë pjesët veriore që përfshijnë hapësirën prej rreth 1100km katrorë ndërsa pjesa tjetër prej 500km katrorë i takon pjesës së Maqedonisë. Maja më e lartë nga fillojnë këto vargmale,që ndodhet në teritorin e Kaçanikut, mendohet se emrin e ka me origjinë frënge"Pamje e bukur" "le bonne ten"e që mbeti pastaj në popull si Luboten e cila maje ka një lartësi mbidetare prej 2496m.

Malet e Sharrit prezantojnë zonën kryesore për vlera botanike, faunistike, ekologjike, turistike, rekreative, sportive, edukative dhe kulturore të Kosovës.Malet e Sharrit kanë diversitet biologjik mjaft të theksuar.Flora dhe vegjetacioni është i pasur me lloje. Në mesin e këtyre llojeve 86 sosh, janë të deklaruara me rëndësi ndërkombëtare,26 lloje janë të përfshira në "Listën e kuqe " Evropiane të shtazëve dhe bimëve si të kërcënuara dhe 32 janë në "Listën e kuqe"të bimëve të kërcënuara sipas IUCN-it[1]. Duke u bazuar në këto fakte mund të konsiderohet si qendër e jetës së llojeve diversitare të Ballkanit dhe Evropës.Një pjesë e Maleve të Sharrit është shpallur Park Kombëtar në vitin 1986. Zona e mbrojtur me ligj ka sipërfaqe prej 39000 ha dhe shtrihet në kufijtë e katër komunave: Prizren,Shtërpcë,Therandë dhe Kaçanik.

Sipas IUCN parku kombëtar "Malet e Sharrit" është vendosur në listën ndërkombëtare të zonave të mbrojtura.




Harta: Kufitë e Parkut Kombëtar "Sharri"

[1] IUCN united nations list of national parks and proteceted areas (Unioni botëror për ruajtjen dhe koservimin e natyrës)

GJendja mjedisore dhe hapësinore e parkut

Parku Nacional “Mali Sharr”është evidentuar në listën ndërkombëtare, dhe bën pjesë në kategorinë e dytë të zonave të mbrojtura sipas IUCN. Ky territor përfshinë sipërfaqen prej rreth 23000ha dhe shtrihet në territoret e katër komunave:Prizrenit me 41%(rreth 9200ha), Shtërpces me 47%(rreth 10700ha),Suharekës me 10%(rreth 2300ha) dhe Kaçanikut me 2% (rreth 400ha)

Komuna	Në hektarë (ha)	Pjesëmarrja në përqindje
Prizreni	9200	41%
Shtërpca	10700	47 %
Suhareka	2300	10%
Kaçaniku	400	2%
Gjithsej	Rreth 22.600	100%



Harta: Sipërfaqja e PN “Mali Sharr” sipas komunave pjesëmarrëse.

Pjesa më e madhe e sipërfaqes së parkut është e mbuluar kryesisht nga pyjet me 48% dhe kullosat me 49% si dhe tokat bujqësore(ara dhe livadhe) me 1.6% gjegjësisht shkrepa 1.4%.




Fig. Sipërfaqja në PN “Mali Sharr” sipas mbulueshmërisë vegjetative.

Sipërfaqet dhe veqoritë e tokave pyjore

Shpërndarja më e theksuar e tyre është në komunën e Shtërpcës me mbi 5400ha, e cila përcillet nga ajo e Prizrenit me mbi 3800ha. Kurse në komunën e Suharekës pyjet zënë rreth 1600ha si dhe në komunën e Kaçanikut rreth 75ha. Në këto sipërfaqe bëjnë pjesë:

- Pyjet e ahut(Fagion moesiacae illyricum): 3067.09ha (68%)
- Pyjet e përziera të ahut dhe rrobullit: 98.80ha(2.2%)
- Pyjet e përziera të ahut,bredhit dhe hormoqit: 95.30ha(2%)
- Pyjet e rrobullit (Pinetum heldreichii): 450.52ha (10%)
- Pyjet e bredhit (abietum alba): 30.70ha(0.7%)
- Pyjet e hormoqit (Picetum excelsae): 5.80ha(0.1%)
- Pyjet e përziera të halorëve:rrobulli,bredhi,
- Hormoqi, arneni, hartina: 32.80ha(0.7%)
- Kulturat e pishës së zezë dhe të bardhë: 132.62ha(3%)
- Kulturat e hormoqit: 6.65ha(0.1%)
- Pyjet dhe shkurret e mullezës dhe frashnit të zi (Orno Ostryetum carpinifoliae): 499.15ha(11%)
- Vegjet. shkurror I hartinës (Pinetum mughi): 73.10ha (1.6%)
- Shkurret e verrit dhe lajthisë: 28.96ha(o.6%)

Gjithsej: 4521.49ha (100%)





Fig:Shpërndarja e pyjeve në ha për komuna.

Pyjet më të rëndësishme janë të rrobullit (pinetum heldreichi) për shkak të karakterit endemo-relikt. Këto pyje me sipërfaqe prej 10% radhiten pas pyjeve të ahut. Pyjet e rrobullit gjenden në rezervatet Oshlak, Koxha Ballkan dhe Pashallare.

Sipërfaqja e kulturave pyjore (pyjet artificiale të ngritura me anë të pyllzimeve) është e ulët (vetëm 3%) që nënkupton se në territorin e Malit Sharr dominojnë llojet autoktone. Shumica e këtyre kulturave i takojnë llojeve të pishës së zezë dhe të bardhë, të cilat janë mbjellur në fillim të viteve të 80-ta në pjesën jugore të Oshlakut që rrezikohet nga erozioni.



Harta: Mbulueshmëria vegjetative nëpër komuna

Sipërfaqet dhe veqoritë e kullosave

Vegjetacionet barishtore mbulojnë rreth 50% të sipërfaqes së parkut, nga e cila shumica është e përshtatshme për kullosa. Shumica e kullosave ndodhen në lartësinë mbidetare mbi 800m ku të gjitha bëjnë pjesë në kullosa malore,në kuadër të të cilave veçohen dy lloje:

- Kullosat pyjore(kullosat pyjore deri në 2000m)
- Kullosat e maleve të larta (kullosat mbi vegjetacionin pyjor)




Fig:Shpërndarja e kullosave në ha për komuna

Kullosat janë të pasura me mbulesë barishtore dhe burime ujore që janë parakushte për zhvilimin e blektorisë. Kullosat për nga aspekti i prejardhjes ndahen në primare dhe sekondare.

Kullosat primare-Përfshijnë sipërfaqet e kullosave, të cilat janë pasojë e ndikimit të faktorëve klimatik gjatë historisë së zhvillimit të vegjetacioneve në periudhat e ndryshme gjeologjike.Këto kullosa shtrihen mbi vegjetacionin pyjor deri te majat më të larta ku gjendet mbulesa barishtore.Ndryshe quhen edhe kullosa të maleve të larta apo kullosa alpike. Këto kullosa përbëhen nga bimët barishtore ku dominojnë bashkësitë e barit (Graminae). Kullosat primare gjenden në terrenin ku mund të zhvillohen vetëm bimët barishtore.

Kullosat e maleve të larta janë mjaft të pasura me lloje bimore, në kuadër të të cilave veçohen llojet e shumta endemike. Bimët barishtore që gjenden në pjesën e poshtme të këtyre kullosave i takojnë familjeve: Veratrum, Senecio, Aquilegia, Trolius etj. Ndërsa në pjesët më të larta në zonën e livadheve alpike gjenden llojet e familjeve: Ranunculus, Primula, Androsace, Saxifraga, Silene, Gentiana etj. LLojet më të njohura shkurrore janë boronica (Vaccinium myrtillus), dëllinja e rëndomtë (Juniperus communis) dhe dëllinja e siberisë (Juniperus sibirica).



Foto: Kullosat primare

Kullosat sekondare- Janë sipërfaqe barishtore që janë zhvilluar si pasojë e ndikimit natyrorë dhe faktorit njeri. Kryesisht janë krijuar nga njeriu duke i shkatërruar pyjet në favor të kullosave dhe livadheve. Këto kullosa ndodhen nën 2000m lartësi dhe kryesisht shfrytëzohen për kullotjen e bagëtive të banorëve lokal. Kullosat sekondare janë më të pakta dhe me kualitet më të dobët të mbulesës barishtore në krahasim me kullosat primare.



Foto: Kullosë sekondare



Foto: Qeni i Sharrit (Rasë autoktone e Sharrit)

GJeomorfologjia

Në formimin morfologjik të Sharrit kanë ndikuar lëvizjet tektonike të tokës me çka janë krijuar ngjeshje gjeomorfologjike, gjithashtu edhe me forca të jashtme, të cilat kanë pasur ndikim në akullnaja, rrjedha të ujit etj. Si rrezultat i veprimeve akullnajore janë krijuar thellësira të cilat janë shëndrru në liqene akullnajore siq janë Liqeni i Livadhit, Liqeni i jazhincës dhe Liqenet tjerë mjaft atraktiv, të cilët në popull njihen si "Sytë e maleve".Në përbërjen gjeologjike të Sharrit marrin pjesë shkëmbinjtë e periudhës paleozoike, gëlqerorë, të mermertë etj. Formacionet e paleozoikut kanë një shtrirje më të madhe dhe pikërisht kjo e bën diferencimin themelor prej pjesëve të tjera malore të Kosovës. Këto formacione shtrihen prej majës bistro (2640m), duke vazhduar përgjatë kufirit të Kosovës me Maqedoninë. Krahas tyre, në mënyrë fragmentare janë paraqitur formacionet e mesozoikut, përkatësisht kretakut dhe dolomitit në Shtërpcë dhe në lindje të majës Luboten[2]. Në afërsi të Brezovicës është grumbulluar materiali morenik i procesit akullnajorë.

Klima

Mali Sharr sipas klasifikimit klimatik të Kosovës hynë në klimën lindore kontinentale.Kurse në vet Parkun Nacional dominojnë klimat alpike dhe ajo kontinentale,e cila herëpasëhere ndikohet nga klima e mesme kontinentale.Në hapsirën e Malit Sharr ndodhen vetëm dy stacione meteorologjike,njëri ndodhet në teritorin e Kosovës në Brezovicë dhe daton që nga viti 1949 dhe tjetri ndodhet në teritorin e Maqedonisë në jazhincë . Nga analiza e bërë në këto dy stacione rezulton që temperatura mesatare vjetore shumë vjeqare është 8,4 gradë celzius. Muaji më i ftohtë është Janari me -1,8 dhe -1,3 gradë celzius, kurse temperatura mesatare ditore luhatet nga 18-20 gradë celzius.

Vlera mesatare e lagështisë relative është 67-70% për dy vend-matjet.Erat arrijnë shpejtësinë nga 1-16 m/s, dominojnë drejtimet e erës nga ana e jugut,jugperëndimit dhe juglindjes. Sasia e rreshjeve si vlerë mesatare në Brezovicë dhe Jazhincë variojnë nga 670 deri në 1200mm. Ditë me diell në këtë rajon janë 220 deri në 280 ditë. Ky rajon rrallë herë goditet nga breshëri. Niveli i borës në këtë rajon ka arritur lartësinë deri në 3m në vitin 1956. Pas këtij viti lartësitë më të mëdha të borës janë regjistruar në vitin 1981 në Shtërpcë,ku pati një lartësi 90cm mbrenda 108 ditëve.


[2] Dr.Riza I. Çavolli,Gjeografia regjionale e Kosovës,Prishtinë1997,fq.14



Foto: një pamje e Sharrit

Hidrologjia

Si rezultat i rreshjeve të shumta atmosferike, regjioni i Parkut Nacional të Sharrit është jashtëzakonisht i pasur me ujëra që përfshijnë një numër të madh të liqeneve me origjinë glaciale,burime dhe rrjedha të disa lumejve. Territorit të maleve të Sharrit i takojnë rrjedhjet e dy lumenjve,Lepenci dhe Lumëbardhi. Lepenci krijohet me bashkimin e ujë-rrjedhave që burojnë nga malet e Cerevcit dhe Jezercit e në rrjedhën e vetë pranojnë edhe degë të shumta. Përmes Luginës së këti Lumi Mali Sharr lidhet me Fushën e Kosovës. Lumëbardhi buron në rajonin e Prevallës, i cili gjithashtu mbledh shumë degë të pasura me ujë. Përmes kësaj lugine Mali Sharr lidhet me Rrafshin e Dukagjinit. Në teritorin e Malit Sharr ndodhen edhe 25 liqene në lartësi mbidetare mbi 1900m.Liqeni më i madh është Liqeni i Livadhit(2173m).



Harta: Rrjeti hidrografik

Peisazhet

Karakterizohen me vlera të shumta natyrore. Tërësinë peisazhore e përbëjnë pyjet, kullosat,livadhet të shoqëruara me degëzime të relievit, shpesh të krijuara nga prerjet e luginave nëpër të cilat kalojnë lumenjë dhe përroska, vende-vende në formë të kanioneve dhe grykave me ujëvara apo liqene,duke pasqyruar përjetim të këndshëm të kësaj natyre të bukur.

Por gjithsesi tërësi më atraktive pisazhore janë sipërfaqet e mbuluara me pyje, barë, livadhet, kullosat dhe formacionet e tjera barishtore, të cilat zënë sipërfaqet ndërmjet lartësive mbidetare mbi 999 dhe 1500m. Këtu formacionet e pyjeve (të ahut, arnenit, molikës, bredhit, hormoqit, etj.) ndërrohen me formacionet e barishtorëve duke u paraqitur në të gjitha nuancat e ngjyrës së gjelbërt që shkaktojnë përjetim jashtëzakonisht të bukur.Përveç asaj ndarja tejet e madhe e reliefit që është krijuar me prerjen e një sërë luginave të lumenjëve dhe përrockave në formë të kanioneve dhe grykave me ujëvarat e numërta dhe liqenet e shumtë e plotëson përjetimin e plotë të kësaj natyre autentike të bukur dhe të paprekur.





Foto: Luboteni gjatë lindjes dhe perëndimit të diellit (Pamje nga Kaçaniku nëntor 2013)

Përveç këtyre bukurive në pjesët e ulta të Sharrit, gjatë verës në livadhe lulëzojnë lulet malore me ngjyra të ndryshme duke i dhënë peisazhit atraksion dhe bukuri të jashtëzakonshme e hapësirës aromë dhe freski të posaçme.

Përjetim të jashtëzakonshëm vizuel të bukurisë natyrore Mali Sharr ofron në stinën e vjeshtës në kohën e krijimit të peisazhit kalues malor kur i tërë territori mbulohet me të gjitha ngjyrat e spektrit, si dhe në pranverën e vonshme kur në viset e ulta harliset vegjetacioni bimorë duke e mbuluar tërë teritorin në gjelbrim,ndërsa majat e larta të Lubotenit, Bistrës dhe maleve tjera edhe më tutje janë nën mbulesën e bardhë të borës.

Vegjetacioni

Territori I Malit Sharr është shumë i begatshëm me florë si dhe me shumë breza vegjetativ,të cilët janë në pajtim me ndërrimin e lartësive mbidetare,me begati në bashkësi të rralla endemike(deri më tani janë identifikuar 112 bashkësi) të pyjeve dhe livadheve. Këtu hasen lloje të ndryshme si dushku (Quercus), ahu (Fagus moesiaca), bredhi, hormoqi, pisha e bardhë, pishat endemike dhe relikte të maleve të larta: rrobulli (Pinus heldreichii) dhe arneni i bardhë (Pinus peuce) si dhe pisha e maleve të larta kerleka (Pinus mugo). Në mesin e kësaj përbërje pyjore përveç drujve ndodhet edhe panja malore endemike (Acer heldreichii), si dhe lloji drunorë, tejet i rrallë dhe gati i zhdukur nga këto pyje bresheu i rëndomtë (Taxus baccata) dhe shumë lloje tjera të rëndësishme drunore dhe barishtore.Përhapja e vegjetacionit në Malin Sharr ndërron me ndërrimin e lartësive mbidetare me ç'rast diferencohen brezat vegjetativë:



Harta: Vegjetacioni I pyjeve (I lartë) dhe kullosave(I ulët).

1. **Territori kodrinor termofil I pyjeve të dushkut** (Quercus troyana,Q. conferta,Q. cerris,Q. pubescens,Carpinus orientalis etj).Ky territor ka mbetur jashtë kufirit të parkut.
2. **Territori kalues termofil I bungut-**Në këtë brez pyjorë dominojnë llojet: bungu (Quercus petrea),shkoza e bardhë(Carpinus betullus),frashni i zi(Fraxinus ornus), mullëza (Ostrya carpinifolia), qarri (Quercus cerris). Në kuadër të këtij territori dominojnë edhe një numër i madh i llojeve tjera drurore si:murrizi, dardha e egër, shikakuqi etj.



Foto: Quercus petrea (lloj dushku)

3. **Territori mezofil i pyjeve të ahut** (Fagus moesiaca)-Në kuadër të territorit të vet të përhapjes paraqitet në dy grupe asociacionash dhe atë: bashkësia kodrinore e ahut (Fagetum montanum) dhe bashkësia e bredhit dhe ahut (Abieto fagetum) ndërkaq në viset e larta paraqitet hormoqi. Bashkësitë e ahut janë të përhapura në lartësinë mbidetare 900-1500m në tërë territorin e P. nacional "Malet e Sharrit".
4. **Vegjetacioni halor pyjor frigorifil i lartë malor –** Ky territor vegjetativ i kësaj lartësie përbëhet prej bashkësive endemike të pishave malore endemo relikte të molikës (Pinus peuce) dhe rrobullit (Pinus heldreichii), të cilat shtrihen në lartësinë mbidetare prej 1500-1900m. Këto bashkësi më së miri janë ruajtur te Shtëpia e Stojkut dhe në Koxha Ballkan (Pisha e madhe). Ujrat e humbura (Gine Vode), Maja e Arnenit, Oshlak dhe Pashallarët.
5. **Vegjetacioni kalues shkurror i kërlekës së maleve të larta-** Përbërjet e kërlekës (Pinus mugo) jan të ruajtura vetëm në Koxha Ballkan, Oshlak dhe Ostrovicë ku kjo pishë paraqitet në formë të bashkësisë, ndërsa në pjesët ku nuk është kërleka janë të pranishme llojet tjera shkurrore, e në mes tyre dëllinja e Siberisë (Juniperus nana) dhe një lloj I rëndësishëm Rhododendron ferugineum (Rododendroni ngjyrë ndryshku ose trëndafili alpik), boronica (Vaccinium myrtilus), Bruckenthalia spiculifolia, Erica carnea etj. Kështu që kjo zonë është tejet e pasur me bashkësi të rëndësishme në mesin e të cilave bashkësia endemike Bruckhenthalion etj.



Foto:Nardus stricta (bar mali)

6. **Vegjetacioni barishtor dhe shkurror i maleve të larta-**Ky territor vegjetativ i livadheve dhe kullosave malore dhe të larta me sipërfaqe prej 16.170.00ha,është tejet i pasur me bashkësi të rëndësishmë bimore.Në kullosat e larta malore, ku shfrytëzimi bëhet në mënyrë ekstenzive, dominojnë bashkësitë e gjufkës (Nardus stricta), si pasojë e suksecionit negativ. Në veçanti të rëndësishme janë bashkësitë e bimëve të lartësive më të mëdha, ku me tepër dominojnë elementet e florës sarkto-alpike.Për nga aspekti fitocenologjik, në kuadër të kullosave të Malit Sharr duhet të dallohet territori i livadheve dhe kullosave malore sepse, pikërisht në këtë zonë faktori antropogjen historikisht me prerjen e drurëve ka ndikuar në ndrrimin e bashkësive të mëparshme,në esencë është ndërruar përbërja fitocenologjike.



Foto: Telekia speciosa(lloj bime barishtore)

Flora

Mali Sharr është njëri ndër malet më të begatshme të Gadishullit Ballkanik për sa i përket florës (afro 2500 lloje). Këtu ndodhen edhe një numër i madh i llojeve endemike dhe relikte (rreth 323 lloje bimore) siç janë psh: arneni i bardhë, (Pinus peuce), rrobulli (Pinus heldreichii), bresheu i rëndomt (taxus baccata), panja malore (Acer heldreichii), kërleka (Pinus mugo) si dhe Rododendra ferrigineum (Rododendroni ngjyrë ndryshku), ndërsa vlerë të veçantë kanë 20 lloje të bimëve stenoendemike:barpezmi i aleksandrit (Achillea alexandris regis), bornmulera e dieckit (Bornmullera dieckii), cerasti i Sharrit (Cerastium neoscardicum), karafili i Sharrit (Dinathus scardicus), draba e korabit (Draba korabensis), potential e doerflerit (Potentila doerfleri), krokusi i Sharrit (Crocus scardicus), bar peshku i Sharrit (Verbascum scardicolum),kokëz e shmukerit (Silene schmucheri), këmashna e Kobilicës (Hieraceum kobilicanum), Këmashna e Lubotenit (Hieraceum naegelianum sups. Lubotenicum), rrushqyqe (Sedum flexousum), etj.

Ndërkaq ndër llojet e rëndësishme të rajoneve të larta malore duhet përmendur llojet që janë të lidhura me malet e Europës jugore dhe të mesme (Alpe,Apenine,Karpate,Pirinej,Tatra). Prej këtyre llojeve do të ceken: troli europian (Trollius europaeus), zhabinorja malore (Ranuncullus montanus), zhabinorja tora (R. thora), zhabinorja ura-ura (R. cretanus), zhabinorja maledashëse (R. oreophytus), karafili pyjor (Dianthus silvestris), xërxelja alpine (Daphnea alpine) Rododendroni ngjyrë ndryshku (Rhododendron ferrugineum), draba e cunguar (Draba retush), shelgu fletëtopitur (Salix retush), shelgu i rrjetëzuar (Reticullate), empetri (Empetrum hermafroditum), driada tetëpetalëshe (Dryas octopetala), mlaka zvarranike (Geum reptans), mlaka malore (G. montanum), iriqëza gjethekunrejtë (Saxifraga oppositifolia), iriqëza arëtore (S. marginata), iriqëza si thonjë (S.aizoon), S. bryoides, S. tymosa, Gentiana pranverore (Gentiana verna), Genciana (G. nivalis), kulmaku i qarë tresh (Junkus trifidis), elyna myosuroides, presja (carex rupestris), C. curvula, C. foetida, C. tigra, (Presja e zezë), flokëza e vogël (Poa minor), tërshëra (Avena versicollor) dhe shumë lloje tjera.

Llojet bimore mjekësore –Mali Sharr është i pasur edhe me shumë bimë që kanë rëndësi mjekësore, ku vlejn të përmenden: barpezmi mijëfletësh (Achillea millefolium), rrush arushe (Arctostaphilos uva-ursi), helmarina (Atropa belladonna), lulebalsami (Hypericum perforatum), zhumbrica (Thymus serpillum), shtara e bardhë (Veratrum album), lloji i sarëzës (Gentiana punctata) etj.



Foto: Achillea millefolium(Barpezmi mijëfletësh, lloj bime barishtore)

Ndërsa në viset e ulta të Malit Sharr, si pasojë e depërtimit të klimës mesdhetare përgjatë Lumbardhit të Prizrenit dhe Grykës së Kaçanikut zhvillohen dhe jetojnë lloje të tjera siç janë: Salvia officinalis, ruta (Ruta divaricata), arrësi barëmajasëlli (Teucrium podium), ferrëmiu (Asparagus acutifolius), bafra (Pistacia terrebinthus), keleria e shëndritshmë (Koeleria splendens), Asineuma limonifolium, pendëkaposhi mesdhjetar (Stipa mediterannea),

parenticella gjethëgjërë (Parentucella latifolia), linaria e peliserit (Linaria pelliseriana), armiza e stërhapur (Thesium divaricatum), Derdhja (convolvulus elegantissimus), kokoqelli (Centaurea deusta), linaria (Linaria annua) e tjera.

Krejt kjo që u shkrua ,flet për rëndësinë e jashtëzakonshme që ka Mali Sharr në aspektin e biodiversitetit. Gjithashtu duhet ditur që ky fond i llojeve bimore do të pasurohet edhe më shumë me përparimin e hulumtimeve të ardhshme në “ Malin Sharr”.



Foto: Arctostaphyllos uva-ursi(rrush arushe)

Disa lloje bimore karakteristike në PN “Mali Sharr”

- Llojet e karafilëve:Dianthus scardicus, D. integer,D. gracilis
- Llojet e zhabinoreve: Ranuncullus incoparabilis
- Llojet e minuartes: Minuarta graminifolia, M. bosniaca, M. verna
- Llojet e sileneve: Silena saxifraga, S schuckerii, S. asterias
- Llojet e groshlave: Cardamine carnosa, C. barabaroides
- Lloji arabis alpine
- Lloji i kripshtit: Alysum corymbosum, A. scardicum
- Llojet e drabave: Drabakorabensis, D. scardica
- Llojet e vjollcave: Viola grisebachiana, V. gracilis, V, orphanidis
- Llojet e krimbsit: Sedum macelense, S. flexuosum, S. grisebachii
- Gurshpueset: Saxifraga scardica, S. porophylla, S. glabella
- Tërfilët: Trifolium pseudomedium,T. pingnathi, T. velanovsky
- Lloji panicica serbica
- Llojet e kromave: Knautia drymeia, K. dinarica
- Llojet e rrillpeshkut: Verbascum scardicollum, V. longifolium ramonda, Ramondia serbica
- Trumëzat: Thymus albanus, Th. Rholenae, Th. Jankae
- Lule zambaku: Lilium albanicum etj.
- **Tabela: Disa lloje të bimëve endemike në Malin Sharr**

Nr.	Familja/Lloji	Lulëzimi/ Frytet	Biotopi	Përhapja në P.N.	Përhapja e përgjithshme	Bimë endemike	Gjendja
	ASTERACEAE						
1	Achillea alexandri-Regis Bornm. Et Rud 1934(Barpezmi i mbretit Aleksander)	VII/VIII	Në vende barishtore dhe në pyllin e qetinakut(Achileo-Pinetum mugi) të zonës alpike me shkëmbijë gëlqeror	M. Sharr (Oshlak)	Kosovë	E Kosovës stenoendemik	Populacione të zhvilluara me areal të kufizuar
	BRASSICACEAE						
2	Bornmuellera dieckii Deg.1900(Bornmullera e Degenit)	VI-VII/VIII	Në vende shkëmbore serpentinore të zonës malore dhe subalpike	Ostrovicë (1500-1900m lmb.)	Kosovë	E Kosovës	e rrallë
	CARYOPHYLLACEAE						
3	Dianthus scardicus Wettst. 1892 (Karafili I Sharrit)	VI-VII/VIII	Në vende shkëmbore dhe me bar të zonës subalpike dhe alpike	M. Sharrit (Luboten, Prevallë)	Kosovë	E Kosovës	Populacione të rrezikuara
	CONVOLVULACEAE						
4	Convolvulus cochlearis Griseb.1844 (Dredhja e Kosovës)	VI-VII/VIII	Në vende me bar dhe dhe gurishtore të zonës kodrinore me natyrë serpentine.	Gorancë(territori I Hanit të elezit)	Kosovë	E Kosovës	E rrallë (bimë stenoendemike domosdo të mbrohet me ligj)
	CRASSULACEAE						
5	Sedum flexuosum Wettst 1892(Rrushqyqja e epshme)	VI-VII/VIII	Në vende shkëmbore, sidomos gëlqerore,të zonës subalpike	Luboten, Oshlak.	Kosovë	E Kosovës	E rrallë
	LAMIACEAE						
6	Micromeria albanica (Griseb. exK, Maly) Silic,1979 (Bishtmiu shqiptar)	VI-VII/VIII-IX	Në vende shkëmbore-gëlqerore të zonës kodrinore-malore	Lumbardhi I Prizerenit	Kosovë	E Kosovës	E rrallë (duhet të mbrohet me ligj)
7	Thymus albanus H. Braun 1892, (Listra shqiptare)	VI-VII/VIII-IX	Në vende të thata, shkurre, kullosa, pyje të zunës subalpike dhe alpike, në veçanti në substrate gëlqerore	Oshlak, Koritnik, Alpet shqiptare	!	E Ballkanit	Duhet të mbrohet me ligj
8	Thymus rochlenae Vel, 1903	VI-VII	Në kullosa, livadhe të zonës malore-subalpike	Oshlak	Kosovë	E Kosovës	Popullacione të rrezikuara
	LILIACEAE						
9	Lilium albanicum Griseb. 1845(Zambaku shqiptar)	VI-VII/VIII	Në vende të freskëta shkëmbore të zonës malore-subalpike	Malet e Sharrit Alpet Shqiptare	Kosovë	E Kosovës	Duhet të mbrohet me ligj
	ROSACEAE						
10	Potentilla calabra ten. 1811 (Zorrëca e Kalabrisë), (bënë pjesë në gr. Potentilla argentea P.W. Ball. Është lloj I ri për florën e ballkanit(Lloj endemik apenino-ballkanik)	VI-VII/VIII	Në shkëmbinjë acidik me prejardhje vullkanike në lartësi mbidetare rreth 2000m.	Malet e Sharrit(I konstatuar vetëm në lokalitetin Guri i zi, Restelicë)	Kosovë	E Kosovës	Meqë është specie me vetëm një lokalitet në ballkan duhet kujdes I posaçëm
11	Potentilla doerfleri Wettst. 1892 (Zorrëca e Dorflerit)	VII-VIII/IX	Në vende me bar dhe shkëmbore të zonës alpike.	Malet e Sharrit (Bistra, Maja e zezë)	Kosovë	E Kosovës	Rritet në grupe të mëdha, por është e

							rrallë dhe e rrezikuar, duhet të mbrohet me ligj
	SAXIFRAGACEAE						
12	Sxifraga scardica Griseb. 1843 (iriqëza e Sharrit)	VI-VII/VIII-IX	Në shkëmbinjë të zonës alpike	Koritnik, Alpet Shqiptare(Leqinak, Koprivnik etj.)	Kosovë	E Kosovës	Populacione të rrezikuara
13	Verbascum scardicolum Bornm. 1922. (Barpeshku I Sharrit)	VI-VII/VIII	Në kullosa e shkurre të zonës subalpike	Oshlak	Vetëm në Kosovë	E Kosovës	Populacione të rrezikuara
	VIOLACEAE						
14	Viola gracilis Sib. Et Smith. 1806 (Vjollca barishtore)	VI-VII/VIII	Në kullosa të zonës alpike	Malet e Sharrit	Kosovë	E Kosovës	Lajmërohen në gr. të vogla ose të mëdha



Foto: Draba korabensis (bimë stenoendemike)



Foto: Achilleo Aleksandri Regis




Foto: MIcromeria albanica



Foto: Convolvus cochlearis

Kjo pasuri floristike e Malit Sharr kërkon që seriozisht të mendohet dhe punohet në mbrojtjen e kësaj mrekullie të natyrës, dhe sidomos llojeve endemike të cilat në veçanti janë të rrezikuara

nga faktori antropogjen. Sa për ilustrim po përmendim se prej numrit të përgjithshëm të llojeve vaskulare të evidentuara në Malet e Sharrit (afro 1800 lloje), 86 lloje janë shpallur ndërkombëtarisht të rëndësishme, 26 lloje janë të përfshira në listën e kuqe të Evropës, ndërsa sipas IUCN-së, 32 lloje që gjenden në Malet e Sharrit janë në listën e kuqe të bimëve të kërcënuara.



Spektri floristik I llojeve bimore të Sharrit me status ndërkombëtarë të mbrojtur

.

Fauna e Sharrit

Territori i "Malit Sharr"me biotopet e ndryshme është shumë i pasur me faunë. Në të ka lloje të ndryshme të shtazëve, të cilat janë të veçanta dhe ekskluzivisht janë të lidhura me biotope specifike, që d.m.th. se përhapja e tyre është shumë e kufizuar dhe i përkasin llojeve endemike. Ndërsa ka lloje të cilat kanë areal më të gjërë të përhapjes. Fauna e Sharrit deri sot nuk është edhe aq e hulumtuar, mirëpo në bazë të të dhënave të literaturës mund të konstatohet se fauna e Sharrit përbëhet prej: 7 lloje peshqish, 9 lloje amfibesh, 10 lloje reptilësh, 154 lloje shpendësh dhe 30 lloje gjitarësh.

Peshqit(Pisces)

Territorin e Sharrit e karakterizojnë rrjedhjet e përroskave dhe lumenjve malorë që i takojnë derdhjes së lumit Lepenc, që derdhet në detin Egje dhe derdhjes së lumit Lumbardh të Prizerenit, në Adriatik. Në bazë të njohurive të gjertanishme në rrjedhat e këtyre lumenjve jetojnë këto lloje të peshqëve: trofta e përroskave (Salmo trutta m. faro L.), mustaku i përroskave (Barbus fluviatilis Ag.), ngjala (Anguilla vulgaris), mlyshi (Esox Lucius), krapuliqi, krapi (Cyprinus carpio), perka (Perca fluviatilis).



Foto: Trofta e përroskave (Salmo trutta m. fario L.)

Ujëtokësorët (Amphibia)

Në Malin Sharr jetojnë këto lloje të ujëtokësorëve: Picrraku (Salamandra maculosa), Picrraku i zi (Salmandra atra), triton i zakonshëm (Triturus vulgaris), thithëlopa (Bufo bufo), thithëlopa e gjelbër (Bufo viridis), gargaliqi (Hyla arborea), bretkosa e pyllit e kuqërremët (Rana temporaria), bretkosa kërcimtare (Rana dalmatina), bretkosa e përrenjve (Rana graeca).



Foto: bretkosë nga Mali Sharr (Rana graeca)



Foto: Picrraku (Salamandra maculosa)

Zvarranikët (Reptilia)

Breshkujza (Emys orbicularis), breshka tokësore (Testudo graeca), hardhuca e gjelbër (Lacerta viridis), Hardhuca e mureve (Lacerta muralis), hardhuca e përhimë (Lacerta agilis), gjarpëri i madh i ujit (Natrix natrix), gjarpëri i vogël i shiut (Natrix tesselata), nepërka (Vipera ammodytes), nepërka e malit (Vipera berus), kokëzogëza (Anguis fragilis).



Foto: Breshka (Testudo graeca).



Nepërka e malit (Vipera berus),



Hardhuca e gjelbër (Lacerta viridis).

Shpendët (Aves)

Janë të përhapura në të gjitha biotopet, ku jetojnë mbi 200 lloje, ndërsa numri i llojeve dhe populacioneve të tyre tejkalon të gjitha klasët tjera të faunës përveç insekteve. Shpendët hasen në të gjitha anët e Sharrit. Shpendët më të përhapur janë: pulegra e madhe (Tetrao urogalus), borsi i borës (Montifrigilla nivalis), shqiponja kryqëzare (Aquilla heliaca), shqiponja e përhimët (Aquila chrusaetos), shqiponja e maleve (Hieraetus fasciatus), vulturida (Gyps fulvus), huti i madh (Bubo bubo),skifteri i përhimtë (Falco peregrinus), skifteri malor (Falco biarmicus), pula e pyjeve (Tetrastea bonasia), fëllënëza e gurëve (Alectoris graeca), petriti i pulave (Accepiter gentilis), Gypaetus barbatus, dallëndyshja e natës (Caprimulugus europeus), lauresha e pyjeve (Lullula arborea), etj.

Në bazë të dispozitave të unionit ndërkombëtar mbi mbrojtjen e shpendëve “Sharri” duhet të mbrohet si ornitorezervat.



Foto: Gypaetus barbatus (Shqiponja-Orli)

Rendi	Fam.	Lloje
Falconiformes	2	26
Galliformes	1	6
Charadriformes	3	6
Columbiformes	1	5
Coculiformes	1	1
Strigiformes	2	8
Caprimulgiformes	1	1
Apodiformes	1	1
Coraciformes	4	4
Piciformes	1	10
Passeriformes	22	86
Gjithsej	39	154

Tab. Ornitofauna e Sharrit në taksone

GJitarët (Mammalia)

Fauna e gjitarëve të Sharrit përfaqësohet me të gjitha llojet të cilat jetojnë në Kosovë, si dhe me disa të cilat me ekologjine e tyre janë të lidhura ekskluzivisht me biotopet e viseve të larta malore, ndërsa llojet tjera janë të përhapjes së gjërë. Në Malin Sharr jetojnë edhe lloje endemike të gjitarëve.

Insektngrënësit (Insectivora)-Iriqi (Erinaceus europeus), urithi (Talpa europeae), rrëmihësi i rëndomtë (Sorex araneus).

Brejtësit (Rodentia)- Lepuri i fushës (Lepus europaeus), miu bizam (Ondatra zibethica), miu i fushës (Arvicola terrestris), miu i shtëpisë (Mus musculus), miu me vija (Apodemus agrarius), miu i pyllit (Apodemus silvaticus), gjeri I madh (Glis glis), gjeri i lajthive (Muscardinus avellanarius), ketri (Scirius vullgaris), qeni i verbër (Spalax monticola), Circetus vulgaris, Circetus circetus, Castor fiber.

Mishngrënësit (Carnivora)-Rrëqebulli (Lynx lynx), ariu i murmë (Ursus arctos), ujku (Canis lupus), dhelpra (Canis vulpes), macja e egër (Felis silvestris), baldosa (Meles meles), zardafi (Martes martes), fishnjari (Martes foina), lundërza (Lutra lutra), bukla e vogël (Mustela nivalis), qelbësi (Putorius putorius)



Foto: Rrëqebulli (Lynx lynx)

Jopërtypësit: derri i egër (Sus scrofa).

Ripërtypësit: kaprrolli (Capreolus capreolus), dhia e egër (Rupicapra rupicapra).

Në Malin Sharr jetojnë edhe lakuriqët (Chiroptera), të cilët deri tani nuk janë studiuar,prandaj nuk dihet numri i llojeve të cilat jetojnë aty.

Insektet

Në aspektin e numrit dhe shumëllojshmërisë, insektet janë dominues në Parkun Nacional.Në veçanti janë hulumtuar fluturat nga të cilat deri më tani janë identifikuar 147 lloje, nga të cilat ndër më të rëndësishmet janë 12 lloje Lepidoptera, duke përfshirë edhe 3 lloje endemike të familjes Carabidae, gjithashtu shumë lloje të rralla i takojnë familjeve Plecoptera, Odonata, dhe Heteroptera.[3]

Lirisht mund të thuhet se për nga aspekti i shumëllojshmërisë së fluturave, midis të cilave ka edhe lloje endemike, Mali Sharr është i pakrahasueshëm në Ballkan e bile edhe në Evropë.



Foto: Flutura fushore (Boloria titania)

Insektet ujore-Përkrah specieve shumë të shpeshta janë identifikuar edhe specie të rralla në lumenjtë e Malit Sharr siç janë psh: Limnephylus petri i gjetur në lumin Brod të Dragashit është një specie endemike e Ballkanit që gjendet vetëm në Kosovë (në rrjedhën e sipërme të lumit Brod) dhe në Bullgari.

Genus trianodes me specien e tijë dyngjyrëshe të gjetura në liqenin e Breznës është i pari dhe i vetmi i kësaj specie në Kosovë deri më tani.

Ekziston një potencial i madh për insekte të tjera ujore të natyrës endemike dhe paraqitet nevoja për një studim më serioz në këtë drejtim.



Foto: Limnephylus petri

[3] Feasibility Study: SHARR/ SAR PLANINA-KORAB-DESHAT/DESAT

Rezervatet strikte natyrore

Në kuadër të Parkut nacional “Mali Sharr”ekzistojnë këto zona me status të rezervatit të mbrojtur:Koxhaballkani (Pisha e madhe), Oshlaku, Maja e arnenit (Prevalla) dhe Rusenica.

1. **Maja e Arnenit (KK Prizren)-**përbëhet nga pyjet e pastërta të Rrobullit (Pinetus heldreichi),gjendet në Prevallë (pjesa lindore e oshlakut).Këto pyje bëjnë pjesë në pyjet e llojit endemik dhe relikt terciar.Ky rezervat kërkon trajtim të veçantë për ruajtjen e vlerave (pas zjarrit që kaploi atë pyll), përndryshe do t’i humb vlerat si rezervat natyrorë. Pjesa prej 30ha në vitin 1960 është shpallur rezervat strikt natyror. Në pjesën lindore të zonës, nën pyjet e rrobullit, gjendet bashkësia pyjore e ahut (Fagetum montanum).
   Zona e pyjeve të rrobullit është e pasur me bimë endemike, nga të cilat veçohen: bar peshku I Sharrit (Verbascum scardicolum-st. end.), gentiana (Gentiana lutea var. albanica), karafili i kartusianëve (Dianthus cartusonarum), karafil shkëmbinjsh (Dianthus integer), lazërpicë (Lazerpitium sp.), lule kambanë shqiptare (Campanula albanica), lisra shqiptare (Thymus albanus), lule kambana (Campanula foliosa), bar peshku i nikolait (Verbascum nikolai), sarushta e Sharrit (Stachys scardica), manushaqja e Zoisit (Viola zoisii), manushaqja e grisebahut (Viola grisebachii), efilobi gjethengushtë (Ephilobium anagallidifolium), brinjëkau trajtë kose (buplenium subthorpianum), fiteuna rrethore rreme (Phytenua pseudoverbicullare), tërfili I velenovskit (Trifolium velenovskyi), presja e lëpirë (carex leavis), syviqe e karpateve (Anthemis carpatica), esparceta e Sharrit (Oenobrychis scardica), antili i praruar (Anthylis aurea), doronika e Orfanidit (Doronicum orphanidis), lulekambana shpatullore (Campanula spatulata), barzgjebe e dyshimtë (Scabioza dubia), potential e bukur (Potentilla specioza), qenëbytësja e huterit (Cynanchum huteri), asteri alpik(Aster alpinus), arenaria dylulëshe (Arenaria biflora), cerasti i sulbët (Cerastium decalvas), etj. Zona është e pasur me lloje të shumta të kafshëve të egra (mammalia) dhe shpendëve (ornitofauna). Ndër më të rëndësishmet janë: rroqebulli (Lynx lynx), ariu i murmë (Ursus arctos), kaprolli (Capreolus capreolus), dhelpra (Canis vulpes), derri i egër(Sus scrofa), macja e egër (Felis sylvestris), vjedulla (Meles meles), shqarthi i artë (Martes martes), fishnjari (Martes foina),lepuri (Lepus europeus), etj. Shpendët më të rëndësishëm janë: shqiponja e përhimtë (Aquila chrusaetos), shqiponja minjngrënëse (Buteo buteo), skifteri malor (Falco biarmicus), skifteri i përhimtë (Falco peregrinus), pula e pyjeve (Tetrastes bonasia), thëllëza e gurit (Alectoris graeca), huti i madh (Bubo bubo), borsi i borës (Montifrigilla nivalis), stërqoka (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Pyrrhocorax graculus, Prunera collaris, Tichodroma muraria, etj. Kjo prani e shumtë e shpendëve vërteton se zona paraqet habitat dhe rezervat të rëndësishëm për ornitofaunë.

2. **Oshlaku (KK Prizeren)-**është i pasur me pyje të pastërta të rrobullit.Mali Oshlak është i pasur me bimë të shumta endemike.Karakteristikë e veçantë në kodrën e Oshlakut është lloji stenoendemik Achillea alexandri-regis që gjendet kryesisht në pjesët e larta malore ku me llojin tjetër endemik të Ballkanit qëndror Onobrychis scardica formon fitocenozën specifike Achilleo alexandri regis-Onobrychis scardica. Nga llojet tjera endemike veqohen: hiliantema e thinjur (Helianthemum canum), karafili i Sharrit (Dianthus scardicus), karafili i gurit (Dianthus integer), shmanga shqiptare (Crepis albanica), lisra shqiptare (Thymus albanus), edrianti gjethbari (Edrianthus graminifolia), brinjëkau i Karglit (Bupleurum karglii), alkana e Sharrit (Alcanas scardica), asteri alpin (Aster alpinus),etj. Vlenë të përmenden me këtë rast bashkësitë bimore: Achileo-Pinetum mugo (Pinetum mugo calcicolum) che Achilleo alexandri-regis. Nga fauna e begatshme veçohet dhia e egër (Rupicapra rupicapra), e cila gjendet në kullosat më të larta të Oshlakut, ndërsa përhapje më të madhe kanë: ariu i murrmë, ujku, kaprrolli, shpendë të ndryshëm grabitqarë etj.
3. **Pisha e Madhe (KK Prizeren)-**është lokalitet ku ndodhen pyje të pastra të Rrobullit (Pinetum heldreichi). Ky rezervat shtrihet në shpatiet juglindore të Koxha Ballkanit ku gjenden pyjet e vjetra të Rrobullit të cilat formojnë bashkësinë bimore Seslerio autumnalis-Pinetum heldreichi, të cilat paraqesin kompleksin më të bukur dhe më interasant të pyjeve të arnenit në Gadishullin Ballkanik. Pjesa prej 35ha është shpallur si rezervat strikt qysh më 1960, ndërsa zona e 1-rë me propozimin e ri përfshin sipërfaqet e pyjeve të ruajtura të rrobullit në pjesët lindore të kompleksit Pisha e Madhe. Zona është e pasur me lloje të shumta të florës të cilat kryesisht janë kosmopolite (kanë përhapje të gjërë në PN). Vlerë të veçantë kanë lloji endemik Sedum flexiosum si dhe llojet me karakter mjekues, siç janë: ushojëza pa kërcell (Carlina acaulis), genciane e kryqëzuar (Gentiana cruciata), bari i ethes (Centaurium erytrea), rigoni i zakonshëm (Origanum vulgare), trëndafili shajakor (Rosa tomentosa), zorrëca e përhimtë (Potentilla tormentilla), dëllinja e rëndomtë (Juniperus comunis), dëllinja e regjur (Juniperus nana), etj.
4. **Rusenica (KK Suharekë)-**Shtrihet në pjesën veriore të Parkut me sipërfaqe rreth 270ha dhe ka veçori të veçanta floristike dhe faunistike. Është vendbanim i rrëqebullit ballkanik (Lynx Lynx balcanicus) i cili është lloj i rrallë dhe i rrezikuar si dhe kafshëve të tjera të egra (ariu i murrmë, kaprolli, dhia e egër etj.). Me qëllim të mbrojtjes së vendbanimit të rrëqebullit, i cili në vitet e 90-ta ka numëruar rreth 13 copë,Rusenica është shpallur rezervat qysh në vitin 1955 dhe njëherësh është rezervati më i vjetër natyrorë në Kosovë. Ky lokalitet është i rëndësishëm edhe nga aspekti peisazhor dhe floristik ku dallohet lloji i panjës malore(Acer heldreichi), si dhe shumë bimëve tjera endemike si:Bornmullera dieckii, Potentila argentea, Pilygala doerfleri, Ramonda serbica, Acer heldreichi, Achillea holysolucea, Hieraceum ëeldsteini, Galium rupestre,

Daphne oloeides, Pinus heldreichii, Srophularia bosniaca, Minuartia baldaci, Achillea ageratifolia, Erysimum Silvestre, Aetionema saxatile, Eryngium palmatum, Sylibum marianum, Camapnula secundiflora, Onosma echioides, Alyssum repens, Lamium garganicum, Coridalis oreoluca, etj. Kjo zonë ka edhe shumë fitocenoza (Bashkësi bimore), ku më të përhapurat janë: Pyjet e ahut dhe bredhit (Abieti fagetum), pyjet e ulëta të mëllezës dhe frashnit të zi (Orno carpinetum), dhe dy bashkësi të rralla dhe specifike: bashkësia e bornmullerës me rrobullin (Bornmullero-Pinetum heldreichii) dhe Daphno-juniperetum oxicedri, (bashkësia në gëlqeror-dollomit e cila deri më tash është e paverifikuar për shkencën e botanikës). Në mbrendinë e këtij rezervati ndodhet edhe Shpella e Matosit, ndërsa për të ardhmen mbetet që statusi I këtij rezervati të pranohet edhe ndërkombëtarisht.

Zonat me vlera të veçanta natyrore të propozuara për rezervate

Ne kuadër të Parkut Nacional“Mali Sharr” ka disa zona me vlera të veçanta natyrore,të cilat do të duhej të hynin në kategorinë e rezervateve strikte:

1. **Pashallarë (Ostrovica)-**lokalitet i maleve të larta (1600m deri 2092m).Ky masiv malor veçohet me fondamentet gjeologjike nga serpentina në të cilën zhvillohen vegjetacionet e rralla dhe specifike të majave të larta.Në shpatiet veriore dhe veriperëndimore të Pashallarës,gjenden bashkësitë e rralla pyjore,ku në pjesët e ulta veçohen bashkësitë në rrobull: Junipero-Pinetum heldreichii(Bruckenthalio-Pinetum heldreichii),Pinetum-heldreichii serpentinicolum, Pinetum-heldreichii peucis scardicum si dhe bashkësitë e ahut në serpentinë.Mbi këtë bashkësi e deri te majat më të larta ,gjendet vegjetacioni specifik në serpentinë i hartinës Pinetum mugo serpentinicum.Këtyre bashkësive të përmendura vlerë edhe më të madhe u jep lloji endemik Bornmuellera-dieckii.Pyjet e rrobullit në serpentinë paraqesin fenomen të veçantë natyror në vegjetacionin e Ballkanit, sikurse edhe bashkësitë e hartinës në serpentinë që janë shumë të rralla. Kjo zonë është e pasur me mbi 100 lloje të bimëve endemike, ku veçohen: Bornmuellera dieckii, Cerastium neoscardicum, Lazerpitium siler, Lilium albanicum, Pinus heldreichii, Pinus peuce, Pinus mugho, Taxus bacata Campanula albanica, Campanula foliosa, Stachys scardica, Cnautia dinarica, Ranuculus incoparabilis, Cicerbita pancici, Salix herbace, Rumex scutatus, Silene pusila var. albanica, Barbarea longosestris, Cardamine carnosa, Alysum scardicum, Sedum flexiosum, Pancicia serbica, Bupleurum karglii, Carum rupestre var. albanicum, Centaurea kosanini, Campanula moesiaca, Dianthus gracilis, Dianthus integeri, Sedum serpenicum, Antylis vitelina, Onobrychis pindicola, Lamium pictum, Thymus rohlenae, Pinguicula balcanika, Pinguicula lanceolata, Asperula doerfleri, Saxifraga serpervivum, Saxifraga tygetea, Linaria peleponisiaca, Melanpyrum scardicum, Pedicularis grisebachii, Scrophularia aestivalis, Lunaria teleciana, etj.

2. **Kopilica-**është rajon gëlqerorë i maleve të larta, me florë dhe faunë mjaft të rrallë.Masivi gëlqeror me vegjetacion të rrallë kalcifil dhe hezmofitë[4],ku veqohet lloji Hieracium kobilicanum. Në këtë zonë ka shumë bimë endemike siq janë: Hieracium kobilicanum, Silene schmucheri, Rumex nivalis, Salix herbacea, Dinathus superbus, Viola grisebachiana, Erigeron uniflorus, Saussurea alpine, Lilium albanicum. Nga fauna më e njohura është dhia e egër (Rupicapra rupicapra).
3. **Rajoni i burimit të lumbardhit-**është Cirku silikat akullnajor i maleve të larta dhe me dy liqej të vegjël. Shtrihet në pjesën jugore të parkut, në kufi me Maqedoninë, kah ajo qëndrore me teritor prej 304ha. Ky regjion karakterizohet me vlera të posaqme ekologjike,gjeologjike, biologjike dhe peisazhore.
   Në kuadër të këti rezervati gjendet rrjedha e epërme e lumbardhit të Prizerenit,dy liqej (të Gornjasellës) me gjurmë të qarta glaciale dhe me florë të pastër endemike ku veqohen llojet:Pinguicla balcanica, Alysum scardicum,Crocus scardicus dhe reliktet glaciale Anemone narcissiflora dhe draba doerfleri etj.
4. **Luboteni-**është maja më e lartë në pjesën lindore të Malit Sharr në lartësi mbidetare 2496m. Është karakteristike se përbërja gjeologjike e tijë është kryesisht gëlqerore, e që kjo e bën të dallohet nga pjesët tjera zingjirore me përbërje gjeologjike nga silikati. Në kuadër të florës këtu gjenden dhe janë konstatuar 649 lloje të bimëve vaskulare të grupuara në 81 familje në mesin e të cilave ka edhe lloje të rralla. Ndërsa sa i përket vegjetacionit janë konstatuar 21 asociacione bimore (fitocenoza) të rralla bimore të karakterit subalpik dhe alpik.
   Ndër fitocenozat më të rëndësishme veqohen Carex laevis-Helian themum, në kuadër të cilës gjenden reliktet glaciale Dryas octopetala,Linaria alpine, Sideritis scardica, Hieracium naegelianum sups. Lubotenicum, e cila ka rëndësi ndërkombëtare. Prezente janë edhe Drypetum linaeanae, Salicetum retusae reticulate, Trifolieto norici-Caricetum hirtae, Potentilio-Fumarietum bonapartei, Centaureo-Trifoliotum velenovski, Senecieto-Rumicetum alpine, Telekietum speciosae, Orphanideo-Cirsietum apoendiculati, Onobrychidi-Festucetum, Geranieto-Poetum violaceae etj.
   Nga bimët më të njohura endemike do të veqojmë: Achilea ageratifolia var aizooni, Scabioza portae, Centaurea kosanini, Euphorbia glabriflora, Cirsium appendiculatum, Astrogalus vesicarius, Draba scardica, Genista hassertiana, Thlaspi bellidifolium, Salvia reinerti, Alysum cuneifolium, Salvia scardica, Alysum markgrafii, Thymus albanus, Dianthus microlepis, Thymus lykae, Dianthus scardicus, Plantago reniformis, Minuartia baldacii, Armeria canescens, Silene roemeri, Ranunculus millefoliatus, Silene sendtneri, Asperula dorfleri, Fumana bonapartei, Saxifraga sempervivum, Helianthemum

[4] Bimë të adaptuara për jetë në tokë të varfër dhe të pa zhvilluar.

balcanicum, Linaria peloponnesiaca, Convolvulus cochlearis, Melampyrum scardicum, Sedum flexuosum, Veronica satureiondes, Sedum serpentine, Viola aetolica, Knautia midzorendsis, Carex laevis, Lilium albanicum, Carex nigra, Crocus kosanini etj.
Zona është e varfër me lloje të faunës. Kryesisht shfrytëzohet si kullosë për dhitë e egra dhe nga shpendët grabitqar si shqiponja e përhimtë (Aquila Crysaetos), skifteri i përhimtë (Falco peregrinus), shqiponja minjëngrënëse (Buteo buteo) etj.




Foto: Pamja e Lubotenit nga pjesa verilindore e qytetit të Kaçanikut.

5. **Livadhi i mbretit-Liqeni i Jazhincës (Bistra)-**shtrihet në pjesën shkëmbore të Maleve të Sharrit nën Majen e Bistrës. Në vete përmban rreth 975ha dhe Përveq Liqenit (me gjatësi 120m, gjërësi 80m dhe thellësi 11m), në këtë zonë gjinden edhe këto lokacione: Livadhi I Mbretit, Ujrat e humbur, Bistra dhe Quka e liqenit. Kufiri jugorë përputhet me ate te Maqedonisë, me lartësi mbidetare 1500-2640m. Kjo zonë karakterizohet me vlera të veqanta floristike, faunistike, gjeomorfologjike, gjeologjike, hidrologjike dhe fitocenologjike ku vlen që të përmenden këto bashkësi bimore:Fagetum Montanum,Seslerio automnalis-Pinetum heldreichii, Ajugo-pinetum peucis etj.Në pjesët më të larta të këti lokaliteti gjenden këto bashkësi:Rhododendron-Pinetum peucis, një lloj dëllinje (Juniperus sp.) etj.Ndërsa në pjesët e epërme bashkësitë bimore barishtore si Ranunculetum crenati scardicum dhe Potentillo doerfleri-Juncetum trifidi.Këto bashkësi kanë vlera shkencore dhe edukative. Kjo zonë karakterizohet me shumë lloje bimore endemike, nga të cilat dallohen: Rrobulli (Pinetum heldreichii), Arneni (Pinus peuce), Dredhaku (Pinus mugo), Panja malore (Acer heldreichii), Drandafili alpik (Rhododendron Ferugenum), Vaccinium ulignosum, Draba korabensis (stenoendemik), Potentilla doerfleri (stenoendemik), Dianthus scardicus (stenoendemik), Dinathus superbus, Phyteuma confusiumi, Narthecium scardicum,

Lilium albanicum, Carex foetida, Diphasium alpinum, Empetrum hermaphroditum, Salix herbacea, Salix reticulate, Rumex nivalis, Silene Ëaldsteini, Silene rupestris, Silene rupestris, Silene asterias, Hesperis dinarica, Rhodiola rosea, Saxifraga bryoides, Saxifraga cymosa, Saxifraga androsacea, Geum reptans, Epilobium anagallidifolium, Veronica alpine, Cryptograma crispa, Veronica aphylla, Potentilla montonegrina, Pancicia serbica, Plantago gentianoides, Sanëza (Gentiana punctata)-bimë mjekuese e rrezikuar, etj.
Zona është e pasur edhe me shumë lloje shtazore, e sidomos të kafshëve të egra (mamalia), ku vlen të përmenden: dhia e egër (Rupicapra rupicapra), ariu I murrmë (Ursus arctos), ujku (Canis lupus), kaprolli (Capreolus capreolus), dhelpra (Canis vulpes),derri I egër (Sus scrofa), macja e egër (Filis syslvestris), vjedulla (Meles meles), shqarthi i artë (Martes martes), lepuri (lepus europeus).
Ornitofauna është gjithashtu mjaft e pasur ku vlen të përmenden: pulegra e madhe (Tetrao urgallus), thëllëza e gurit (Alectoris graeca), pula e pyjeve (Tetrastes bonasia), skifteri malor (Falco biarmisus), shqiponja e përhimtë (Aquila chrysaetos), shqiponja minjëngrënëse (Buteo buteo), huti pyjor etj.
Vlerë të veçantë kësaj zone i jep liqeni glacial i jazhincës i cili gjendet në pjesën shkëmbore të qukës së liqenit në lartësi mbidetare mbi 2000m. Fenomen në vete paraqet edhe humnera e disa përrockave në brendësi të tokës që grumbullohen në lokacionin gëlqeror Ujrat e Humbur.



Foto: Liqeni glacial i jazhincës

Gjendja mjedisore dhe e resurseve natyrore të Parkut

Gjatë vlerësimit të gjendjes janë analizuar ndikimet dhe pasojat e faktorëve biotik (njeriu, insektet dhe sëmundjet bimore) dhe abiotik (zjarret, fatkeqësitë natyrore: era, bora etj.) në florën, faunën dhe ekosistemet e Parkut Kombëtar. Në monitorimin e gjendjes rrol të veçantë ka Instituti i Kosovës për mbrojtjen e natyrës (IKMN), i cili monitoron biodiversitetet në zonat e mbrojtura.

Degradimi i pyjeve, është më e shprehura si dukuri negative, ku si shkaktar kryesor janë prerja ilegale dhe zjarret. Kështu pyjet e rrobullit që shtrihen në pjesën e Oshlakut, Koxhaballkan dhe Pashallare me sipërfaqe prej 10% janë të dëmtuara si pasojë e zjarrit pyjor të vitit 2000 dhe 2007 si dhe zhvillimit intenziv të insekteve dëmtues (nënlivorësve të pishës Blastophagus sp.) që janë shfaqur në mënyrë masive pas zjarreve si rezultat i dobësimit të imunitetit të drunjve të dëmtuar. Në këtë kuadër tërësisht dhe pjesërisht të dëmtuara janë 4,5% ose rreth 100ha, Ndërsa sipërfaqet me pyje të ulta dhe shkurre janë të dëmtuara për 45% si pasojë e prerjes së pakontrolluar. Në pjesët më të dëmtuara të këtyre pyjeve, në veçanti në Prevallë, ka filluar në mënyrë intensive zhvillimi i filizave të shelgut të egër (Salix caprea) i cili zakonisht del pas zjarreve pyjore.Ky lloj drunor nuk ka vlerë ekonomike dhe shkencore.Gjithashtu është edhe një zhvillim i madh i bimëve barishtore në veçanti epilobit gjethengushtë (Epilobium angustifollium), i cili e pengon ripërtëritjen e rrobullit. Një përmirësim i gjendjes së pyjeve të rrobullit në aspektin shëndetësor dhe të ripërtritjes natyrore, kohëve të fundit është vërejtur në Oshlak (rajoni i Prevallës) si pasojë e ndërmarrjes së pastrimeve sanitare të drujve të tharë, të kalbur, dhe të infektuar nga nënlivorësit (blastophagus sp.) dhe fitopatogjenet e kalbjes (kërpudhat). Këto ndërhyrje janë bërë në pyjet e rrobullit që gjenden në zonën e dytë të mbrojtjes, jashtë zonës strikte natyrore Maja e Arnenit.[5]





Foto: Drutë e infektuar nga nënlivorësit Foto: Pyjet e djegura të rrobullit në zonën e pishës së madhe

[5] Raport për gjendjen e mjedisit 2011-2012 Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor Prishtinë 2013

Gjendja e pyjeve të arnenit (Pinetum peucis) është më e mirë. Këto pyje kanë ripërtritje të mirë në habitatet e tyre në Ujërat e humbur dhe Pashallare, ku janë duke e zgjeruar sipërfaqen dhe krijuar përbërje të reja pyjore.

Pyjet e ahut (Fagetum montanum, F. subalpinum)- të cilat kanë përhapje më të gjërë (afër 65%) në Parkun Kombëtar është relativisht e mirë. Dëmet shkaktohen kryesisht nga era dhe bora si dhe prerjet ilegale të cilat janë në rënje e sipër. Dëme më të mëdha nga prerja ilegale ka pasur në komunat e Shtërpcës dhe Kaçanikut, ngaqë këto dy komuna nuk menagjohen nga drejtoria e Parkut Kombëtar.

Në rajone të ndryshme të pyjeve të ahut vërehet prania e faktorëve fitopatologjik (sëmundjet bimore), nga të cilët veçohen tumori i lëvores (Nectria ditissima) dhe kërpudha e kalbjes (Fomes fomentarius).



Foto: Kërpudha e kalbjes (Fomes fomentarius)



Foto: Tumori i lËvores (Nectria ditissima)

Dëme të konsiderushme nga zjarri kanë pësuar pyjet e hormoqit në Pashallare që shtrihen në komunën e Shtërpcës (janë djegur mbi 5ha të këtyre pyjeve) dhe pyjet e ulta si dhe shkurret e shkozës dhe frashërit të zi dhe kulturat e pishës në Oshlak ku janë djegur rreth 50ha. Shkaktarët e këtyre zjarreve janë njerëzit e pandërgjegjshëm.



Foto: Zjarri në Oshlak (gusht 2011)

Gjendja e ekosistemeve më të rëndësishme shkurrore- dredhakut (Pinus mugo), dëllinjës së Siberisë (Juniperus nana), dhe boronicës (Vaccinium myrtillus dhe V. uliginosum), është e mirë me dëme të vogla nga zjarret . Ndërsa gjendja e bimëve barishtore është e mirë dhe e qëndrueshme. Disa nga llojet e rralla të bimëve mjekësore janë të rrezikuara nga njerëzit e papërgjegjshëm siç është sanëza (Gentiana lutea), e cila ka vlera të veçanta mjekuese dhe mbijetesa e saj është mjaft e rrezikuar.



Foto: Sanëza (Gentiana lutea) bimë mjekuese e rrezikuar



Foto: Burnmullera dieckii- Bimë stenoendemike

Gjendja e Faunës- në bazë të raportit të IKMN-së vlerësohet si relativisht e mirë. Numri i shumicës së kafshëve është në rritje përveç rrëqebullit dhe shqiponjës së përhimtë që janë ende në numër të vogël. Edhe gjendja shëndetësore paraqitet të jetë e mirë ndërkaq rrezik permanent për këto kafshë paraqet gjuetia ilegale. Riprodhimi natyror është i kënaqshëm sidomos i ariut të murmë dhe ujkut.



Foto: Lynx lynx i rrezikuar



Ursus arctos-me zhvillim te mirë




Canis lupus- zhvillohet mirë

Degradimi i tokës- është i shprehur në kuadër të parkut dhe përreth tij edhe në shfrytëzimin e tokës për përpunimin e mëtutjeshëm të materialeve të ndryshme (gurëthyeset). Kjo formë e intervenimit është shumë e dëmshme për shkak se: dëmton konfiguracionin e terenit, e shkatërron peisazhin dhe çka është më me rëndësi ndikon në largimin e florës dhe faunës nga ai territor.

Zonat e rrezikuara nga erozioni – Harta erozive tregon se në Malin Sharr përfshihen disa sipërfaqe nga erozioni me shkallë të ndryshme të intenzitetit. Sipërfaqet me erozion shumë të fortë 6% ose 1.400ha dhe erozion të fortë me 24% ose 5.600ha.

Zonat që nuk janë të mbuluara me vegjetacion bien në ndikim të faktorëve ekzogjen nga alterimi fizik, kimik dhe biologjik dhe në këtë mënyrë shkaktohet rritja e shkallës së erozionit.

Bartja dhe akumulimi i materialit eroziv ndahet në dy pellgje kryesore lumore: Lepenci në drejtim të rrafshit të Kosovës dhe Lumbardhi i Prizrenit në drejtim të Rrafshit të Dukagjinit.Në shkallë të lartë të erozionit janë të rrezikuar rreth 25% të teritorit të Malit Sharr.



▶ Harta :Kategoritë erozive në Parkun Nacional "Mali Sharr"

Harta: Kategoritë erosive në Parkun Kombëtar “Mali Sharr”


Zgjërimi i Parkut Kombëtar “Sharri”

Duke u nisur nga shumë ngjashmëri të pasurive natyrore Brenda kufirit të P.N. “Sharri”dhe atyre jashtë kufijve të tij është paraqitur nevoja që parku të zgjerohet. Sidomos pjesa në të cilën përfshihet komuna e Sharrit (Dragash), autoritetet e së cilës komunë kërkuan me ngulm që një pjesë e territorit të tyre të bashkangjitet në kuadër të P.N. “Sharri”.

Nga ekspertët u konstatua se ka vlera të mjaftueshme që edhe kjo pjesë t’i shtohet parkut dhe në bazë të këtij vlerësimi të ekspertëve me një ligj te ri u vendos që të bëhet zgjerimi, ku sipërfaqja e parkut u rrit për rreth 24.206ha, shumica në territorin e komunës së Sharrit, ndërsa në komunën e Prizerenit u bë zgjerimi në grykën e Lumbardhit duke përfshirë pjesën më të bukur të grykës dhe pyjet endemike të dushkut Trojan (Quercus trojana), e cila zonë për momentin është vetëm monument natyror me karakteristika hidrologjike dhe pisazhore[6]. Sipërfaqja e tanishme e P.N.” Sharri” është 53.469ha.

Zgjerimi i Parkut u bë në territoret e të gjitha komunave ekzistuese, por në veçanti ky zgjerim ndodhi në komunën e Sharrit si territor i ri, i cili deri më tani nuk ishte i përfshirë në kuadër të Parkut Kombëtar.

Biodiversiteti-Në territorin e Malit Sharr që i takon Komunës së Sharrit ka vlera të rralla natyrore, ku përfshihen grupe të veçanta të llojeve bimore dhe shtazore. Ky territor është i famshëm për prodhimin e bimëve mjekuese, frutave të malit, mjaltës, mishit dhe qumështit. Gjithashtu është edhe shtëpi për qenin e Sharrit (Racë autoktone), delet dhe racave të kuajve që u janë përshtatur klimës dhe relievit të kësaj ane. Andaj biodiversiteti nuk do të thotë vetëm ruajtja e specieve të egra, por edhe i zhvillimit bujqësor të këtyre territoreve.



Harta: Kufiri para dhe pas zgjerimit të Parkut Kombëtar”Sharri”

[6] Plani lokal i veprimit në biodiversitet i Komunës së Prizrenit 2013-2017

Vegjetacioni në pjesën e zgjeruar të parkut (Komuna e Sharrit)- Kjo pjesë karakterizohet me një biodiversitet të pasur me lloje të bimëve vaskulare dhe endemike. Këtë e mundëson edhe gërshetimi i klimave mesdhetare dhe kontinentale që si rezultat ka paraqitjen e shumëllojshmërisë së elementeve floristikë të periudhës akullnajore.

Në këtë zonë janë prezente këto fitocenoza: Caricetum rostratae salicetosum, Caricetum rosratae vesicariae, Caricetum nigrae, Carici- narthecietum scardici, Vaccinion vith V. gaultherioides, Senecio- Rumicetum alpine, Shrubland, Arctostaphylo- Juniperetum nanae, Vaccinio-Empetretum hermaphroditi, Coryletum avellanae, Juncetum trifidi, Drypetum spinosae, Saxifrageto-Potentilletum apenninae, Saxifrageto- Rumicetum nivalis, Carici-Seslerietum latifoliae, Deltoideo-Nardetum, Nardetum strictae, Diantho-scardici-Festucetum, Amerio-festucetum variae, Xerobromion, Echinario-Convovuletum althaeoides, Edraiantho-Elynetum, Gentiano-Dryadetum octopetalae, Gladiolo-Sanguisorbetum officinalae, Helianthemo-Globularietum bellidifoliae, Abietum albae koritniensis, Abietum borisii-regis, Pinetum heldreichii typicum, Fago-Pinetum heldreichii, Almetum glutinosae, Betuletum verrucosae koritniensis, Lembotropo-Quercetum cerris etj.

Flora- Në këtë zonë janë prezente llojet e bimëve që i takojnë elementeve floristike: mezofile, kserofile, frigorifile dhe arko-alpike, në kuadër të të cilave rëndësi të veçantë kanë bimët endemike.

Fauna- Në bazë të të dhënave të OJQ-ve dhe komunitetit është ofruar një pasqyrë në lidhje me llojet në këtë zonë . Sipas OJQ ”Finches” ka 11 vende të rëndësishme të shpendëve, rreth 40 lloje të fluturave të identifikuara, të gjitha llojet e gjitarëve që gjenden në P.N.”Sharri”,ndërsa prej ujëtokësorëve më të rëndësishëm janë: bretkoca barkëverdhë (Bombina variegata), bretkoca e drunjëve-gargaliqi (Hyla arborea), bretkoca e pyllit (Rana dalmatina), bretkoca greke (Rana graeca), Salamandra salamandra (Picrraku zi e verdhë), etj. Prej zvarranikëve më të njohurit janë: kokëzogëza (Anguis fragilis), hardhuca e mureve (Lacerta muralis), hardhuca e gjelbër (Lacerta viridis), gjarpri i barit (Natrix natrix), breshka e pyllit (Testudo hermani), nepërka (Vipera ammodytes) etj.

Humbja e Biodiversitetit në Parkun Nacional “Sharri”

Edhe Kosova si dhe P.N. “Sharri” po përballet me problemin e humbjes së biodiversitetit. Faktori kryesor që po ndikon në një kërcënim serioz për ekzistencën e shumë llojeve bimore dhe shtazore është padyshim faktori njeri me aktivitetet e tij, të cilat shpeshherë nuk marrin në konsideratë biodiversitetin që i rrethon. Me shpyllëzime, shfrytëzim intenziv të tokës, ndotje të ajrit dhe ujit, gjueti të pakontrolluar etj., njerëzit vazhdimisht po e varfërojnë biodiversitetin në P.N.:Sharri”. Reduktimi i sipërfaqeve pyjore dhe degradimi i vazhdueshëm i tyre ka ardhur si pasojë e shfrytëzimit pa kriter të këtyre resurseve të pasura të natyrës. Kafshët e rralla si rrëqebulli, ariu i murmë, kaprrolli, dreri, dhia e egër etj, gjithashtu janë të rrezikuara që të zhduken ose pakësohen nga parku nacional, si pasojë e gjuetisë së pakontrolluar, por edhe faktorëve tjerë biotik dhe abiotik.

Fatkeqësitë natyrore-të cilat paraqiten në forma të ndryshme, si gërryerje sipërfaqësore e tokës, zjarreve, sëmundje të pyjeve, ortiqeve etj, gjithashtu po rrezikojnë biodiversitetin në masë të konsiderushme. Prandaj duhet shikuar se cilat janë mundësitë e parandalimit. Çfarë masash duhet ndërmarrë në mënyrë që të zvogëlojmë pasojat për biodiversitet nga këta faktorë?

Për të tejkaluar këtë situatë duhet që edhe më shumë të punohet në hartimin e strategjive të reja për biodiversitetin, miratimin e ligjeve shtesë, rregulloreve dhe aspekteve tjera ligjore për mbrojtjen e biodiversitetit, aplikimin dhe zbatimin e ligjeve në fuqi si dhe rrespektimin e përmbajtjeve të konventave dhe direktivave ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit (Konceptet themelore të UNESCO-s, Unioni botëror për ruajtjen dhe konzervimin e natyrës shkurt në anglisht IUCN, Samiti për tokën, mbajtur më 1992 në Rio de Zhaneiro, konventa e espoos e vitit 1991 që hyri në fuqi më 1997, konventa e Lluganos më 1993, direktiva e këshillit të Evropës për ruajtjen e habitateve dhe florës dhe faunës së egër më 1992 etj.), shfrytëzimi i përvojave të shteteve më të avancuara në mbrojtjen e biodiversitetit, forcimin e institucioneve që merren me çështjet e mbrojtjes së biodiversitetit, organizimin e fushatave për vetëdijësimin e komunitetit mbi rëndësinë që ka ruajtja e biodiversitetit etj.

Domosdoshmëria e ruajtjes së biodiversitetit

Ruajtja e biodiversitetit është e rëndësishme dhe e domosdoshme për shumë arsye, por në këtë rast do të përmendin disa prej tyre:

- Ruajtja e biodiversitetit është detyrim yni moral që pasardhësve tanë t'u lëmë një mjedis po aq të pasur sa e kemi trashëguar nga paraardhësit tanë.
- Çdo qenie e gjallë ka të drejtë të jetojë, ashtu si edhe vetë njeriu; qeniet e gjalla që kanë jetuar me miliona vite mund të zhduken shumë shpejt, por nuk mund të krijohen më .
- Lloje të ndryshme bimore kanë vlera të jashtëzakonshme shëndetësore dhe ekonomike, andaj zhdukja e tyre do të thotë zhdukje e kësaj vlere.
- Proceset natyrore biologjike janë rregullatorët më të mirë të ruajtjes së mjedisit të pastër dhe jetës në planetin tone.
- Zhvillimi ekonomik mund të arrihet përmes ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të pasurive natyrore,
- Biodiversiteti dhe llojllojshmëria biologjike e natyrës paraqet potencial të lartë për zhvillimin e turizmit dhe rekreacionit e sidomos turizmit malor.
- Dhe krejt në fund themi se: **Jeta e njerëzimit në tokë është e varur nga biodiversiteti dhe shfrytëzimi i tij i drejtë.**

Përfundimi

"Njerëzit janë pjesë e diversitetit të pasur të natyrës dhe kanë fuqi që ta mbrojnë ose shkatërrojnë atë"

Mesazhi kryesor i sekretariatit të konventës së biodiversitetit në vitin 2010 për vendimmarrësit botëror.

Ky mesazh na bën të punojmë në nevojën e ngritjes së vetëdijes për rëndësinë e biodiversitetit, si dhe edukimit të vazhdueshëm të komunitetit mbi rëndësinë që ka mbrojtja e tij. Mbrojtja dhe ruajtja e natyrës shpesh nuk kuptohet drejt nga sektori privat, mbi efektin e ndërhyrjes së tyre dhe si të menagjohet me të. Prandaj është e rëndësishme që të trajnohen të gjitha palët e interesuara për një komunikim efektiv për çështjen e menagjimit të biodiversitetit.

Mali Sharr ka biodiversitet të pasur, këtë e kanë mundësuar : pozita gjeografike, faktorët gjeologjik, pedologjik, hidrologjik, reliefi, klima etj.

Inventarizimi i specieve ende nuk ka përfunduar, ende nuk është përpiluar Libri i Kuq. Dihet se Mali Sharr është i pasur me shumë lloje endemike, relikte dhe subendemike, por që kanë nevojë edhe më shumë të hulumtohen.Një numër i tyre është i kërcënuar për zhdukje.

Edukimi, informimi dhe komunikimi janë hapat e parë në procesin e ndryshimeve sociale që ndihmon të kuptuarit e rëndësisë së diversitetit biologjik dhe peisazhor, dhe ndikon për të ndryshuar qëndrimin e publikut, sjelljet, duke marrë përgjegjësinë dhe përfshirjen në mbrojtjen e tij. Në këtë drejtim janë bërë disa hapa pozitiv duke futur në shkolla lëndën "Mbrojtja e mjedisit", si dhe janë botuar një numër i materialeve didaktike për të gjitha nivelet edukativo-arsimore.

Duke punuar në këtë temë edhe unë si autor fitova njohuri të reja, të cilat njohuri do t'i transmetoj te nxënësit e mi dhe komuniteti, me qëllim të edukimit dhe vetëdijësimit të tij mbi rëndësinë që ka biodiversiteti në përgjithësi e në veçanti mbi vlerat që ka Mali Sharr në aspektin e biodiversitetit.

Literatura dhe burimet

1. Mustafa Behgjet & Hoxha Esat, Biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura, Prishtinë 2004.

2. Agjencia për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës (AMMK), Instituti për Planifikim Hapësinor, Plani hapësinor Parku kombëtar “Sharri”

3. Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, AMMK, Raport për gjendjen e mjedisit 2011-2012, Prishtinë 2013.

4.Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Instituti i Kosovës për mbrojtjen e natyrës, Vlerat e trashëgimisë natyrore të Kosovës Prishtinë 2005.

5. Çavolli Riza, Gjeografia regjionale e Kosovës, Prishtinë 1997.

6.Environment & security (ENVSEC), United Nations environment programme (UNEP), Feasibility study on establishing a transboundary protected area Sharr/Sar planina-Korab-Desat/Deshat.

7. Dana Hazer, Gjendja e resurseve natyrore në Parkun Nacional për vitin 2008, Prizren 2008.

8. Komuna e Prizrenit, Plani lokal i veprimit në biodiversitet të Komunës së Prizrenit 2013-2017, Prizren 2013.

9.Komuna e Dragashit, Plani lokal i veprimit në biodiversitet i Komunës së Dragashit 2011-2015, Dragash 2010.

10. Zyra e APK-së Ferizaj, Plani menagjues pyjor Ahishta Kaçanik, Prishtinë 2007