

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ФИТОЛИЗИН®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата
ФИТОЛИЗИН®

МНН или группировочное название: -

Лекарственная форма

Паста для приготовления суспензии для приема внутрь

Состав

Активные вещества:

сгущенный экстракт смеси: золотарника травы,	
хвоща полевого травы, горца птичьего травы,	
пырея корневищ, шелухи лука, березы листьев,	
пажитника семян, петрушки корня, любистока	
корня –	67,2 г
апельсина масло	0,15 г
шалфея масло	1,0 г
мяты перечной травы масло	0,5 г
сосны обыкновенной масло	0,2 г

Вспомогательные вещества: агар-агар 1,2 г, этилпарагидроксибензоат 0,2 г, крахмал пшеничный 2,3 г, ванилин 0,0004 г, глицерол (глицерин) до 100,0 г.

Описание

Паста мягкой консистенции зелено-коричневого цвета, со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Диуретическое средство растительного происхождения

Фармакологические свойства

Оказывает мочегонное, противовоспалительное, спазмолитическое действие, способствует вымыванию песка и мелких конкрементов из мочевых путей, уменьшает кристаллизацию минеральных компонентов мочи.

Фармакокинетика: данные отсутствуют

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания мочевых путей, нефроуролитиаз (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, гломерулонефрит, фосфатный уrolитиаз, возраст до 18 лет.

Применение препарата при беременности и лактации

В связи с отсутствием данных, касающихся тератогенного действия компонентов препарата, не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Взрослым назначают внутрь по 1 чайной ложке пасты, растворенной в 1/2 стакана теплой сладкой воды, 3-4 раза в день после еды.

Курс лечения: длительность терапии определяется врачом. Средний курс лечения составляет от 2 недель до 1,5 месяцев. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, иногда - тошнота.

При повышенной чувствительности к ультрафиолетовым лучам возможны явления фотосенсибилизации.

При появлении побочных эффектов препарат следует отменить.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В связи с мочегонным действием препарата следует учитывать возможность ускоренного выведения других, одновременно применяемых лекарственных средств.

Фитолизин® может усиливать действие:

- антикоагулянтов, нестероидных противовоспалительных препаратов;
- гипогликемических лекарственных средств;
- лекарственных средств, содержащих соли лития;
- ингибиторов моноаминоксидазы;
- пролонгировать действие пентобарбитала, парацетамола.

Фитолизин® может уменьшить всасывание лекарственных средств в тонком кишечнике, в том числе бета-каротина, альфа-токоферола.

Особые указания

Не следует применять препарат в случае появления отеков, вызванных недостаточностью функции сердца или почек.

Применение препарата не оказывает отрицательного влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами и т.п.).

Форма выпуска

Паста для приготовления суспензии для приема внутрь. По 100 г в тубы алюминиевые, покрытые внутри лаком. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Варшавский завод лекарственных растений „Гербаполь”

05-800 Прушков, ул. Олукова 54, Польша

Тел.: (48-22) 73-81-300;

Факс: (48-22) 73-81-303.


Представительство в Москве

Представительство ООО «ПОЛЬФА» в Москве

121248, Москва, Кутузовский пр-т, дом 7/4 корп. 5, кв. 12

Тел.: 8(499)243-16-63; 8(499)243-18-36;

Факс: 8(499)243-77-27.



Представитель фирм



В.М. Стенин