

Теорія функції комплексної змінної

Зміст

1	Комплексні числа та функції комплексної змінної	3
1.1	Основні поняття	3
1.2	Операції над комплексними числами	4
1.3	Послідовності комплексних чисел	6
1.4	Розширена множина \mathbb{C} . Нескінченно віддалена точка.	9
1.5	Множина на комплексній площині	10
1.6	Поняття функції комплексної змінної	10
1.7	A	12


ЧАСТИНА 1

Комплексні числа та функції комплексної змінної

1.1 Основні поняття

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{N} & \subset & \mathbb{Z} & \subset & \mathbb{Q} & \subset & \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \\ \text{натуральні} & & \text{цілі} & & \text{раціональні} & & \text{дійсні} & & \text{комплексні} \end{array}$$

$(x, y) : x, y \in \mathbb{R}$ - пара дійсних чисел.



$z = x + iy$ - алгебраїчна форма z

Якщо $y = 0$, то $z = x \in \mathbb{R}$. $\Re z = x$ - дійсна частина z . Якщо $x = 0$, то $z = iy$ - чисто уявне число. $\Im z = y$ - уявна частина z . Значення $x, y \in \mathbb{R}$ - дійсні. Для $z = i : x = 0, y = 1, i$ - уявна одиниця. Якщо $z = x + iy$, то $\bar{z} = x - iy$ - спряжене до z . Нехай ρ, φ - полярні координати. Тоді модуль $z : |z| = \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. $|z| \geq 0, \forall z \in \mathbb{C}$. Якщо $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$. φ - аргумент z (кут, утворений радіус-вектором, проведеним в точку z у додатньому напрямку з осі Ox).

$\text{Arg } z$ - множина значень аргумента z . $\text{Arg } z = \arg z + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, \arg z$ - головне значення аргумента. $\arg z = \varphi \in (-\pi, \pi]$

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, x > 0 & (I, IV \text{ чв.}) \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi, x < 0, y > 0 & (II \text{ чв.}) \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi, x < 0, y < 0 & (III \text{ чв.}) \end{cases}, \quad \arg z \text{ визначений для } z \neq 0!$$

$$z = \begin{cases} x = |z| \cos \varphi \\ y = |z| \sin \varphi \end{cases} = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) - \text{тригонометрична форма числа } z.$$

Теорема 1.1 (Формула Ойлера).

$$e^{iy} = \cos \varphi + i \sin \varphi \quad (\varphi \in \mathbb{R})$$

Наслідок 1.1.

$z = |z|e^{i\varphi}$ - показникова форма z . $\bar{z} = |z|(\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)) = |z|(\cos \varphi - i \sin \varphi)$.
не тригонометрична форма

$$\bar{z} = |z|e^{-i\varphi}$$

1.2 Операції над комплексними числами


1. Порівняння

В комплексній області відношення " $>$ " чи " $<$ " не визначено. Числа порівнюють тільки за допомогою відношення " $=$ " або " \neq ".

$$z_1 = z_2 \text{ у алгебраїчній формі} \iff \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \end{cases}$$

$$z_1 = z_2 \text{ у тригонометричній формі} \iff \begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ \varphi = \varphi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

2. Додавання/Віднімання



$$1 : z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$2 : z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

$$2 : |z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} - \text{відстань між } z_1, z_2$$

$$3 : |z - z_0| = R$$

3. Множення/ділення і піднесення до степеню

$$\text{def} \quad z_1 \cdot z_2 = \underbrace{x_1x_2 - y_1y_2}_{\Re z} + i \underbrace{(x_1y_2 + x_2y_1)}_{\Im z}$$

Наслідок 1.2. для $z_1 = z_2 = i : i^2 = -1 \quad (x_1 = x_2 = 0, y_1 = y_2 = 1)$

Наслідок 1.3. $z_1 \cdot z_2 = x_1 x_2 + i^2 y_1 y_2 + i x_1 y_2 + i x_2 y_1 = x_1(x_2 + i y_2) + i y_1(x_2 + i y_2) = (x_1 + i y_1)(x_2 + i y_2)$

Таким чином, комплексні числа перемножуються як звичайні і при цьому зберігаються усі формули скороченого множення.

$$\text{def} \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + i y_1}{x_2 + i y_2} \cdot \frac{x_2 - i y_2}{x_2 - i y_2} = \frac{A + i B}{x_2^2 + y_2^2} = X + i Y$$

$$\text{def} \quad z^n = (x + i y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (i y)^{n-k}, \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\begin{cases} i = i \\ i^2 = -1 \\ i^3 = -i \\ i^4 = i \\ i^5 = 1 \end{cases} \quad \dots \quad \begin{cases} i^{4k} = 1 \\ i^{4k+1} = i \\ i^{4k+2} = -1 \\ i^{4k+3} = -i \end{cases}$$

4. Множення/ділення і піднесення до степеню (в тригонометричній і показниковій формі)

$z_1 = |z_1|(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = |z_2|(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$. Тоді у тригонометричній формі: $z_1 \cdot z_2 = |z_1|(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \cdot |z_2|(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = |z_1| \cdot |z_2| \cdot (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + i \cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + i \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + i^2 \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) = |z_1| \cdot |z_2| \cdot ((\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)) = |z_1| \cdot |z_2| \cdot (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$

$$\text{def} \quad z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| \cdot (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \varphi = \varphi_1 + \varphi_2$$

Наслідок 1.4. $z_1 = z, z_2 = \bar{z} \Rightarrow z \cdot \bar{z} = |z|^2(\cos 0 + i \sin 0) = |z|^2$

У показниковій формі(множення): $z_1 = |z_1| \cdot e^{i\varphi_1}, z_2 = |z_2| \cdot e^{i\varphi_2}$

$$\text{def} \quad z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| \cdot e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

У тригонометричній формі(ділення): $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \cdot \frac{\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1}{\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \cdot$

$$\frac{(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)}{\cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \cdot (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \cdot (\cos(-\varphi_2) + i \sin(-\varphi_2))$$

$$\text{def} \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)), \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \varphi = \varphi_1 - \varphi_2$$

У показниковій формі(ділення):

$$\text{def} \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \cdot e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$$


$$\text{def} \quad z^n = \underbrace{z \cdot z \cdot z \cdots z}_{n \text{ разів}} = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = |z|^n \cdot e^{in\varphi}, \forall n \in \mathbb{Z}$$

5. Винесення з під кореня $\sqrt[n]{z}$

$$\text{def} \quad W = \sqrt[n]{z}, \text{ якщо } W^n = z.$$

Нехай обидва записані у тригонометричній формі: $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$,
 $W = |W|(\cos \psi + i \sin \psi)$, $W^n = |W|^n(\cos n\psi + i \sin n\psi)$. Умова "=" в тригоно-

-метричній формі: $W^n = z \Rightarrow \begin{cases} |W|^n = |z| \\ n\psi = \varphi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |W| = \sqrt[n]{|z|} \\ \psi = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$




$$\sqrt[n]{z} = W = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right)$$

$$k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$\psi_k = \frac{\varphi}{n} + 2\pi \frac{k}{n}, \quad \Delta\psi = \frac{2\pi}{n}$$

Приклад:




$$\sqrt[4]{1} = \Delta\varphi = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

1.3 Послідовності комплексних чисел

Послідовність комплексних чисел — це комплекснозначна функція натурального аргумента. $\{z_n\}$ - послідовність.

def $n \in \mathbb{N} \rightarrow f(n) = z_n \in \mathbb{C}$

1.




$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0, z_0 \in \mathbb{C}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \quad |z_n - z_0| < \varepsilon$$

2.

 z_n - обмежена, якщо

$$\exists M > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |z_n| < M$$


Теорема 1.2.

$$\text{Нехай} \quad z_n = x_n + iy_n,$$

$$z_0 = x_0 + iy_0,$$

$$(x_n, y_n, x_0, y_0 \in \mathbb{R})$$

$$\text{Тоді:} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 \iff \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 \end{cases}$$



До доведення Теорема 1.2

Доведення.

а) необхідність:

$$\text{Нехай} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0, \text{ тобто } \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N(\varepsilon) \quad |z_n - z_0| < \varepsilon$$

$$|z_n - z_0| = |(x_n + iy_n) - (x_0 + iy_0)| = |(x_n - x_0) + i(y_n - y_0)| \implies \\ \implies \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2} < \varepsilon, \quad (x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2 < \varepsilon^2 \implies$$

$$\implies \begin{cases} (x_n - x_0)^2 < \varepsilon^2 \\ (y_n - y_0)^2 < \varepsilon^2 \end{cases} \implies \begin{cases} |x_n - x_0| < \varepsilon \\ |y_n - y_0| < \varepsilon \end{cases}, \forall n \geq N(\varepsilon) \iff$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 \end{cases}$$

b) достатність:

Нехай $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 \end{cases} \quad \forall \varepsilon > 0 : \begin{matrix} \exists N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1(\varepsilon) & |x_n - x_0| < \frac{\varepsilon}{2} \\ \exists N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2(\varepsilon) & |y_n - y_0| < \frac{\varepsilon}{2} \end{matrix}$

$$|z_n - z_0| = |(x_n + iy_n) - (x_0 + iy_0)| = |(x_n - x_0) + i(y_n - y_0)| \leq$$

$$\leq |x_n - x_0| + |i| \cdot |y_n - y_0| = |x_n - x_0| + |y_n - y_0| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

при $\forall n \geq \max(N_1, N_2) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$

Твердження 1.1.


$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 \Longleftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - z_0| = 0$$

Доведення.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \quad |z_n - z_0| < \varepsilon. \quad \text{Тоді: } ||z_n - z_0| - 0| = |z_n - z_0| < \varepsilon$$

Теорема 1.3.

$$\text{Якщо } \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0, \text{ то } \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z_0|$$



До доведення Теорема 1.3

Доведення.

Покажемо, що $\lim_{n \rightarrow \infty} ||z_n| - |z_0|| = 0$ (у зворотний бік невірно).

$$\left. \begin{array}{l} \text{Нерівність } \triangle \text{ для } |z_n| : \begin{cases} |z_n| \leq |z_0| + |z_n - z_0| \\ |z_n| - |z_0| \leq |z_n - z_0| \end{cases} \\ \text{Нерівність } \triangle \text{ для } |z_0| : \begin{cases} |z_0| \leq |z_n| + |z_n - z_0| \\ |z_0| - |z_n| \leq |z_n - z_0| \end{cases} \end{array} \right\} \implies ||z_n| - |z_0|| \leq |z_n - z_0|$$


Окрім того, $0 \leq ||z_n| - |z_0|| \leq |z_n - z_0| \implies (\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - z_0| = 0 - \text{за умовою}) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} ||z_n| - |z_0|| = 0 \Longleftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z_0|$

Теорема 1.4.

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z_0| \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n = \varphi_0 \end{cases} \xrightarrow[\substack{z_n = |z_n| \cdot e^{i\varphi_n} \\ z_0 = |z_0| \cdot e^{i\varphi_0}}]{=} \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$$

| **Доведення.** З арифметичних властивостей $\lim z_n$

1.4 Розширена множина \mathbb{C} . Нескінченно віддалена точка.





$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty \Leftrightarrow \forall E > 0 \quad \exists N(E) \in \mathbb{N}$
 $\forall n \geq N(E) \quad |z_n| > E$. Невласне комплексне число ∞ : поняття дійсної та уявної частини, а також, аргумента - невизначені. $|\infty| = \infty$. $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty \Rightarrow$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = +\infty$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{z_n} = 0$

Операції над " ∞ " і $a \in \mathbb{C}$:

def " $\infty \pm a$ " = ∞
 def " $\infty \cdot a = \infty$, $a \neq 0$ "
 def " $\frac{\infty}{a}$ " = ∞
 def " $\frac{a}{\infty}$ " = 0
 def " $\frac{\infty}{\infty}$ " = ∞

Невизначеності:

$0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, $\infty +$
 ∞ , $\infty - \infty$.




1.5 Множина на комплексній площині

Областю на комплексній площині називається множина точок, що володіє властивостями відкритості та зв'язності. Відкритість означає, що будь-яка точка множини належить їй разом з деяким околom. Зв'язність означає, що будь-які дві точки множини можна з'єднати лінією, що складається цілком з точок цієї ж множини. Точка, що сама не належить області, але будь-якій її окіл має в собі точки цієї області, називається граничною точкою області. Сукупність граничних точок області називається границею області.

Далі будемо вважати, що границя області може складатись із скінченного числа замкнутих ліній (контурів), незамкнутих ліній (розрізів) та окремих точок. Область називається обмеженою, якщо її можна укласти всередину деякого кола з центром у початку координат. Область разом з приєднаною до неї границею називається замкненою областю.

Позначення.

D, G - області. Γ, γ, L, l - границі області. $\bar{D} = D \cup \Gamma$ - замкнена область.



Порядком зв'язності області називається число зв'язних елементів її границі. Додатнім напрямком обходу границі рахується той, при котрому область залишається зліва.



1.6 Поняття функції комплексної змінної

$$z \xrightarrow{f} W = f(z) \in \mathbb{C}, \quad z \in \mathbb{C}$$

Приклад:

$$\left. \begin{aligned} f(z) &= \Re z \\ f(z) &= \Im z \\ f(z) &= |z| \end{aligned} \right\} \in \mathbb{R}, \text{ однозначні}$$

Приклад:

$$\left. \begin{array}{l} f(z) = z^n \\ \bar{z} \end{array} \right\} \in \mathbb{C}, \text{ однозначні}$$


Приклад:

$$f(z) = \operatorname{Arg} z = \arg z + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} - \text{многозначна (нескінченна кількість значень)}$$

Приклад:

$$f(z) = \sqrt[n]{z} \in \mathbb{C}, - \text{многозначна (} n - \text{значна)}$$

$$W = f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad u, v \in \mathbb{R}$$




Приклад:

$$\Gamma : x = 1, f(z) = z^2, f(\Gamma) - ?$$

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy|_{x=1} = \underbrace{1 - y^2}_u + \underbrace{2iy}_v$$

$$y \in \mathbb{R} \Rightarrow v \in \mathbb{R}, y = \frac{v}{2} \Rightarrow u = 1 - \frac{v^2}{4}$$



1.7 А