

---

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА  
З ПРЕДМЕТУ  
”ТЕОРІЯ ФУНКЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ”  
ВАРІАНТ №2

ФІ-12 Бекешева Анастасія

---

1.

$$\sqrt[4]{\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}}$$

$$\sqrt[4]{\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}} = \sqrt[4]{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \cdot \left( \cos \left( \frac{\arctan(-\sqrt{3}) + \pi + 2\pi k}{4} \right) + \right.$$

$$\left. + i \sin \left( \frac{\arctan(-\sqrt{3}) + \pi + 2\pi k}{4} \right) \right) = 1 \cdot \left( \cos \left( \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}\pi k \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}\pi k \right) \right)$$

$$0 \leq k \leq 3$$

$$k=0: \quad \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$k=1: \quad \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$k=2: \quad \cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$k=3: \quad \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

2.

$$\cos \left( \frac{\pi}{6} + 2i \right)$$

$$\cos \left( \frac{\pi}{6} + 2i \right) = \cos \frac{\pi}{6} \cos 2i - \sin \frac{\pi}{6} \sin 2i = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2i - \frac{1}{2} \sin 2i = \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{ch} 2 - \frac{1}{2} i \operatorname{sh} 2$$

3.


$$\operatorname{Arcsin} 4$$

$$\operatorname{Arcsin} 4 = -i \operatorname{Ln} (4i \pm \sqrt{1-16}) = -i \operatorname{Ln} (i(4 \pm \sqrt{15})) = \left\langle \begin{array}{l} z = 4 \pm \sqrt{15} \ (x=0) \\ \arg z = \frac{\pi}{2} \end{array} \right\rangle =$$

$$= -i \left( \ln |4 \pm \sqrt{15}| + i \left( \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right) \right) = -i \ln (4 \pm \sqrt{15}) + \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

4.


$$|z+i| \geq 1, \quad |z| < 2$$



5.

$$z = 2 \sec t - 3i \operatorname{tg} t$$

$$\begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{2}{\cos t}, \\ \frac{y}{3} = -\frac{\sin t}{\cos t} \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = -\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} + \frac{1}{\cos^2 t} = \frac{1 - \sin^2 t}{\cos^2 t} = 1$$



6.

$$u = x^3 - 3xy^2 + 1, \quad f(0) = 1$$

$$\begin{aligned} u'_x &= 3(x^2 - y^2), & u'_y &= -6xy, & u'_x &= v'_y, v'_x = -u'_y \Rightarrow v = 3 \int (x^2 - y^2) \, dy = \\ &= 3 \left( x^2 y - \frac{1}{3} y^3 \right), & v'_x &= 6xy + C'(x), & v'_x &= -u'_y \Rightarrow 6xy + C'(x) = 6xy, & C'(x) &= 0, \\ C(x) &= C \in \mathbb{R}, & v &= 3x^2 y - y^3 + C \\ f(z) &= x^3 - 3xy^2 + 1 + 3x^2 yi - y^3 i + Ci, & f(0) &= 1, & f(0) &= 0 - 0 + 1 + 0i - 0i + Ci = \\ &= Ci + 1 = 1 \Rightarrow C = 0, & f(z) &= x^3 - 3xy^2 + 1 + 3x^2 yi - y^3 i = (x + iy)^3 + 1 = z^3 + 1 \end{aligned}$$

7.

$$\int_{\mathcal{L}} (z+1)e^z \, dz, \quad \mathcal{L} : \{|z| = 1, \quad \Re z \geq 0\}$$


$$z = x + iy, \quad (z+1)e^z = (x+iy+1)e^{x+iy} = (z+iy+1) \cdot (\cos(x+iy) + i \sin(x+iy))$$

8.

$$f(z) = \frac{z-4}{z^4 + z^3 - 2z^2}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} z_1 = 0 \\ z_2 = 1 \\ z_3 = -2 \end{cases} \begin{cases} \mathcal{D}_1 : 0 < |z| < 1 \\ \mathcal{D}_2 : 1 < |z| < 2 \\ \mathcal{D}_3 : |z| > 2 \end{cases} & f(z) = \frac{z-4}{z^2(z-1)(z+2)} = \frac{1}{z^2} \left( \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+2} \right) = \\ &= \left\langle A = \frac{z-4}{z+2} \Big|_{z=-1} = -\frac{3}{3} = -1, \quad B = \frac{z-4}{z-1} \Big|_{z=-2} = \frac{-6}{-3} = 2 \right\rangle = \frac{1}{z^2} \left( \frac{2}{z+2} - \frac{1}{z-1} \right) \\ \frac{1}{z-1} &= -\frac{1}{1-z} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n \in \mathcal{D}_1 \\ \frac{1}{z-1} &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{z} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \in \mathcal{D}_2, \mathcal{D}_3 \\ \frac{2}{z+2} &= \frac{1}{1-(-\frac{z}{2})} = \sum_{n=0}^{\infty} \left( -\frac{z}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{2^n} \in \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2 \\ \frac{2}{z+2} &= \frac{2}{z} \cdot \frac{1}{1-(-\frac{2}{z})} = \frac{2}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left( -\frac{2}{z} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{n+1}}{z^{n+1}} \in \mathcal{D}_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{D}_1: \quad f(z) &= \frac{1}{z^2} \left( \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{2^n} - \left( - \sum_{n=0}^{\infty} z^n \right) \right) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n-2} \left( \frac{(-1)^n}{2^n} + 1 \right) \\
\mathcal{D}_2: \quad f(z) &= \frac{1}{z^2} \left( \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{2^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{n-2}}{2^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+3}} \\
\mathcal{D}_3: \quad f(z) &= \frac{1}{z^2} \left( \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{n+1}}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((-1)^n 2^{n+1} - 1)}{z^{n+3}}
\end{aligned}$$



10.

$$f(z) = \sin \left( \frac{z}{z-1} \right), \quad z_0 = 1$$

$$\begin{aligned}
f(z) &= \sin \left( \frac{z+1-1}{z-1} \right) = \sin \left( 1 + \frac{1}{z-1} \right) = \sin 1 \cos \left( \frac{1}{z-1} \right) + \cos 1 \sin \left( \frac{1}{z-1} \right) = \\
&= \sin(1) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left( \frac{1}{z-1} \right)^{2n} + \cos(1) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left( \frac{1}{z-1} \right)^{2n+1} = \\
&= \sin(1) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!(z-1)^{2n}} + \cos(1) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!(z-1)^{2n+1}}
\end{aligned}$$

11.

$$f(z) = z^3 e^{\frac{7}{z^2}}$$

$$f(z) = z^3 \left( 1 + \frac{7}{z^2} + \frac{7^2}{2!z^4} + \frac{7^3}{3!z^6} + \dots \right) = z^3 + 7z + \underbrace{\frac{7^2}{2!z} + \frac{7^3}{3!z^3} + \dots}_{\text{голова частина}}, \quad z_0 = 0$$

енскінчена кількість доданків в головній частині  $\implies z_0$  - істотно особлива.

12.

$$f(z) = \frac{1}{\cos z}$$

$$\cos z = 0 \implies z_k = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}, \quad (\cos z)'|_{z_k} = -\sin(z_k) = \pm 1 \neq 0$$


Нулі знаменника не є нулями чисельника.  $m_1 = 0$ ,  $m_2 = 1 \implies z_k$  - полюс I порядку.

13.

$$\mathcal{I} = \oint_{\mathcal{L}} \frac{2 \, dz}{z^2(z-1)}, \quad \mathcal{L}: |z-1-i| = \frac{5}{4}$$

$z_1 = 0 \notin \mathcal{L}$ ,  $z_2 = 1$ :  $m_1 = 0$ ,  $m_2 = 1$  - полюс I порядку.

$$\mathcal{I} = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=1} \frac{2 \, dz}{z^2(z-1)} = 2\pi i \cdot \frac{2}{3z^2 - 2z} \Big|_{z=1} = 2\pi i \cdot \frac{2}{3-2} = 4\pi i$$




14.

$$\mathcal{I} = \oint_{\mathcal{L}} \frac{2 - z^2 + 3z^3}{4z^3} dz, \quad \mathcal{L}: |z| = \frac{1}{2}$$

$z_0 = 0$ :  $m_1 = 0$ ,  $m_2 = 3$  - полюс III порядка.

$$\begin{aligned} \mathcal{I} &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} \frac{2 - z^2 + 3z^3}{4z^3} = \pi i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \left( \frac{2 - z^2 + 3z^3}{4z^3} \cdot (z - 0)^3 \right) = \\ &= \pi i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left( \frac{d}{dz} \left( \frac{2}{4} - \frac{z^2}{4} + \frac{3z^3}{4} \right) \right) = \pi i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left( -\frac{1}{2}z + \frac{9}{4}z^2 \right) = \pi i \lim_{z \rightarrow 0} \left( -\frac{1}{2} + \frac{9}{2}z \right) = \\ &= \pi i \left( -\frac{1}{2} + 0 \right) = -\frac{\pi}{2}i \end{aligned}$$



15.

$$\mathcal{I} = \oint_{\mathcal{L}} \frac{\cos 3z - 1 + \frac{9}{2}z^2}{z^4 \operatorname{sh} \frac{9}{4}z} dz, \quad \mathcal{L}: |z| = 1$$

$$z^4 \operatorname{sh} \frac{9}{4}z = 0, \quad z_1 = 0, \quad \sin \frac{9}{4}iz = 0, \quad z_k = -\frac{4}{9}i\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad \cos 3z_k - 1 + \frac{9}{2}z_k^2 \neq 0$$


$z_1 = 0$  - нуль V порядка,  $z_k = -\frac{4}{9}i\pi k \setminus \{0\}$  - не нуль.

$$f(z) = \frac{\cos 3z - 1 + \frac{9}{2}z^2}{z^4 \operatorname{sh} \frac{9}{4}z} = \frac{\left( 1 - \frac{3^2 z^2}{2!} + \frac{3^4 z^4}{4!} + \frac{3^6 z^6}{6!} + \dots \right) - 1 + \frac{9z^2}{2}}{z^4 \left( \frac{9z}{4} + \frac{9^3 z^3}{4^3 3!} + \frac{9^5 z^5}{4^5 5!} + \dots \right)} =$$

$$= \frac{z^4 \left( \frac{3^4}{4!} + \frac{3^6 z^2}{6!} + \dots \right)}{z^5 \left( \frac{9}{4} + \frac{9^3 z^2}{4^3 3!} + \frac{9^5 z^4}{4^5 5!} + \dots \right)} = \frac{z^4 g_1(z)}{z^5 g_2(z)}, \quad g_i(0) \neq 0$$

$z_0 = 0$ :  $m_1 = 4$ ,  $m_2 = 5 \implies z_0 = 0$  - полюс I порядку.

$$\mathcal{I} = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} f(z) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^4 g_1(z)}{z^5 g_2(z)} \cdot z = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\frac{3^4}{4!} + \frac{3^6 z^2}{6!} + \dots}{\frac{9}{4} + \frac{9^3 z^2}{4^3 3!} + \frac{9^5 z^4}{4^5 5!} + \dots} = 2\pi i \frac{\frac{3^4}{4!}}{\frac{9}{4}} = 3\pi i$$



16.


$$\mathcal{I} = \oint_{\mathcal{L}} \left( \underbrace{ze^{\frac{1}{z+6}}}_{\mathcal{I}_1} + \underbrace{\frac{2 \cos\left(\frac{\pi z}{5}\right)}{(z+5)^2(z+3)}}_{\mathcal{I}_2} \right) dz = \mathcal{I}_1 + 2\mathcal{I}_2, \quad \mathcal{L}: |z+6|=2$$

$$\begin{aligned} (\mathcal{I}_1) \quad \mathcal{I}_1 &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-6} \left[ ze^{\frac{1}{z+6}} \right] = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-6} \left[ (z+6-6) \left( 1 + \frac{1}{z+6} + \frac{1}{2!(z+6)^2} + \dots \right) \right] = \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-6} \left[ \left( (z+6) + 1 + \frac{1}{2!(z+6)} + \dots \right) - \left( 6 + \frac{6}{z+6} + \frac{6}{2!(z+6)^2} + \dots \right) \right] = \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-6} \left[ (z+6) - 5 - \underbrace{\frac{11}{2} \cdot \frac{1}{z+6}}_{\text{головна частина}} + \dots \right] = \langle z_0 = -6 - \text{істотно особлива точка} \rangle = \\ &= 2\pi i \cdot \left( -\frac{11}{2} \right) = -11\pi i \end{aligned}$$

$$(\mathcal{I}_2) \quad z_0 = -5: \quad \cos\left(\frac{5\pi}{5}\right) = 1 \neq 0, \quad m_1 = 0, \quad m_2 = 2, \quad z_0 - \text{полюс II порядку.}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_2 &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-5} \left[ \frac{\cos\left(\frac{\pi z}{5}\right)}{(z+5)^2(z+3)} \right] = 2\pi i \lim_{z \rightarrow -5} \left[ \frac{d}{dz} \left( \frac{\cos\left(\frac{\pi z}{5}\right)}{(z+5)^2(z+3)} \cdot (z+5)^2 \right) \right] = \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow -5} \left[ \frac{-\frac{\pi}{5} \cdot (z+3) \cdot \sin\left(\frac{\pi z}{5}\right) - \cos\left(\frac{\pi z}{5}\right)}{(z+3)^2} \right] = 2\pi i \frac{-\frac{\pi}{5} \cdot (-2) \cdot \sin(-\pi) - \cos(-\pi)}{(-2)^2} = \\ &= 2\pi i \cdot \frac{\frac{2\pi}{5} \cdot 0 - (-1)}{4} = \frac{\pi i}{2} \end{aligned}$$

$$\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 + 2\mathcal{I}_2 - 11\pi + 2 \cdot \frac{\pi i}{2} = -10\pi i$$



17.

$$\mathcal{I} = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{4 + \sqrt{15} \sin t}$$


$$\mathcal{I} = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{iz \cdot \left(4 + \sqrt{15} \cdot \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z}\right)\right)} = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{4iz + \frac{\sqrt{15}}{2} z^2 - \frac{\sqrt{15}}{2}} =$$

$$= \left\langle \frac{\sqrt{15}}{2} \cdot \left(z + i\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \left(z + i\sqrt{\frac{5}{3}}\right) \right\rangle = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{\frac{\sqrt{15}}{2} \cdot \left(z + i\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \left(z + i\sqrt{\frac{5}{3}}\right)} =$$

$z_0 = i\sqrt{\frac{3}{5}}$  - полюс I порядка.

$$= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-i\sqrt{\frac{3}{5}}} \left[ \frac{1}{\frac{\sqrt{15}}{2} \cdot \left(z + i\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \left(z + i\sqrt{\frac{5}{3}}\right)} \right] = 2\pi i \cdot \left( \frac{1}{4i + \sqrt{15}z} \right) \Big|_{z=-i\sqrt{\frac{3}{5}}} = 2\pi i \cdot$$

$$\cdot \frac{1}{4i - i\sqrt{15}\sqrt{\frac{3}{5}}} = \frac{2\pi i}{4i - 3i} = 2\pi$$



19.

$$\begin{aligned}
\mathcal{I} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x-1}{(x^2+4)^2} dx \\
\mathcal{I} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x-1}{(x+2i)^2(x-2i)^2} dx = \left\langle \begin{array}{l} m_1=0, \quad m_2=2 \\ z_0=2i - \text{полюс II порядка.} \end{array} \right\rangle = 2\pi i \operatorname{Res}_{2i} \left[ \frac{z-1}{(z^2+4)^2} \right] = \\
&= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2i} \left[ \frac{d}{dz} \left( \frac{(z-1)(z-2i)^2}{(z+2i)^2(z-2i)^2} \right) \right] = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2i} \left[ \frac{d}{dz} \left( \frac{(z-1)}{(z+2i)^2} \right) \right] = \\
&= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2i} \left[ \frac{(z+2i)^2 - 2(z+2i)(z-1)}{(z+2i)^4} \right] = 2\pi i \cdot \frac{(4i)^2 - 2 \cdot (4i) \cdot (2i-1)}{(4i)^4} = 2\pi i \cdot \frac{-16 + 16 + 8i}{256} = \\
&= 2\pi i \cdot \frac{i}{32} = -\frac{\pi}{16}
\end{aligned}$$

20.

$$\begin{aligned}
\mathcal{I} &= \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x-1)\sin x}{(x^2+9)^2} dx}_{\mathcal{I}_1} - \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{(x^2+9)^2} dx}_{\mathcal{I}_2} = \mathcal{I}_1 - \mathcal{I}_2 \\
(\mathcal{I}_1) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{(x^2+9)^2} dx &= \Im \left[ 2\pi i \operatorname{Res}_{z=3i} \frac{ze^{iz}}{(z-3i)^2(z+3i)^2} \right] = \Im \left[ 2\pi i \lim_{z \rightarrow 3i} \left[ \frac{d}{dz} \left( \frac{ze^{iz}}{(z+3i)^2} \right) \right] \right] = \\
&= \Im \left[ 2\pi i \lim_{z \rightarrow 3i} \left[ \frac{(e^{iz} + zie^{iz})(z+3i) - 2z(z+3i)e^{iz}}{(z+3i)^4} \right] \right] = \\
&= \Im \left[ 2\pi i \cdot \frac{(e^{-3} - 3e^{-3}) \cdot (-36) + 36e^{-3}}{6^4} \right] = \Im \left[ \frac{72\pi i e^{-3} \cdot 2}{1296} \right] = \frac{\pi}{6e^3} \\
(\mathcal{I}_2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{(x^2+9)^2} dx &= \Im \left[ 2\pi i \operatorname{Res}_{z=3i} \frac{e^{iz}}{(z-3i)^2(z+3i)^2} \right] = \Im \left[ 2\pi i \lim_{z \rightarrow 3i} \left[ \frac{d}{dz} \left( \frac{e^{iz}}{(z+3i)^2} \right) \right] \right] = \\
&= \Im \left[ 2\pi i \lim_{z \rightarrow 3i} \left[ \frac{ie^{iz}(z+3i)^2 - 2(z+3i)e^{iz}}{(z+3i)^4} \right] \right] = \Im \left[ 2\pi i \cdot \frac{ie^{-3} \cdot (-36) - 12ie^{-3}}{6^4} \right] = \\
&= \Im \left[ 2\pi \cdot \frac{36e^{-3} + 12e^{-3}}{1296} \right] = 0 \\
\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 - \mathcal{I}_2 &= \frac{\pi}{6e^3} - 0 = \frac{\pi}{6e^3}
\end{aligned}$$