

BROTHERS

Tempo limite por teste: 1 segundo

Memória limite por teste: 256 mb

Adaptado por: Caique Ramos



Depois dos acontecimentos em Shibuya, Aoi Todo tentou animar seu **brother** Yuuji Itadori o convidando para um restaurante japonês. O restaurante oferece N tipos de sushis diferentes apresentados lado a lado, com cada tipo tendo S_i disponíveis. Além disso, os sushis tradicionais estão sempre nas posições ímpares e os hot-rolls nas posições pares.

O restaurante trabalha com seus pedidos de forma diferente: O cliente deve pedir um subsegmento da vitrine, (Ou seja, pedindo l e r ($1 \leq l \leq r \leq N$), o cliente receberá todos os sushis dos tipos $S_l, S_{l+1}, S_{l+2} \dots S_{r-2}, S_{r-1}, S_r$). Sabendo que Yuuji só come hot rolls e Todo só come sushis tradicionais, Todo quer saber algum par (l, r) que os **brothers** poderão comer a mesma quantidade de sushis.

Entrada

A primeira linha um inteiro N ($1 \leq N \leq 10^5$), representando os tipos de sushis. A segunda linha contém N inteiros $S_1, S_2, \dots, S_N$ ($1 \leq S_i \leq 10^9$, $1 \leq i \leq n$), ou seja, a quantidade de sushis de cada tipo.

Saída

Imprima 2 números l, r separados por espaço que cumpra as condições descritas, caso não exista, imprima "-1". Se existir mais de uma resposta, imprima qualquer uma.

Exemplos

Entrada	Saída
3 1 3 2	1 3
10 1 6 9 8 55 3 14 2 7 2	-1
8 1 2 11 4 1 5 1 2	2 8