

ESPECIALISTAS en **Antisepsia y Desinfección** Hospitalaria



Catálogo de Productos



Línea Antiséptica

 **ESTERICIDE®**
Antiséptico Irrigación Quirúrgica

 **ESTERICIDE®**
Solución Antiséptica

 **ESTERICIDE®**
Gel Antiséptico

 **ESTERICIDE®**
Antiséptico **Bucofaríngeo**

Línea Desinfectante

 **ESTERICLEAN®**
Detergente desinfectante

 **ESTERICIDE®**
Desinfectante de alto nivel **Qx**

 **ESTERICIDE®**
Solución Desinfectante para manos

 **ESTERICIDE®**
Gel desinfectante **para manos**

Es una **empresa mexicana comprometida con la innovación, la tecnología, el desarrollo y la investigación de productos antisépticos y desinfectantes.**

Es el **único fabricante de Soluciones Electrolizadas de Superoxidación con pH neutro eficaces e inocuas, con tecnología patentada**, capaz de controlar su principio activo en diferentes concentraciones, lo que nos permite ofrecer al mercado productos específicos a cada necesidad por medio de cada una de nuestras divisiones.

Las Soluciones Electrolizadas de Superoxidación con pH neutro (SES) son bien conocidas como: desinfectantes y antisépticos de excelencia en el combate de todo tipo de microorganismos patógenos; como bacterias, virus, hongos, esporas e incluso parásitos.¹⁻¹⁰



Se obtienen a partir de la electrólisis controlada de soluciones salinas, como NaCl y desde hace varias décadas se han utilizado como esterilizantes y desinfectantes de alto nivel en múltiples rubros como medicina, agroindustria y veterinaria, sobre superficies, equipos médicos e industriales, así como en la profilaxis y desinfección de alimentos y heridas en animales y humanos.

Fuente:

1.- Velázquez-Meza, M.E., Hernández-Salgado, M., Sánchez-Alemán, M.A. 2015. 2.- Cabello Gutiérrez C., Rosette Olivera, D.P., Manjarrez Zavala M. E. 2009. 3.- Casteel MJ, Sobsey MD, Arrowood MJ., 2000 4.- Samantha Jardón-Xicotencatl, Roberto Díaz-Torres, Alicia Marroquín-Cardona, Tania Villarreal-Barajas, Abraham Méndez-Albores. 2015. 5.- Zeng, X. Ye G., Tang W., Ouyang T., Tian L., Ni Y., Li P. 2011. 112(1), 86. 6.- Ke, Xiong, Xiuting Li, Baoguo Sun, Lite Li, Haijie Liu. 2013. 23(2), 661. 7.- Tang, W., Zeng, X., Zhao, Y. Ye G., Gui W., Ni Y. 2011. 20, 889. 8.- Yu- Ru Huang, Yen-Con Hung, Shun-Yao Hsu, Yao-Wen Huang, Deng-Fwu Hwang, 2008 9.- Boyce JM., 2016, 10. 10.- Fukuzaki S. 2006.



Contenido

Capítulo 1 5

Estericide® Antiséptico Irrigación Quirúrgica
Irrigación Avanzada

Capítulo 2 11

Estericide® Solución Antiséptica y Estericide Gel Antiséptico
Terapia Integral

Capítulo 3 19

Estericide® Antiséptico Bucofaríngeo y Estericide Gel
Antiséptico
El Dúo que usan los expertos en Terapia Intensiva

Capítulo 4 25

Estericlean® y Estericide® Qx
Especialistas en la Desinfección Hospitalaria

Capítulo 5 31

Estericide® Solución y Gel Desinfectante para Manos
Manos Limpias sin Virus



CAPÍTULO 1

Especialistas en la Antisepsia Hospitalaria
Estericide® Antiséptico Irrigación Quirúrgica



Solución Electrolizada de Superoxidación con pH neutro de amplio espectro.

Único antiséptico para **IRRIGACIÓN QUIRÚRGICA** en la prevención y tratamiento de infecciones en cirugías laparoscópicas, endoscópicas y lavados quirúrgicos.



**ÚNICA IRRIGACIÓN
CON ANTISEPSIA**



**DISMINUCIÓN
EFFECTIVA DE
MICROORGANISMOS
PATÓGENOS**



**PREVIENE
COMPLICACIONES**

Cuadro Básico Nacional

Presentación	Bolsa con 500mL	Bolsa con 1 L
CLAVE	060.066.1284	060.066.1292

IRRIGACIÓN AVANZADA



No. Reg. San.: 0820C2016 SSA

Presentación:
500 ml y 1 L

Más información:



<https://esticideirrigacionquirurgica.com/>
bolsadeirrigación@esteripharma.com.mx

in Esteripharma División Hospitalares

MODO DE USO

1



Abra ó corte el empaque de plástico transparente

2



Inserte directamente la bayoneta y/o espiga de manera firme perforando el tapón blanco.

3



Colocar en el tripié

4



Irrigación de manera habitual

Tabla Comparativa

ESTERICIDE®
Antiséptico de Irrigación Quirúrgica

Solución Salina

Efecto de irrigación / arrastre	SI	SI
Compatible con cirugía laparoscópica, endoscópica, abierta y terapia de presión negativa	SI	SI
EFEECTO ANTISÉPTICO	SI	NO
Amplio espectro contra microorganismos	SI	NO
Útil en el tratamiento y prevención de procesos infecciosos	SI	NO
Ayuda a reducir la formación de abscesos y de re intervenciones quirúrgicas	SI	NO
Favorece un menor uso de antibióticos	SI	NO
Conlleva una reducción en los costos de internamiento	SI	NO

En las principales Especialidades:

CIRUGÍA GENERAL



Innovación en Irrigación en Cirugías Endoscópicas
Cirugía General

SEGURIDAD Y EFICACIA EN ANTISEPSIA

UROLOGÍA



Innovación en Irrigación en Cirugías Endoscópicas
Urología

SEGURIDAD Y EFICACIA EN ANTISEPSIA HOSPITALARIA

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA



Innovación en Irrigación en Cirugías de Traumatología y Ortopedia

SEGURIDAD Y EFICACIA EN ANTISEPSIA

GINECOLOGÍA



Innovación en Irrigación en Cirugías de Ginecología y Obstetricia

SEGURIDAD Y EFICACIA EN ANTISEPSIA



CAPÍTULO 2

Especialistas en la Antisepsia Hospitalaria

Estericide® Solución Antiséptica y

Estericide® Gel Antiséptico

ESTERICIDE®

Solución Antiséptica

Estericide® Solución Antiséptica, ideal en la terapia integral de heridas agudas y crónicas como:

- Heridas post-quirúrgicas
- Úlceras
- Abscesos en piel
- Pie diabético
- Dermatitis infecciosa

Indicado como coadyuvante en el tratamiento de todo tipo de infecciones y lesiones en la piel.

Cuadro Básico Nacional LÍNEA ANTISÉPTICA				
Presentación	500 mL	1 L	3 L	5 L
CLAVE	060.066.1177	060.066.1185	060.066.1193	060.066.1201





Estericide® Gel Antiséptico, forma una barrera protectora brindando permanencia antiséptica:

- Favorece la regeneración tisular
- No es citotóxico
- Sin efectos secundarios
- Uso prolongado

Coadyuvante en el tratamiento integral de heridas agudas, crónicas y quemaduras de 2do y 3er grado



Cuadro Básico Nacional LÍNEA ANTISÉPTICA

Presentación	Tubo de Gel con 240 g	Envase con 500 g
CLAVE	060.066.1367	060.066.1375

Presentación:
240 g y 500 g



LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN HERIDAS POST-QUIRÚRGICAS

Las infecciones del sitio quirúrgico integran el 25% de las infecciones adquiridas en la atención sanitaria, por lo que constituyen un grave problema de salud, ya que se asocian a una elevada morbilidad y aumento de los costos de hospitalización, por la prolongada estancia hospitalaria como por la necesidad de utilizar medicamentos e insumos de alto costo, como son los antibióticos de última generación y amplio espectro.

En todos los pacientes se toman medidas universales con el objeto de prevenir infecciones, como es el uso de una profilaxis antimicrobiana adecuada, en el momento y dosis precisos, el baño, así como la preparación preoperatoria de la piel.

GUÍA GLOBAL DE LA OMS PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA.

Esta Guía es el resultado de las tareas conjuntas de cuatro grupos internacionales de trabajo, y como es requisito para la OMS, las medidas propuestas no son sólo de **eficacia y aplicabilidad comprobadas**, sino también **eficientes**, es decir sensibles a los recursos disponibles. Sólo de esta manera las recomendaciones pueden ser globales, independientemente de la capacidad de inversión de las instituciones sanitarias.

IMPACTO DE LAS ISQ (infecciones de sitio quirúrgico)

- ▼ Los autores muestran un breve resumen del **impacto de las infecciones de sitio quirúrgico** alrededor del mundo.
- ▼ Son la segunda Infección Hospitalaria más frecuente.
- ▼ Incrementan más tiempo la **estancia hospitalaria** del paciente afectado.
- ▼ **Triplan el costo de su tratamiento.**
 - La cirugía de colon es la que presenta la incidencia acumulada más alta de pacientes con IHQ : 9,5%
 - La artroplastia de cadera (la cirugía más frecuente) presenta una tasa del 1%.
 - Son preocupantes asimismo las tasas correspondientes al bypass coronario (3,5%), cesárea (2,9%) y colecistectomía (1,4%).

MEDIDAS PRE-OPERATORIAS RECOMENDADAS

Si bien los temas revisados y las medidas recomendadas se agrupan en pre-operatorias, trans-operatorias y post-operatorias, nosotros resumiremos sólo las pre-operatorias, y con especial énfasis en las medidas de tipo higiénico y antiséptico.

Se recomienda **baño o ducha del paciente** previo a la cirugía, pudiéndose emplear tanto jabones antisépticos como no antisépticos.

El panel considera que **también debería aplicarse en pacientes pediátricos** (incluso cuando se usen jabones antisépticos, según recomendaciones del fabricante), aunque falten estudios al respecto.

PREPARACIÓN MECÁNICA DEL INTESTINO Y ANTIBIÓTICOS ORALES

Se recomienda la preparación mecánica del intestino para pacientes de cirugía colo-rectal programada, pero sólo cuando se combina con el uso pre-operatorio de antibióticos orales, y no por sí sola.

NO ELIMINACIÓN DEL VELLO

El panel recomienda, para cualquier tipo de intervención, NO eliminar el vello corporal.

Sólo cuando sea absolutamente necesario, se eliminará mediante el uso de una cortadora tipo clipper, nunca mediante afeitado.

Fuente: ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision Código T80-T88

Fuente: Guía OMS prevención ISQ 2016.

TERAPIA INTEGRAL



No. Reg. San.: 0412C2016 SSA



No. Reg. San.: 1594C2014 SSA

En la Terapia Integral **Estericide® Solución Antiséptica** y **Estericide® Gel Antiséptico** están indicados como coadyuvantes para la prevención y tratamiento de heridas agudas, crónicas, post-quirúrgicas, pie diabético y quemaduras de 2do. y 3er. grado **favoreciendo la cicatrización.**





CAPÍTULO 3

Especialistas en la Antisepsia Hospitalaria
Estericide® Antiséptico Bucofaríngeo y
Estericide® Gel Antiséptico

EL DÚO QUE USAN LOS EXPERTOS EN TERAPIA INTENSIVA



No. Reg. San.: 1003C2013 SSA



No. Reg. San.: 1594C2014 SSA

Estericide® Antiséptico Bucofaríngeo y Estericide® Gel Antiséptico son la opción ideal para la **antisepsia de la cavidad oral** de los pacientes intubados y así contribuir en la **prevención de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica, (NAVM)**.

- ▼ **No son citotóxicos**
- ▼ **Previenen** la proliferación bacteriana
- ▼ **Rompen** enlaces de microorganismos en la formación de biofilm*
- ▼ **Uso prolongado seguro**

*3) Ortega Peña Silvestre, Hidalgo González Christian, C Robson & Krötzsch. In vitro microbicial, anti-biofilm and cytotoxic effects of different commercial antiseptics – International Wound Journal.



LÍNEA ANTISÉPTICA

ESTERICIDE®
Antiséptico Irrigación Quirúrgica



No. Reg. San.: 0820C2016 SSA

ESTERICIDE®
Solución Antiséptica



No. Reg. San.: 0412C2016 SSA



ESTERICIDE®
Gel Antiséptico



No. Reg. San.: 1594C2014 SSA

ESTERICIDE®
Antiséptico Bucofaríngeo



No. Reg. San.: 1003C2013 SSA

LÍNEA DESINFECTANTE

ESTERICLEAN®
Detergente desinfectante



No. Reg. San.: 2951C2012 SSA

ESTERICIDE®
Desinfectante de alto nivel



No. Reg. San.: 0363C2006 SSA



ESTERICIDE®
Solución Desinfectante para manos



No. Reg. San.: 0670C2014 SSA

ESTERICIDE®
Gel desinfectante para manos



No. Reg. San.: 0669C2014 SSA





CAPÍTULO 4

Especialistas en la Desinfección Hospitalaria
Estericlean® y Estericide® Qx

ESTERICLEAN®

Detergente desinfectante

Estericlean® es un detergente desinfectante biodegradable a base de solución electrolizada de superoxidación de amplio espectro, que rompe la cohesión y adherencia de la suciedad sobre las superficies inertes mejorando la limpieza y disminuyendo eficazmente los microorganismos que causan enfermedades.



Presentación:
5L Y 20L

Modo de uso

Utilice una dilución de (1:20) Ideal para realizar el lavado de superficies, materiales, instrumental o equipo quirúrgico u hospitalario. Posteriormente enjuague.



No. Reg. San.: 2951C2012SSA

IMPORTANCIA DE LA HIGIENE AMBIENTAL DEL QUIRÓFANO Y DE LA DESCONTAMINACIÓN DE EQUIPOS

Al margen de las medidas peri-operatorias, el panel de expertos dedica un capítulo de la guía a la importancia de la **higiene ambiental en el quirófano** y a la **descontaminación de equipos e instrumental**, enfatizando algunos puntos primordiales:

- ▼ La limpieza es un paso previo imprescindible para la desinfección, ya que incrementa la eficacia de ésta, y previene la formación de biofilm.
- ▼ La limpieza se lleva siempre a cabo **desde las zonas más limpias hacia las más sucias, y de arriba abajo**.
- ▼ Debe evitarse todo tipo de limpieza que provoque la dispersión de polvo y contaminación de área.
- ▼ Para los desinfectantes que requieran dilución, ésta debe realizarse según las instrucciones del fabricante.
- ▼ En **concentraciones demasiado bajas pierden eficacia** y, si son demasiado altas, pueden deteriorar materiales.
 - No es precisa la **monitorización** bacteriológica de la eficacia de la higiene ambiental, salvo por razones formativas o para determinar el foco de un brote.
 - Superficies que pueden requerir especial foco en su desinfección:
 - Aquellas que reciban contacto manual frecuente.
 - Las contaminadas con sangre o fluidos corporales (deben ser tratadas inmediatamente).

- Limpieza y desinfección deben realizarse con **EPP (Equipo de Protección Personal) o Bioseguridad** que consiste en guantes adecuados, gafas o protector facial, bata, cubrebocas.
- Antes y después de cada procedimiento quirúrgico se precisa la **limpieza y desinfección con procesos establecidos**.
- Todos los equipos deben ser **reprocesados**, y el instrumental quirúrgico debe ser escrupulosamente **descontaminado/esterilizado** en función de la ya conocida clasificación de Spaulding:
 - **Material Crítico:** Esterilización (en contacto con sangre o tejidos estériles incluyendo el sistema vascular ejemplo instrumental quirúrgico, catéteres, sondas cardiacas, prótesis)
 - **Material Semi-Crítico:** Desinfección de Alto Nivel (DAN), minimizando la potencial toxicidad en humanos. (Contacto con la mucosa de los tractos respiratorios, genital y urinario, y con la piel que no se encuentra intacta deben ser estériles, o bien mínimamente, deben ser sometidos a desinfección de alto nivel, ejemplo equipos de asistencia respiratoria, anestesia, cubículos de urgencias, terapia intensiva, etc.)
 - **Material No-Crítico:** Desinfección de Bajo Nivel (DBN). (contacto con piel intacta ejemplo ropa de cama, equipo para toma de signos vitales, muebles y superficies, etc.)

Fuente: ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revisión
Código T80-T88

Fuente: Guía OMS prevención ISQ 2016.





Estericide® Qx es una solución electrolizada de superoxidación con pH neutro.

Elimina virus, bacterias y hongos en 30 segundos y esporas en 5 minutos.

Desinfección de alto nivel en superficies y equipo hospitalario.
Esterilización en frío para instrumental quirúrgico y material termolábil.



Desinfección de alto nivel por aspersión

- Equipo Médico
- Superficies
- Instalaciones
Médico- Hospitalarias



Esterilización en frío por inmersión

- Instrumental Quirúrgico
- Material Termolábil
- Endoscopios
- Sondas

Presentación:
1L, 3L, 5L Y 20L



Cuadro Básico Nacional

Presentación	Estericide® Qx
CLAVE	060.066.1003

No. Reg. San.: 0363C2006 SSA



CAPÍTULO 5

Especialistas en la Desinfección para Manos

Estericide® Solución Desinfectante y

Estericide® Gel Desinfectante



Estericide® Solución Desinfectante para Manos es una solución electrolizada de superoxidación con pH neutro que elimina virus, bacterias y hongos en 30 segundos contribuyendo a prevenir y evitar las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS).



- Elimina el 99.999% de las bacterias, virus y hongos en sólo 30 segundos*
- No irrita ni reseca
- No contiene alcohol
- Es ideal para la desinfección antes y después del contacto con pacientes

*in vitro

Presentación:

Dispensador automático con cartuchos de repuesto (3 de 500 ml)
Repuestos: 1 L y 500 ml





Estericide® Solución Desinfectante para manos y Estericide® Gel Desinfectante para manos:

Ayudan a prevenir la transmisión de gérmenes perjudiciales para la salud.



- No contienen alcohol
- No resecan las manos
- No causan ardor
- No causan irritación

Aplicar las veces que sean necesarias

Aplicar en forma directa en las manos, frotar y desvanecer sin enjuagar



No. Reg. San.: 0670C2014 SSA


Presentación:
500 ml



No. Reg. San.: 0669C2014 SSA

Presentación:
500 g

Sus 5 Momentos para la Higiene de las Manos



1	ANTES DE TOCAR AL PACIENTE	¿CUÁNDO?	Lávase las manos antes de tocar al paciente cuando se acerque a él.
		¿POR QUÉ?	Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que tiene usted en las manos.
2	ANTES DE REALIZAR UNA TAREA LIMPIA/ASEPTICA	¿CUÁNDO?	Lávase las manos inmediatamente antes de realizar una tarea limpia/aseptica.
		¿POR QUÉ?	Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podrían entrar en su cuerpo, incluidos los gérmenes del propio paciente.
3	DESPUÉS DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A LÍQUIDOS CORPORALES	¿CUÁNDO?	Lávase las manos inmediatamente después de un riesgo de exposición a líquidos corporales (y tras quitarse los guantes).
		¿POR QUÉ?	Para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente.
4	DESPUÉS DE TOCAR AL PACIENTE	¿CUÁNDO?	Lávase las manos después de tocar a un paciente y la zona que lo rodea, cuando deje la cabecera del paciente.
		¿POR QUÉ?	Para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente.
5	DESPUÉS DEL CONTACTO CON EL ENTORNO DEL PACIENTE	¿CUÁNDO?	Lávase las manos después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato del paciente, cuando lo deje (incluso aunque no haya tocado al paciente).
		¿POR QUÉ?	Para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente.

Fuente: OMS

SEGURIDAD Y EFICACIA EN DESINFECCIÓN HOSPITALARIA

MANOS LIMPIAS SIN VIRUS

ESTERIPHARMA
INNOVANDO SOLUCIONES PARA LA SALUD



No. Reg. San.: 0670C2014 SSA

No. Reg. San.: 0669C2014 SSA

ESTERICIDE
Solución Desinfectante para manos

ESTERICIDE
Gel desinfectante para manos



INNOVANDO SOLUCIONES PARA LA SALUD



H-ESA-CATALAG-23



Esteripharma División Hospitales



www.esteripharma.com

Atención a clientes 800 838 7659

Aviso de Publicidad No.: 2315052002C00531

