Exercices

(1) 🥕 🥕 Former une équation du second degré ayant pour solutions :

a)
$$7 \text{ et } -3$$

b) 3 et
$$\frac{1}{2}$$

c)
$$2 + \sqrt{6}$$
 et $2 - \sqrt{6}$

d)
$$\frac{-1-\sqrt{3}}{3}$$
 et $\frac{-1+\sqrt{3}}{3}$

Exprimer la réponse sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$, où a, b et c sont des nombres entiers.

(2) 🖋 🥕 Résoudre les équations dans 🏿 :

a)
$$x^3 - 6x^2 - 5x + 30 = 0$$

b)
$$(x^2 + 4)(x^2 - x + 1) = 0$$

c)
$$(2x-1)(x^2-4x-2)=0$$

d)
$$x^4 - 11x^2 + 30 = 0$$

(3) 3 3 3 Résoudre dans IR.

a)
$$(x + 1)(x + 2) + (x + 3)(x + 4) = 42$$

b)
$$(x-6)(x+1) - (2x+3)(x-5) = 0$$
.

c)
$$(3x-5)^2-12x=1$$

d)
$$(2x+1)^2 + 3x = 1$$

e)
$$(x-3)^2 + (x+4)^2 = x(x+1)$$

f)
$$(x+1)^2 - (x-1)^2 = (x-8)^2$$

g)
$$\frac{x^2}{3} + \frac{4x}{5} - 19 = \frac{76}{5}$$

h)
$$\frac{(x-2)^2}{5} - \frac{(x-3)^2}{4} = 0$$

i)
$$x = \frac{2}{5} + \frac{5x^2}{16}$$

j)
$$18x^3 - 5 = 2x - 45x^2$$

4 $\cancel{3}$ Trouver trois nombres entiers consécutifs tels que leur produit vaut le quintuple de leur somme. (Indication : prendre l'entier intermédiaire comme inconnue x.)

(5) 🚜 🥦 Résoudre dans IR les équations suivantes :

a)
$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

b)
$$x^2(x^2+1) = 12$$

c)
$$2x^4 + x^2 - 3 = 0$$

d)
$$4x^4 - 6x^2 + 1 = 0$$

(Indication : utiliser la factorisation ou le changement de variable $y=x^2$)

-Entraînement individuel -

6 Résoudre dans IR.

a)
$$3x^2 + 26x - 9 = 0$$

b)
$$64 = -x^2$$

c)
$$x^2 + 5x - 5 = 0$$

d)
$$2x^2 = x - 1$$

e)
$$x^2 - 10x + 63 = 0$$

f)
$$4x^2 - 20x + 25 = 0$$

g)
$$7x^2 + 25x - 12 = 0$$

h)
$$x^2 = 2x$$

i)
$$9x^2 + 42x + 49 = 0$$

$$j) 6x^2 - 13x + 6 = 0$$

k)
$$x^2 - 6x + 4 = 0$$

$$1) 4x(1+x) = -1$$