


French Math Preset & New Features

QR sidebar (any env):

Théorème 1
Pythagore

Dans tout triangle rectangle: $a^2 + b^2 = c^2$.



Fill space — space: "lines":

En pratique 1 Résoudre l'équation $2x - 5 = 7$ et vérifier votre réponse.

Fill space — space: "grid":

En pratique 1 Représenter graphiquement la fonction $f(x) = -x^2 + 4$ sur $[-3; 3]$.



Formule 1
Quadratique

Les solutions de $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a \neq 0$) sont $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Formules 2

- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
- $\tan \theta = \sin \frac{\theta}{\cos}$

Méthode 1
Résolution par factorisation

- Identifier les termes à factoriser.
- Poser $f(x) = 0$ et factoriser.
- Lire les solutions comme zéros de chaque facteur.

Notation On note f' la fonction dérivée de f , et f'' sa dérivée seconde.

Discussion Le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ permet de déterminer le nombre de solutions réelles : deux si $\Delta > 0$, une si $\Delta = 0$, aucune si $\Delta < 0$.