

Analyse II : Contrôle N° 3

Durée : 1 heure 45 minutes - Barème sur 20 points

NOM : _____

PRENOM : _____

GROUPE

1. Résoudre sur son ensemble de définition l'équation :

$$\frac{1}{x^{1+(\ln x)^2}} = x^{\left(\frac{4}{\ln x^2}\right)}$$

4 pts

2. (a) Résoudre l'équation puis représenter les solutions dans le plan de Gauss :

$$z^3 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i)$$

3 pts

- (b) Résoudre l'équation :

$$2z^6 + \sqrt{2}(3 - i)z^3 + 2(1 - i) = 0$$

4.5 pts

3. Résoudre le système :

$$\begin{cases} \operatorname{Ch} x + \operatorname{Ch} y &= \frac{5}{2} \\ \operatorname{Sh} x + \operatorname{Sh} y &= \frac{3}{2} \end{cases}$$

4,5 pts

4. Soient deux sommets consécutifs :
- $P_1 = (4; 4)$
- et
- $P_2 = (3 - \sqrt{3}; 3 + \sqrt{3})$
- d'un hexagone (polygone à 6 cotés) régulier et orienté positivement.

Par un calcul dans \mathbb{C} , déterminer l'afixe du sommet P_4 .*Indication* : Faites une figure d'étude .

4 pts

Formulaire

$$\operatorname{Ch}(x+y) = \operatorname{Ch} x \operatorname{Ch} y + \operatorname{Sh} x \operatorname{Sh} y ; \quad \operatorname{Ch}(x-y) = \operatorname{Ch} x \operatorname{Ch} y - \operatorname{Sh} x \operatorname{Sh} y ;$$

$$\operatorname{Sh}(x+y) = \operatorname{Sh} x \operatorname{Ch} y + \operatorname{Ch} x \operatorname{Sh} y ; \quad \operatorname{Sh}(x-y) = \operatorname{Sh} x \operatorname{Ch} y - \operatorname{Ch} x \operatorname{Sh} y ;$$

$$\operatorname{Th}(x+y) = \frac{\operatorname{Th} x + \operatorname{Th} y}{1 + \operatorname{Th} x \operatorname{Th} y} ; \quad \operatorname{Th}(x-y) = \frac{\operatorname{Th} x - \operatorname{Th} y}{1 - \operatorname{Th} x \operatorname{Th} y} ;$$

$$\operatorname{Ch} x + \operatorname{Ch} y = 2 \operatorname{Ch} \left(\frac{x+y}{2} \right) \operatorname{Ch} \left(\frac{x-y}{2} \right) ; \quad \operatorname{Ch} x - \operatorname{Ch} y = 2 \operatorname{Sh} \left(\frac{x+y}{2} \right) \operatorname{Sh} \left(\frac{x-y}{2} \right) ;$$

$$\operatorname{Sh} x + \operatorname{Sh} y = 2 \operatorname{Sh} \left(\frac{x+y}{2} \right) \operatorname{Ch} \left(\frac{x-y}{2} \right) ; \quad \operatorname{Sh} x - \operatorname{Sh} y = 2 \operatorname{Ch} \left(\frac{x+y}{2} \right) \operatorname{Sh} \left(\frac{x-y}{2} \right) ;$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{Ch} x = \frac{1+t^2}{1-t^2} ; \quad \operatorname{Sh} x = \frac{2t}{1-t^2} ; \quad \operatorname{Th} x = \frac{2t}{1+t^2} ; \quad \text{où } t = \operatorname{Th} \frac{x}{2}$$

$$\operatorname{Arch} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right) ; \quad \forall x \in [1, +\infty[; \quad \operatorname{Arsh} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right) ; \quad \forall x \in \mathbb{R} ;$$

$$\operatorname{Arth} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) ; \quad \forall x \in]-1, +1[; \quad \operatorname{Arcoth} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) ; \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus [-1, +1] ;$$

$$\operatorname{Arch}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} ; \quad \forall x \in]1, +\infty[; \quad \operatorname{Arsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} ; \quad \forall x \in \mathbb{R} ;$$

$$\operatorname{Arth}'(x) = \frac{1}{1-x^2} ; \quad \forall x \in]-1, +1[; \quad \operatorname{Arcoth}'(x) = \frac{1}{1-x^2} ; \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus [-1, +1] .$$