


Corrigé 12


Rang-Systèmes : exercice 9

- (a) On interprète l'intersection de ces 3 plans comme un système d'équations dont on discute l'existence éventuelle de solutions au moyen de la notion de rang.


On veut $\alpha \cap \beta \cap \gamma = \emptyset$, géométriquement on a donc une des trois situations suivantes :



Les trois plans sont parallèles.



Deux plans sont parallèles et le troisième les coupe.



Les trois plans se coupent 2 à 2.

On considère le système noté (S) , formé par les équations des plans α , β et γ :

$$(S) : \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + kz = 3 \\ x + ky + 3z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & k \\ 1 & k & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow AX = C$$

$\alpha \cap \beta \cap \gamma = \emptyset \Leftrightarrow (S) \text{ n'admet pas de solution } \Leftrightarrow \text{rg } B \neq \text{rg } A \text{ où } B = (A \ C)$

On commence par calculer le déterminant de A , ce qui permet de connaître le nombre de cas à discuter en fonction du paramètre k .

$A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$. On calcule donc son déterminant.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & k \\ 1 & k & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & k+3 \\ 1 & k & 3+k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3-k & 0 \\ 1 & k & 3+k \end{vmatrix} = (k+3)(2-k)$$

Il y a 3 cas à examiner en fonction des valeurs du paramètre k . Pour chaque cas, on détermine si le rang de B est égal au rang de A .

- $\mathbf{m} \notin \{-3, 2\} \Leftrightarrow \det A \neq 0 \Leftrightarrow \text{rg } A = 3 = \text{rg } B$

$$\text{car } B = (A \ C) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & k & 3 \\ 1 & k & 3 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}(3 \times 4, \mathbb{R}) \text{ et } \text{rg } B \leq 3$$

On peut donc extraire de B le déterminant de A , d'ordre 3, qui est différent de 0. Ainsi le rang de B est 3.

Le système admet des solutions.

En fait dans un tel cas (nombre d'équations = nb d'inconnues = rang de A), on a nécessairement que $\text{rg } B = \text{rg } A$!

- $\mathbf{k} = -3 \Leftrightarrow \det A = 0 \Leftrightarrow \text{rg } A \leq 2$

$$\text{La matrice devient : } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Soit le déterminant d'ordre 2 suivant : $P = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$ donc $\text{rg } A = 2$

On choisit P comme déterminant principal.

Il y a un seul déterminant caractéristique car :
(nombre de ligne de A) - (rang de A) = $3 - 2 = 1$.

Il est d'ordre 3. D'où :

$$C_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & -3 & 5 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \text{rg } B \neq \text{rg } A$$

Le système n'admet pas de solutions.

- $\mathbf{k} = 2 \Leftrightarrow \det A = 0 \Leftrightarrow \text{rg } A \leq 2$

$$\text{La matrice } A \text{ devient : } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Soit le déterminant d'ordre 2 suivant : $P = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$ donc $\text{rg } A = 2$

On choisit P comme déterminant principal.


Il y a un seul déterminant caractéristique car :
(nombre de ligne de A) - (rang de A) = $3 - 2 = 1$.

Il est d'ordre 3. D'où :

$$C_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \operatorname{rg} B = \operatorname{rg} A$$

Le système admet des solutions.

- (b) L'intersection des 3 plans est une droite dont les équations dépendent d'un paramètre. Géométriquement on a la situation suivante :



On considère le système noté (S) , formé par les équations des plans α , β et γ :

$$(S) : \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + kz = 3 \\ x + ky + 3z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & k \\ 1 & k & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow AX = C$$

$$\alpha \cap \beta \cap \gamma = d$$

\Leftrightarrow

(S) admet des solutions, donc $\operatorname{rg} B = \operatorname{rg} A$ où $B = (A \ C)$ et elles dépendent d'un seul paramètre.

On a :

nombre de paramètres = nombre d'inconnues - rang de $A = 3 - \operatorname{rg} A = 1 \Rightarrow \operatorname{rg} A = 2$

Ainsi :

$$\alpha \cap \beta \cap \gamma = d \Leftrightarrow \operatorname{rg} B = \operatorname{rg} A = 2 \\ \Leftrightarrow k = 2 \quad (\text{voir partie a))}$$

$$\text{Pour } k = 2, \text{ la matrice } A \text{ devient : } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

et on a choisi le déterminant principal suivant : $P = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1$

Le système se ramène aux équations principales :

$$(S') : \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + 2z = 3 \end{cases}$$

que l'on résout par rapport aux inconnues principales x et y (définies par P), en

fonction du paramètre z (inconnue non principale).

$$(S') : \begin{cases} \textcolor{red}{x} + \textcolor{red}{y} = 1 + z \\ \textcolor{red}{2x} + \textcolor{red}{3y} = 3 - 2z \end{cases} \quad \text{et on pose : } z = \beta \in \mathbb{R}$$

$$(S'') : \begin{cases} x + y = 1 + \beta \\ 2x + 3y = 3 - 2\beta \\ z = \beta \end{cases}$$

Les 2 premières équations forment un système de Cramer de rang 2 (car $P = 1$).
On détermine x et y en utilisant les formules :

$$x = \frac{1}{1} \begin{vmatrix} 1 + \beta & 1 \\ 3 - 2\beta & 3 \end{vmatrix} = 5\beta, \quad y = \frac{1}{1} \begin{vmatrix} 1 & 1 + \beta \\ 2 & 3 - 2\beta \end{vmatrix} = 1 - 4\beta$$

D'où l'ensemble des solutions, c'est-à-dire les équations paramétriques de la droite d :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\beta \\ 1 - 4\beta \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \beta \in \mathbb{R}$$

Remarque :

Résoudre le système (S) revient à déterminer l'intersection des plans α et β . Il suffit de chercher un point commun aux 2 plans et un vecteur directeur de d ($\vec{d} = \vec{n}_\alpha \times \vec{n}_\beta$) !

Rang-Systèmes : exercice 10

- (a) Ecrire le système sous forme matricielle : $A X = 0$, $A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

$$(S) : \begin{cases} 2x + y - 2z = 0 \\ 3x + 2y + 2z = 0 \\ 5x + 4y + 3z = 0 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations (n) = nombre d'inconnues (p) = 3.

$$(S) : A X = 0 \quad \text{avec} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Remarque :

Comme $C = 0$, il est évident que $\text{rg } B = \text{rg } A$: ce système admet *toujours* au moins la solution $X = 0$.

On détermine le rang de A .

$A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$.

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & 2 \\ 8 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 6 \\ 8 & 4 & 11 \end{vmatrix} = -7 \neq 0 \quad \text{donc} \quad \text{rg}$$

$$A = 3 = \text{rg } (S)$$

(S) est un système de Cramer de rang 3 ($n = p = 3 = \text{rg } A$).

Il admet pour solution unique $X = A^{-1}0 = 0$

$$\text{c'est-à-dire : } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- (b) Ecrire le système sous forme matricielle : $AX = C$, $A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

$$(S) : \begin{cases} 2x + y - 2z = 10 \\ 3x + 2y + 2z = 1 \\ 5x + 4y + 3z = 4 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations (n) = nombre d'inconnues (p) = 3.

$$(S) : AX = C \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

On détermine le rang de A .

$A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$.

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & 2 \\ 8 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 6 \\ 8 & 4 & 11 \end{vmatrix} = -7 \neq 0 \text{ donc rg } A = 3$$

(S) est un système de Cramer de rang 3 ($n = p = 3 = \text{rg } A$).

Il admet pour solution unique $X = A^{-1}C$, calculée grâce aux formules de Cramer.

$$x = -\frac{1}{7} \begin{vmatrix} 10 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 1, \quad y = -\frac{1}{7} \begin{vmatrix} 2 & 10 & -2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2, \quad z = -\frac{1}{7} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 10 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 4 \end{vmatrix} = -3$$

$$\text{D'où la solution } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

- (c) Ecrire le système sous forme matricielle : $AX = 0$, $A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

$$(S) : \begin{cases} 2x + 5y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ 3x + 3y + 2z = 0 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations (n) = nombre d'inconnues (p) = 3.

$$(S) : AX = 0 \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On détermine le rang de A .

$A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$.

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0 \text{ donc } \operatorname{rg} A \leq 2$$

Soit le déterminant d'ordre 2 suivant : $P = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ donc $\operatorname{rg} A = 2$

Le rang de (S) est donc 2 et $P = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$ est choisi comme déterminant principal.

(d) Comme $C = 0$, le système admet des solutions et il est équivalent aux équations principales définies par $P = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$:

$$(S') : \begin{cases} 2x + 5y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

que l'on résout par rapport aux inconnues principales x et z (définies par P), en fonction du paramètre y (inconnue non principale).

$$(S') : \begin{cases} 2x + z = -5y \\ x + z = 2y \end{cases} \text{ et on pose : } y = \beta \in \mathbb{R}$$

$$(S'') : \begin{cases} 2x + z = -5\beta \\ x + z = 2\beta \\ y = \beta \end{cases}$$

Les 2 premières équations forment un système de Cramer de rang 2 (car $P = 1$). On détermine x et z en utilisant les formules :

$$x = \frac{1}{1} \begin{vmatrix} -5\beta & 1 \\ 2\beta & 1 \end{vmatrix} = -7\beta, \quad z = \frac{1}{1} \begin{vmatrix} 2 & -5\beta \\ 1 & 2\beta \end{vmatrix} = 9\beta$$

$$\text{D'où l'ensemble des solutions : } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7\beta \\ \beta \\ 9\beta \end{pmatrix} = \beta \begin{pmatrix} -7 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}, \beta \in \mathbb{R}$$

(e) Ecrire le système sous forme matricielle : $AX = 0$, $A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

$$(S) : \begin{cases} -2x + y + 3z = 0 \\ 2x - y - 3z = 0 \\ -6x + 3y + 9z = 0 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations (n) = nombre d'inconnues (p) = 3.

$$(S) : AX = 0 \text{ avec } A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -3 \\ -6 & 3 & 9 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Il est évident que le rang de A est 1, ce qui est le rang de (S) , les 3 lignes étant proportionnelles.

On choisit $P = |1|$ comme déterminant principal.

Comme $C = 0$, le système admet des solutions et il est équivalent à l'équation principale (définie par P).

$$(S') : -2x + y + 3z = 0 \text{ et on pose } x = \alpha, z = \beta \in \mathbb{R}$$

que l'on résoud par rapport à l'inconnue principale y (définie par P), en fonction des paramètres x et z (inconnues non principales).

$$(S'') : y = 2x - 3z \text{ et on pose } x = \alpha, z = \beta \in \mathbb{R}$$

$$(S'') \begin{cases} y = 2\alpha - 3\beta \\ x = \alpha \\ z = \beta \end{cases}$$

L'ensemble des solutions est donc :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\alpha - 3\beta \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

- (f) Ecrire le système sous forme matricielle : $AX = C$, $A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

$$(S) : \begin{cases} x + 2y - 3z = -1 \\ 3x - y + 2z = 7 \\ 5x + 3y - 4z = 2 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations (n) = nombre d'inconnues (p) = 3.

$$(S) : AX = C \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 5 & 3 & -4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}$$

On détermine le rang de A .

$A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 5 & 3 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & -1 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 8 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{donc } \text{rg } A \leq 2$$

$$\text{Soit le déterminant d'ordre 2 suivant : } P = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$$

donc $\text{rg } A = 2 = \text{rg } (S)$.

On choisit P comme déterminant principal.

Il est nécessaire de se poser la question si ce système possède des solutions (car $C \neq 0$ et $\text{rg } A < 3$).

Le système admet des solutions si et seulement si $\text{rg } B = \text{rg } A$ où B est la matrice augmentée de A . C'est-à-dire :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 7 \\ 5 & 3 & -4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } B \leq 3$$

$$\text{Or } \text{rg } B = \text{rg } A \text{ ssi tous les déterminants caractéristiques construits sur } P = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

sont nuls.

Il y a un seul déterminant caractéristique car :

$$(\text{nombre de lignes de } A) - (\text{rang de } A) = 3 - 2 = 1$$

Il est d'ordre 3. D'où :

$$C_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 7 \\ 5 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 10 \\ 5 & 3 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -7 & 10 \\ 5 & -7 & 7 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \text{rg } B \neq \text{rg } A$$

Le système n'admet pas de solution.

- (g) Ecrire le système sous forme matricielle : $AX = C$, $A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

$$(S) : \begin{cases} 2x + y - 3z = 1 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations (n) = nombre d'inconnues (p) = 3.

$$(S) : AX = C \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On détermine le rang de A .

$A \in \mathbb{M}(3 \times 3, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$.

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{donc } \text{rg } A \leq 2$$

Soit le déterminant d'ordre 2 suivant : $P = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ donc $\text{rg } A = 2 = \text{rg } (S)$.

On choisit P comme déterminant principal.

Il est nécessaire de se poser la question si ce système possède des solutions (car $C \neq 0$ et $\text{rg } A < 3$).

Le système admet des solutions si et seulement si $\text{rg } B = \text{rg } A$ où B est la matrice augmentée de A . C'est-à-dire :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } B \leq 3$$

Or $\text{rg } B = \text{rg } A$ ssi tous les déterminants caractéristiques construits sur $P = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ sont nuls.

Il y a un seul déterminant caractéristique car :

$$(\text{nombre de lignes de } A) - (\text{rang de } A) = 3 - 2 = 1$$

Il est d'ordre 3. D'où :

$$C_1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Le système admet des solutions et il est équivalent aux équations principales.

Déterminer les solutions du système.

On considère le système (S') formé des équations principales :

$$(S') : \begin{cases} 2x + y - 3z = 1 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \end{cases}$$

que l'on résoud par rapport aux inconnues principales x et y (définies par P), en fonction du paramètre z (inconnue non principale).

$$(S') : \begin{cases} 2x + y = 1 + 3z \\ 3x + 2y = 2 + 2z \end{cases} \quad \text{et on pose : } z = \beta \in \mathbb{R}$$

$$(S'') : \begin{cases} 2x + y = 1 + 3\beta \\ 3x + 2y = 2 + 2\beta \\ z = \beta \end{cases}$$

Les 2 premières équations forment un système de Cramer de rang 2 (car $P = 1$).

On détermine x et z en utilisant les formules :

$$x = \frac{1}{1} \begin{vmatrix} 1 + 3\beta & 1 \\ 2 + 2\beta & 2 \end{vmatrix} = 4\beta, \quad y = \frac{1}{1} \begin{vmatrix} 2 & 1 + 3\beta \\ 3 & 2 + 2\beta \end{vmatrix} = 1 - 5\beta$$

L'ensemble des solutions est donc :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4\beta \\ 1 - 5\beta \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta \in \mathbb{R}$$

Rang-Systèmes : exercice 11

- (a) Ecrire le système sous forme matricielle : $AX = 0$, $A \in \mathbb{M}(4 \times 3, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

$$(S) : \begin{cases} x + 3y + 2z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \\ 3x - 5y + 4z = 0 \\ x + 17y + 4z = 0 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations ($n = 4$) \neq nombre d'inconnues ($p = 3$).

$$(S) : AX = 0 \quad \text{avec} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -5 & 4 \\ 1 & 17 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On détermine le rang de A : $A \in \mathbb{M}(4 \times 3, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$.

Si il existe au moins un déterminant non nul d'ordre 3 extrait de A alors son rang est 3. On calcule :

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -5 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & -1 \\ 3 & -5 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 8 & -2 \\ 0 & 4 & -1 \\ -1 & -5 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

Il faut donc continuer ! Dans le pire des cas ($\text{rg } A < 3$) il faut encore calculer 3 déterminants. On change donc de méthode !

On considère les 3 vecteurs colonne de la matrice : $A = (\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c})$.

Il est relativement facile de voir que : $\vec{b} = -11\vec{a} + 7\vec{c}$ et que \vec{a} et \vec{c} ne sont pas colinéaires.

Donc : $\text{rg } A = 2 = \text{rg } (S)$.

On choisit le déterminant d'ordre 2 suivant comme déterminant principal :

$$P = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$$

Le système étant homogène ($C = 0$), il admet des solutions et il est équivalent aux équations principales définies par P ,

$$(S') : \begin{cases} x + 3y + 2z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases} \quad \text{et on pose : } z = \beta \in \mathbb{R}$$

que l'on résout par rapport aux inconnues principales x et y (définies par P), en fonction du paramètre z (inconnue non principale).

$$(S'') : \begin{cases} x + 3y = -2\beta \\ 2x - y = -3\beta \\ z = \beta \end{cases}$$

Les 2 premières équations forment un système de Cramer de rang 2 (car $P = -7$).

On détermine x et y en utilisant les formules :

$$x = -\frac{1}{7} \begin{vmatrix} -2\beta & 3 \\ -3\beta & -1 \end{vmatrix} = -\frac{11}{7}\beta, \quad y = -\frac{1}{7} \begin{vmatrix} 1 & -2\beta \\ 2 & -3\beta \end{vmatrix} = -\frac{1}{7}\beta$$

$$\text{D'où l'ensemble des solutions : } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 11\beta \\ \beta \\ -\beta \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 11 \\ 1 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

On peut aussi déterminer l'ensemble des solutions en considérant (S'') comme l'intersection de 2 plans α et β passant par l'origine. L'ensemble des solutions est donc une droite d ; elle passe par O et a pour vecteur directeur

$$\vec{d} = \vec{n}_\alpha \times \vec{n}_\beta = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 1 \\ -7 \end{pmatrix}$$

- (b) Ecrire le système sous forme matricielle : $AX = C$, $A \in \mathbb{M}(4 \times 3, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

$$(S) : \begin{cases} x + y - 3z = -1 \\ 2x + y - 2z = 1 \\ x + y + z = 3 \\ x + 2y - 3z = 1 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations ($n = 4$) \neq nombre d'inconnues ($p = 3$).

$$(S) : AX = C \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On détermine le rang de $A : A \in \mathbb{M}(4 \times 3, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$.

Si il existe au moins un déterminant non nul d'ordre 3 extrait de A alors son rang est 3. On calcule :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 = P$$

Donc : $\text{rg } A = 3 = \text{rg } (S)$ et on choisit ce déterminant P comme principal.

Il est nécessaire de se poser la question si ce système possède des solutions (car $C \neq 0$ et $\text{rg } A = 3 < 4$).

Le système admet des solutions si et seulement si $\text{rg } B = \text{rg } A$ où B est la matrice augmentée de A . C'est-à-dire :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } B \leq 4$$

Or $\text{rg } B = \text{rg } A$ ssi tous les déterminants caractéristiques construits sur $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ sont nuls.

Il y a un seul déterminant caractéristique car :

$$(\text{nombre de lignes de } A) - (\text{rang de } A) = 4 - 3 = 1$$

Il est d'ordre 4. D'où :

$$\begin{aligned} C_1 &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 3 & -5 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \\ &(-1) \begin{vmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 3 & -5 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \\ &= (-1) \begin{vmatrix} 0 & -4 & -4 \\ 3 & -5 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 3 & -7 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 4(-6 + 7) \neq 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \text{rg } B \neq \text{rg } A$$

Le système n'admet pas de solution.

- (c) Ecrire le système sous forme matricielle : $AX = C$, $A \in \mathbb{M}(4 \times 3, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

$$(S) : \begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ -4x + 2y + z = 3 \\ -2x + y + 4z = 4 \\ 10x - 5y - 6z = -10 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations ($n = 4$) \neq nombre d'inconnues ($p = 3$).

$$(S) : AX = C \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -4 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \\ 10 & -5 & -6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ -10 \end{pmatrix}$$

On détermine le rang de A : $A \in \mathbb{M}(4 \times 3, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$.

On considère les 3 vecteurs colonne de la matrice : $A = (\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c})$.

Il est évident que : $\vec{a} = -2\vec{b}$ et que \vec{b} et \vec{c} ne sont pas colinéaires.

Donc : $\text{rg } A = 2 = \text{rg } (S)$.

On choisit le déterminant d'ordre 2 suivant comme déterminant principal :

$$P = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$$

Il est nécessaire de se poser la question si ce système possède des solutions (car $C \neq 0$ et $\text{rg } A = 2 < 4$).

Le système admet des solutions si et seulement si $\text{rg } B = \text{rg } A$ où B est la matrice augmentée de A . C'est-à-dire :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & 4 \\ 10 & -5 & -6 & -10 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } B \leq 4$$

Or $\text{rg } B = \text{rg } A$ ssi tous les déterminants caractéristiques construits sur $P = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$ sont nuls.

Il y a 2 déterminants caractéristiques car :

$$(\text{nombre de lignes de } A) - (\text{rang de } A) = 4 - 2 = 2$$

Ils sont d'ordre 3. D'où :

$$C_1 = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_1 = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -5 & -6 & -10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \\ -15 & -6 & -10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Le système admet des solutions et il est équivalent aux équations principales.

On considère le système (S') formé des équations principales :

$$(S') : \begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ -4x + 2y + z = 3 \end{cases} \quad \text{et on pose : } x = \beta \in \mathbb{R}$$

que l'on résoud par rapport aux inconnues principales y et z (définies par P), en fonction du paramètre x (inconnue non principale).

$$(S'') : \begin{cases} -y + 3z = 1 - 2\beta \\ 2y + z = 3 + 4\beta \\ x = \beta \end{cases}$$

Les 2 premières équations forment un système de Cramer de rang 2 (car $P = -7$). On peut déterminer y et z en utilisant les formules :

$$y = -\frac{1}{7} \begin{vmatrix} 1 - 2\beta & 3 \\ 3 + 4\beta & 1 \end{vmatrix} = \frac{8}{7} + 2\beta, \quad z = -\frac{1}{7} \begin{vmatrix} -1 & 1 - 2\beta \\ 2 & 3 + 4\beta \end{vmatrix} = \frac{5}{7}$$

$$\text{D'où l'ensemble des solutions : } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 8/7 \\ 5/7 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta \in \mathbb{R}$$

On peut aussi déterminer l'ensemble des solutions en considérant (S'') comme l'intersection de 2 plans α et β . L'ensemble des solutions est une droite d dont on cherche un point quelconque I et un vecteur directeur.

$$\vec{d} = \vec{n}_\alpha \times \vec{n}_\beta = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 2 & -1 & 3 \\ -4 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -14 \\ 0 \end{pmatrix} = (-1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On détermine un point I en posant par exemple : $x_I = 0$ et on résoud le système :

$$(S') : \begin{cases} -y + 3z = 1 \\ 2y + z = 3 \end{cases} \Rightarrow y_I = 8/7, \quad z_I = 5/7$$

- (d) Ecrire le système sous forme matricielle : $AX = C$, $A \in \mathbb{M}(4 \times 3, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

$$(S) : \begin{cases} 2x + y + z = 2 \\ x + 3y + z = 5 \\ x + y + 5z = -7 \\ 2x + 3y - 3z = 14 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations ($n = 4$) \neq nombre d'inconnues ($p = 3$).

$$(S) : AX = C \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -7 \\ 14 \end{pmatrix}$$

On détermine le rang de A : $A \in \mathbb{M}(4 \times 3, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$.

Si il existe au moins un déterminant non nul d'ordre 3 extrait de A alors son rang est 3. On calcule :

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -5 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 22 = P$$

Donc : $\text{rg } A = 3 = \text{rg } (S)$.

On choisit le déterminant P d'ordre 3 comme déterminant principal.

Il est nécessaire de se poser la question si ce système possède des solutions (car $C \neq 0$ et $\text{rg } A = 3 < 4$).

Le système admet des solutions si et seulement si $\text{rg } B = \text{rg } A$ où B est la matrice augmentée de A . C'est-à-dire :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 5 & -7 \\ 2 & 3 & -3 & 14 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } B \leq 4$$

Or $\text{rg } B = \text{rg } A$ ssi tous les déterminants caractéristiques construits sur $P = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix}$ sont nuls.

Il y a 1 déterminant caractéristique car :

$$(\text{nombre de lignes de } A) - (\text{rang de } A) = 4 - 3 = 1$$

Il est d'ordre 4. D'où :

$$C_1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 5 & -7 \\ 2 & 3 & -3 & 14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ -4 & 2 & 1 & 5 \\ 8 & -4 & 5 & -7 \\ -12 & 6 & -3 & 14 \end{vmatrix} = 0$$

Le système admet des solutions et il est équivalent aux équations principales.

On considère le système (S') formé des équations principales définies par P :

$$(S') : \begin{cases} 2x + y + z = 2 \\ x + 3y + z = 5 \\ x + y + 5z = -7 \end{cases}$$

ce qui est un système de Cramer de 3 équations à 3 inconnues de rang 3 dont la solution est unique. On la détermine en utilisant les formules :

$$x = \frac{1}{22} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \\ -7 & -4 & 5 \end{vmatrix} = 1, \quad y = \frac{1}{22} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 1 & -7 & 5 \end{vmatrix} = 2, \quad z = \frac{1}{22} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 5 & 5 \\ 1 & -7 & -7 \end{vmatrix} = -2,$$

D'où la solution : $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

Rang-Systèmes : exercice 12

- (a) Ecrire le système sous forme matricielle : $AX = C$, $A \in \mathbb{M}(3 \times 4, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

Montrer que le système possède des solutions.

$$(S) : \begin{cases} 2x - 2y + 3z + t = 2 \\ 4x - 3y + 4z + 2t = 5 \\ 10x - 8y + 11z + 5t = 12 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations ($n = 3$) \neq nombre d'inconnues ($p = 4$).

$$(S) : AX = C \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 & 1 \\ 4 & -3 & 4 & 2 \\ 10 & -8 & 11 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 12 \end{pmatrix}$$

On détermine le rang de A : $A \in \mathbb{M}(3 \times 4, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$.

On considère les 3 vecteurs ligne de la matrice A : \vec{l}_1 , \vec{l}_2 , et \vec{l}_3 .

Il est évident que : $\vec{l}_3 = \vec{l}_1 + 2\vec{l}_2$ et que \vec{l}_1 et \vec{l}_2 ne sont pas colinéaires.

Donc : $\text{rg } A = 2$.

On choisit le déterminant d'ordre 2 suivant comme déterminant principal :

$$P = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

Le système admet des solutions si et seulement si $\text{rg } B = \text{rg } A$ où B est la matrice augmentée de A . C'est-à-dire :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & -3 & 4 & 2 & 5 \\ 10 & -8 & 11 & 5 & 12 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } B \leq 3$$

Il est évident que : $\vec{l}_3 = \vec{l}_1 + 2\vec{l}_2$ et que \vec{l}_1 et \vec{l}_2 ne sont pas colinéaires.

Donc : $\text{rg } B = 2$.

Le système admet des solutions.

Le système homogène $(S') : AX = 0$ admet toujours des solutions. Il est équivalent aux équations principales définies par $P = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 4 & -3 \end{vmatrix}$

$$(S') : \begin{cases} 2x - 2y + 3z + t = 0 \\ 4x - 3y + 4z + 2t = 0 \end{cases} \quad \text{et on pose : } z = \alpha \text{ et } t = \beta \in \mathbb{R}$$

que l'on résout par rapport aux inconnues principales x et y (définies par P), en fonction des paramètres z et t (inconnues non principales).

$$(S'') : \begin{cases} 2x - 2y = -3\alpha - \beta \\ 4x - 3y = -4\alpha - 2\beta \\ z = \alpha \\ t = \beta \end{cases}$$

Les 2 premières équations forment un système de Cramer de rang 2 (car $P = 2 \neq 0$). On détermine x et y en utilisant les formules :

$$x = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -3\alpha - \beta & -2 \\ -4\alpha - 2\beta & -3 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}(\alpha - \beta), \quad y = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & -3\alpha - \beta \\ 4 & -4\alpha - 2\beta \end{vmatrix} = 2\alpha$$

D'où l'ensemble des solutions du système homogène :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \\ 2\alpha \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1/2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

\Leftrightarrow

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Il reste à déterminer une solution particulière du système (S') des équations principales.

On pose par exemple : $x = 0$, $y = 0$, (S') devient :

$$(S) : \begin{cases} 3z + t = 2 \\ 4z + 2t = 5 \end{cases} \Rightarrow z = -\frac{1}{2}, \quad t = \frac{7}{2}$$

D'où la solution particulière :

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1/2 \\ 7/2 \end{pmatrix}$$

La solution générale de (S) est égale à la somme de la solution particulière et de la solution du système homogène :

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1/2 \\ 7/2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

10mm

- (b) Ecrire le système sous forme matricielle : $AX = C$, $A \in \mathbb{M}(3 \times 4, \mathbb{R})$ et déterminer son rang.

$$(S) : \begin{cases} x - 2y + z + t = 1 \\ x - 2y + z - t = -1 \\ x - 2y + z + 5t = 5 \end{cases}$$

Dans ce cas : nombre d'équations ($n = 3$) \neq nombre d'inconnues ($p = 4$).

$$(S) : AX = C \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

On détermine le rang de A : $A \in \mathbb{M}(3 \times 4, \mathbb{R})$ et $\text{rg } A \leq 3$.

On considère les 4 vecteurs colonne de la matrice A : \vec{c}_1 , \vec{c}_2 , \vec{c}_3 , et \vec{c}_4 .

Il est évident que : $\vec{c}_2 = -2\vec{c}_1 = -2\vec{c}_3$ et que \vec{c}_3 et \vec{c}_4 ne sont pas colinéaires.

Donc : $\text{rg } A = 2$.

On choisit le déterminant d'ordre 2 suivant comme déterminant principal :

$$P = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

Le système admet des solutions si et seulement si $\text{rg } B = \text{rg } A$ où B est la matrice augmentée de A . C'est-à-dire :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } B \leq 3$$

Or $\vec{c}_2 = -2\vec{c}_1 = -2\vec{c}_3$, $\vec{c}_4 = \vec{c}_5$ et \vec{c}_3 et \vec{c}_4 ne sont pas colinéaires.

Donc : $\text{rg } B = 2$.

Le système admet des solutions.

Le système homogène $(S') : AX = 0$ admet toujours des solutions. Il est équivalent aux équations principales définies par $P = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$

$$(S') : \begin{cases} x - 2y + z + t = 0 \\ x - 2y + z - t = 0 \end{cases} \quad \text{et on pose : } x = \alpha \text{ et } y = \beta \in \mathbb{R}$$

que l'on résoud par rapport aux inconnues principales z et t (définies par P), en fonction des paramètres x et y (inconnues non principales).

$$(S'') : \begin{cases} z + t = -\alpha + 2\beta \\ z - t = -\alpha + 2\beta \\ z = \alpha \\ t = \beta \end{cases}$$

Les 2 premières équations forment un système de Cramer de rang 2 (car $P = 2 \neq 0$). On détermine x et y en utilisant les formules :

$$x = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} -\alpha + 2\beta & 1 \\ -\alpha + 2\beta & -1 \end{vmatrix} = -\alpha + 2\beta, \quad y = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & -\alpha + 2\beta \\ 1 & -\alpha + 2\beta \end{vmatrix} = 0$$

D'où l'ensemble des solutions du système homogène :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ -\alpha + 2\beta \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Il faut encore déterminer une solution particulière du système (S') des équations principales.

On a la solution particulière évidente :

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La solution générale de (S) est égale à la somme de la solution particulière et de la solution du système homogène :

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

