

# Résumé Logarithme :

dimanche, 24 février 2019 20:48

- $\ln(x) : \mathbb{R}^*_{+} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\exp(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*_{+}$
- $\ln(1) = 0$
- $\exp(0) = 1$
- $\log_x(y) = a \iff x^a = y \iff \exp_x(a) = y$
- $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
- $\exp(a + b) = \exp(a) * (\exp(b))$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\exp(a - b) = \exp(a) / (\exp(b))$
- $4 * \ln(x) = \ln(x^4)$
- $\exp(x)^4 = \exp(4x)$
- $a > b \Rightarrow \ln(a) > \ln(b)$
- $\lim_{a \rightarrow \infty} \ln(a) = \infty$
- $\lim_{a \rightarrow 0} \ln(a) = \lim_{\frac{1}{a} \rightarrow \infty} -\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\infty$
- $\log_b(x) \text{ ou } \ln_b(x) := \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$
- $\exp_a(x) = y \iff a^x = y \iff x = \log_a(y)$
- $a^{b*c} = (a^b)^c$
- $u^v = e^{v*\ln(u)} \rightarrow \text{SUPER IMPORTANT}$

On peut pas dériver un truc comme :

$x^x$ . Il faut le convertir en quelque chose de la forme  $e^{x*\ln(x)}$

Base naturel : e (nombre d'Euler, 2.71)

Méthode de résolution des équation avec logarithme :

simplifier l'équation jusqu'à avoir quelque chose de la forme :  $\log_x(y) = 0$

puis, résoudre  $y = 1$  (pourquoi 1 ?  $\rightarrow \ln(1) = 0$ )

Ne pas oublier les ensemble de définition et de vérifier les solutions

Essayer de faire un changement de variable et résoudre comme une équation du second ou du troisième degré

Méthode résolution 3 -ème degré racine évidente :

$$-2m^3 + m^2 + 5m + 2 = 0$$

trouver une valeur de m telle que l'équation soit vraie (en loccurence + 2)

divisé l'équation par  $(x - 2)$

$$-2m^3 + m^2 + 5m + 2 = 0 \text{ divisé par } (m - 2)$$

$$-2m^2(m - 2) = -2m^3 + 4m^2$$

$$-3m^2 + 5m + 2 = 0 \text{ divisé par } (m - 2)$$

$$-3m(m - 2) = -3m^2 + 6m$$

$$-m + 2 = 0 \text{ divisé par } (m - 2)$$

$$-1(m - 2)$$

$$(m - 2)(-2m^2 - 3m - 1)$$

Inéquation :  $a > b \rightarrow a^2 > b^2$  et  $a^2 < -b^2$  !!!!!

Racine attention condition de positivité  $x - 9 > 2\sqrt{y}$  alors  $x \in [9; \infty]$