

- (a) Montrer que toute matrice de  $\mathbb{M}_n$  est la somme directe d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

L'idée est d'utiliser le théorème montré à l'exercice précédent :

la somme  $F + G$  est directe si et seulement si  $F \cap G = \{0\}$ , où 0 est la matrice nulle d'ordre  $n$ .

- On pose :

$$A = \frac{1}{2}(M + M^t) \quad \text{et} \quad B = \frac{1}{2}(M - M^t), \quad \text{alors}$$

$$A \in F \quad \text{car} \quad A^t = \frac{1}{2}(M + M^t)^t = \frac{1}{2}(M^t + M) = A$$

$$B \in G \quad \text{car} \quad B^t = \frac{1}{2}(M - M^t)^t = \frac{1}{2}(M^t - M) = -B$$

On calcule la somme :

$$A + B = \frac{1}{2}(M + M^t) + \frac{1}{2}(M - M^t) = M \quad \text{pour tout } M \in \mathbb{M}_n.$$

On a bien que  $\mathbb{M}_n = F + G$

- Il faut encore montrer que  $F \cap G = \{0\}$ .

Soit  $M \in F \cap G$

$$M \in F \Leftrightarrow M = M^t \Leftrightarrow M - M^t = 0 \quad (1)$$

$$M \in G \Leftrightarrow M = -M^t \Leftrightarrow M + M^t = 0 \quad (2)$$

En additionnant (1) et (2), on obtient  $M = 0$ .

Donc la somme est directe :  $\mathbb{M}_n = F \oplus G$

**Remarque :**  $F$  et  $G$  sont dits *supplémentaires* lorsque  $F \oplus G = E$ .

- (b) Montrer que toute matrice de  $\mathbb{M}_n$  est la somme d'une matrice triangulaire supérieure et d'une matrice triangulaire inférieure.

$$\bullet \quad S \in F \Leftrightarrow S = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

et

$$T \in G \Leftrightarrow T = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Il est évident que toute matrice carrée d'ordre  $n$  est la somme de deux matrices de ce type.

- $F \cap G$  est l'ensemble des matrices diagonales d'ordre  $n$ , donc  $F \cap G \neq \{0\}$ .  
La somme n'est pas directe.

(c) Montrer que toute application de  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  est la somme directe d'une application paire et d'une application impaire.

- On pose :

$$f(x) = \frac{1}{2} (h(x) + h(-x)) \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{1}{2} (h(x) - h(-x)), \text{ alors}$$

$$f(x) \in F \quad \text{car} \quad f(-x) = \frac{1}{2} (h(-x) + h(x)) = f(x)$$

$$g(x) \in G \quad \text{car} \quad g(-x) = \frac{1}{2} (h(-x) - h(x)) = -g(x)$$

On calcule la somme :

$$f(x) + g(x) = \frac{1}{2} (h(x) + h(-x)) + \frac{1}{2} (h(x) - h(-x)) = h(x) \quad \text{pour toute}$$

application  $h(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

On a bien que  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = F + G$

- Il faut encore montrer que  $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}}\}$ .

Soit  $h(x) \in F \cap G$

$$h(x) \in F \Leftrightarrow h(x) = h(-x) \Leftrightarrow h(x) - h(-x) = 0_{\mathbb{R}} \quad (1)$$

$$h(x) \in G \Leftrightarrow h(x) = -h(-x) \Leftrightarrow h(x) + h(-x) = 0_{\mathbb{R}} \quad (2)$$

En additionnant (1) et (2), on obtient  $h(x) = 0_{\mathbb{R}}$ .

Donc la somme est directe,  $F$  et  $G$  sont supplémentaires.