

## Corrigé 1

### 1. Sans utiliser de calculatrice, convertir

- a)  $\alpha = 240^\circ$  en radians,      b)  $\beta = 1$  rad en degrés et minutes, (poser  $\pi = \frac{22}{7}$ ).
- 

- a) A partir de la relation fondamentale  $360^\circ = 2\pi$  radians, travaillez par proportionnalité.

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}, \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad}, \quad 240^\circ = \frac{4\pi}{3} \text{ rad}.$$

- b) Ce problème de conversion de radians en degrés se résout à partir de la relation fondamentale

$$2\pi \text{ radians} = 360^\circ.$$

$$2 \cdot \frac{22}{7} \text{ radians} = 360^\circ, \quad 1 \text{ radian} = \frac{7}{44} \cdot 360^\circ = \frac{7}{11} \cdot 90^\circ = \frac{630^\circ}{11}.$$

Il s'agit d'exprimer cette fraction de degrés en degrés et minutes.

Pour cela, on effectue une division euclidienne (division entière avec reste).

$$1 \text{ radian} = \frac{630^\circ}{11} = 57^\circ + \frac{3^\circ}{11},$$

avec

$$\frac{3^\circ}{11} = \frac{3 \cdot 60'}{11} = \frac{180'}{11} = 16' + \frac{4'}{11}.$$

D'où

$$1 \text{ radian} \approx 57^\circ 16'.$$

2. Un polygone régulier de  $n$  côtés et de sommets  $A_1, A_2, \dots, A_n$  est inscrit dans un cercle.

Exprimer en radians la mesure des arcs  $(A_1 A_k)$ ,  $k = 2, \dots, n$ .


---

Le cercle est un arc dont la mesure est  $2\pi$  rad.

Le polygone à  $n$  côtés étant régulier, les  $n$  arcs  $(A_1 A_2), (A_2 A_3), \dots, (A_n A_1)$  sont isométriques et ont pour mesure  $\alpha = \frac{2\pi}{n}$  rad.

L'arc  $(A_1 A_k)$  est composé de  $(k-1)$  arcs élémentaires  $(A_1 A_2), \dots, (A_{k-1} A_k)$  ;

sa mesure est donc :  $(k-1)\alpha = (k-1) \cdot \frac{2\pi}{n}$  rad.



3. a) Un arc de cercle a pour longueur  $L = 30$  cm, son angle au centre mesure  $\alpha = 4$  rad. Calculer son rayon  $r$ .
- b) Un secteur circulaire a pour angle au centre  $\beta = 18^\circ$  et pour rayon  $r = 12$  cm. Calculer la longueur  $L$  de l'arc et l'aire  $A$  du secteur.

a)  $L = \alpha \cdot r$  où  $\alpha$  est la mesure de l'arc exprimée en radian.

$$r = \frac{L}{\alpha} \Rightarrow r = \frac{30}{4} = 7,5 \text{ cm.}$$


b) La mesure de l'arc est ici exprimée en degrés, il faut la convertir en radians :

$$\beta = 18^\circ = \frac{180^\circ}{10} = \frac{\pi}{10} \text{ rad.}$$


$$\bullet L = \beta \cdot r \Rightarrow L = \frac{\pi}{10} \cdot 12 = \frac{6\pi}{5} \text{ cm.}$$

$$\bullet A = \frac{1}{2} \beta \cdot r^2 \Rightarrow A = \frac{1}{2} \frac{\pi}{10} \cdot 12^2 = \frac{36\pi}{5} \text{ cm}^2.$$


4. La roue ci-contre, de rayon  $r$ , a son centre situé à la distance  $d$  du mur. On la fait rouler jusqu'à ce qu'elle touche celui-ci. De quel angle  $\alpha$  la roue a-t-elle tourné ?




Quel est le lien entre la distance  $x$  parcourue et l'angle de rotation  $\alpha$  ?



Cette distance  $x$  est égale à la longueur de l'arc correspondant à l'angle de rotation  $\alpha$ .



La distance horizontale parcourue jusqu'à ce que la roue touche le mur vaut  $d - r$ .



Cette distance correspond à la longueur de l'arc dont l'angle au centre vaut  $\alpha$ .

$$\alpha \cdot r = d - r \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = \frac{d - r}{r}.$$

5. Un volant tourne de 48 tours en une minute. Exprimer sa vitesse angulaire  $\omega$  en radians par seconde.

---

Quand on affirme que le volant tourne de 48 tours en une minute, on nous donne sa vitesse angulaire ; 48 tours est bien la mesure d'un angle.

Il s'agit donc d'un simple problème de conversion d'unités.

$$\begin{aligned} 48 \text{ tours} &\longleftrightarrow 1 \text{ minute} \\ 48 \times 2\pi \text{ rad} &\longleftrightarrow 60 \text{ secondes} \\ \frac{48 \times 2\pi}{60} \text{ rad} &\longleftrightarrow 1 \text{ seconde} \\ \frac{8\pi}{5} \text{ rad} &\longleftrightarrow 1 \text{ seconde} \end{aligned}$$

La vitesse angulaire  $\omega$  du volant est donc de  $\frac{8\pi}{5}$  rad/sec.

6. Estimer la vitesse sur orbite de la lune dans sa course autour de la terre connaissant la distance qui les sépare : environ 360'000 km (distance du centre de la terre au centre de la lune) et en fixant une période lunaire approximativement à 30 jours.

---

La lune effectue une révolution autour de la terre en 30 jours ; calculons la distance parcourue durant cette période.

$$L = 2\pi \cdot R = 2\pi \cdot 360'000 \text{ km}$$

Le problème est résolu : la vitesse sur orbite de la lune est de  $2\pi \cdot 360'000$  km par 30 jours.

Il suffit de l'exprimer dans une unité plus conventionnelle.

$$2\pi \cdot 360'000 \text{ km} \longleftrightarrow 30 \text{ jours}$$

$$2\pi \cdot 360'000 \text{ km} \longleftrightarrow 30 \cdot 24 \text{ heures}$$

$$\frac{2\pi \cdot 360'000}{30 \cdot 24} \text{ km} \longleftrightarrow 1 \text{ heure}$$

$$\sim 3'140 \text{ km} \longleftrightarrow 1 \text{ heure}$$

La vitesse sur orbite de la lune est approximativement de 3'140 km/h.

7. Il est midi. Sur une montre analogique, l'aiguille des heures et celle des minutes sont superposées.

- a) A quels instants (heures, minutes, secondes) le seront-elles de nouveau ?

Indication : déterminer  $\alpha_1(t)$ , l'angle décrit par l'aiguille des heures en  $t$  secondes et  $\alpha_2(t)$ , l'angle décrit par l'aiguille des minutes.

- b) Même question avec les trois aiguilles, celle des heures, des minutes et des secondes.

- 
- a) • Soit  $\alpha_1(t)$  l'angle parcouru en  $t$  secondes par l'aiguille des heures.

- Pour une valeur de  $t$  positive, la mesure de l'angle  $\alpha_1$  est négative car le mouvement des aiguilles d'une montre s'effectue dans le sens trigonométrique négatif.
- D'autre part, l'aiguille des heures effectue un tour complet en 12 heures.

$$12 \text{ heures} \longleftrightarrow -2\pi \text{ radians}$$

$$12 \cdot 60^2 \text{ secondes} \longleftrightarrow -2\pi \text{ radians}$$

$$1 \text{ seconde} \longleftrightarrow -\frac{2\pi}{12 \cdot 60^2} \text{ radians}$$


$$t \text{ secondes} \longleftrightarrow -\frac{2\pi}{12 \cdot 60^2} t \text{ radians.}$$

D'où l'expression cherchée :  $\alpha_1(t) = -\frac{2\pi}{12 \cdot 60^2} t.$

- De façon analogue, on en déduit que l'angle décrit par l'aiguille des minutes en  $t$  secondes est donné par

$$\alpha_2(t) = -\frac{2\pi}{60^2} t.$$

- Les deux aiguilles se superposent au temps  $t$  si les deux angles diffèrent d'un nombre entier de tours (si les deux angles sont des déterminations différentes d'un même angle orienté).



$$\alpha_1(t) - \alpha_2(t) = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

$$-\frac{2\pi}{12 \cdot 60^2} t + \frac{2\pi}{60^2} t = 2k\pi \Leftrightarrow t \left( -\frac{1}{12 \cdot 60^2} + \frac{1}{60^2} \right) = k$$

$$t \left( \frac{11}{12 \cdot 60^2} \right) = k \Leftrightarrow t = k \left( \frac{12 \cdot 60^2}{11} \right) \text{ secondes}$$

$$t = k \left( \frac{11 \cdot 60^2}{11} + \frac{60^2}{11} \right) = k \left( \frac{11 \cdot 60^2}{11} + \frac{55 \cdot 60}{11} + \frac{5 \cdot 60}{11} \right) \text{ secondes}$$

$$t \approx k(1\text{h } 5' 27''), \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

b) Soit  $\alpha_3(t)$  l'angle parcouru en  $t$  secondes par l'aiguille des secondes :

$$\alpha_3(t) = -\frac{2\pi}{60} t.$$

Les trois aiguilles se superposent au temps  $t$  si les trois angles diffèrent d'un nombre entier de tours.

$$\begin{cases} \alpha_1(t) - \alpha_2(t) = 2k\pi \\ \alpha_2(t) - \alpha_3(t) = 2\ell\pi \end{cases} \quad k, \ell \in \mathbb{N}^*.$$

$$\begin{cases} -\frac{2\pi}{12 \cdot 60^2} t + \frac{2\pi}{60^2} t = 2k\pi \\ -\frac{2\pi}{60^2} t + \frac{2\pi}{60} t = 2\ell\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -t + 12t = k \cdot 12 \cdot 60^2 \\ -t + 60t = \ell \cdot 60^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{12}{11} \cdot 60^2 \cdot k \\ t = \frac{1}{59} \cdot 60^2 \cdot \ell \end{cases} \Rightarrow \frac{12k}{11} = \frac{\ell}{59} \Leftrightarrow 12 \cdot 59 k = 11 \ell.$$

La première rencontre des trois aiguilles a lieu lorsque

$$(k, \ell) = (11, 12 \cdot 59)$$

car les deux nombres 11 et  $12 \cdot 59$  sont premiers entre eux.

Or  $k = 11 \Leftrightarrow t = 12 \cdot 60^2$  secondes = 12 heures.

Les trois aiguilles sont de nouveau superposées à minuit : cela n'est pas une surprise !

Mais ce que nous venons de démontrer c'est qu'il n'y a pas de superposition des trois aiguilles de la montre entre midi et minuit.

8. Sur une piste circulaire, deux personnes prennent simultanément le départ en un même point  $A$ .

La première personne court à vitesse constante et effectue un tour complet en 60 secondes et la deuxième part en sens inverse, à vitesse constante et fait un tour en 250 secondes.


- Déterminer l'instant  $t_n$  où les deux coureurs se rencontrent pour la  $n$ -ième fois.
- Déterminer l'instant  $t_A$  où les deux personnes se rencontrent pour la première fois au point de départ  $A$ .

Soit  $\alpha_1(t)$  l'angle parcouru en  $t$  secondes ( $t > 0$ ) par la première personne :

$$\alpha_1(t) = \frac{2\pi}{60} t = \frac{\pi}{30} t.$$

Soit  $\alpha_2(t)$  l'angle parcouru en  $t$  secondes par la deuxième personne :

$$\alpha_2(t) = -\frac{2\pi}{250} t = -\frac{\pi}{125} t.$$



- Les deux coureurs se rencontrent au temps  $t$  si les deux angles diffèrent d'un nombre entier de tours.  
Plus précisément, ils se rencontrent pour la  $n$ -ième fois si les deux angles diffèrent de  $n$  tours.

$$\alpha_1(t_n) - \alpha_2(t_n) = 2n\pi \Leftrightarrow \frac{\pi}{30} t_n - \left(-\frac{\pi}{125} t_n\right) = 2n\pi, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

$$t_n = n \cdot \frac{1500}{31} \text{ secondes}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

## b) • Une méthode

Les deux coureurs se rencontrent au point de départ  $A$ , au temps  $t$  ( $t > 0$ ), si les deux angles correspondent à des nombres entiers de tours.

$$\alpha_1(t) = 2k\pi \quad \text{et} \quad \alpha_2(t) = 2\ell\pi, \quad k, \ell \in \mathbb{Z} \quad (k > 0 \quad \text{et} \quad \ell < 0).$$

$$\begin{cases} \frac{\pi}{30} t = 2k\pi \\ -\frac{\pi}{125} t = 2\ell\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 60k \\ t = -250\ell \end{cases} \Rightarrow 6k = -25\ell.$$

La première rencontre au point de départ  $A$  a lieu pour  $k = 25$  et  $\ell = -6$ , ce qui correspond à :

$$t_A = 60k = -250\ell = 60 \cdot 25 \text{ secondes} = 25 \text{ minutes}.$$

## • Une autre méthode qui utilise le résultat de la partie a).

Les deux coureurs se rencontrent au point de départ  $A$ , s'ils se rencontrent et que l'un d'eux est au point  $A$ .

- Les deux coureurs se rencontrent pour la  $n$ -ième fois si et seulement si

$$t = n \cdot \frac{1500}{31} \text{ secondes}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

- Le coureur n° 1 est au point  $A$  si et seulement si il a effectué un nombre entier de tours. En d'autres termes, si et seulement si

$$\alpha_1(t) = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

$$\alpha_1(t) = 2k\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi}{60} t = 2k\pi \Leftrightarrow t = 60k, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

- Détermination de  $k$  et  $n$

$$\begin{cases} t = 60k \\ t = n \cdot \frac{1500}{31} \end{cases} \Rightarrow 60k = n \cdot \frac{1500}{31} \Leftrightarrow 31k = 25n.$$

Or 25 et 31 sont premiers entre eux, donc toutes les solutions sont de la forme

$$(k, n) = \lambda(25, 31), \quad \lambda \in \mathbb{N}^*.$$

- Conclusion

La première rencontre au point de départ  $A$  a lieu pour  $k = 25$  et  $n = 31$ , ce qui correspond à :

$$t_A = 60k = 60 \cdot 25 \text{ secondes} = 25 \text{ minutes}.$$


---