

Corrigé 16

1. Pour chacune des courbes définies ci-dessous, rechercher les éléments de symétrie déductibles de la parité des fonctions coordonnées.

$$\text{a) } \begin{cases} x(t) &= 3t - t^3 \\ y(t) &= \sqrt[3]{t} \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x(t) &= e^{-t} \cos t \\ y(t) &= e^{-t} \sin t \end{cases}$$


$$\text{b) } \begin{cases} x(t) &= \sin t \\ y(t) &= \frac{\cos^2 t}{2 - \cos t} \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x(t) &= \frac{2t^2(t^2-1)}{(t^2+1)^2} \\ y(t) &= \frac{4t^3}{(t^2+1)^2} \end{cases}$$

- a) On teste la parité des fonctions coordonnées $x(t)$ et $y(t)$:

- $x(t) = 3t - t^3$, $x(-t) = -3t + t^3 = -x(t)$, $x(t)$ est donc impaire,
- $y(t) = \sqrt[3]{t}$, $y(-t) = \sqrt[3]{-t} = -\sqrt[3]{t} = -y(t)$, $y(t)$ est donc impaire.


On en déduit que la courbe Γ est symétrique par rapport à l'origine O .



- b) On teste la parité des fonctions coordonnées $x(t)$ et $y(t)$:

- $x(t) = \sin t$, $x(-t) = -\sin t = -x(t)$, $x(t)$ est donc impaire,
- $y(t) = \frac{\cos^2 t}{2 - \cos t}$, $y(-t) = \frac{\cos^2 t}{2 - \cos t} = y(t)$, $y(t)$ est donc paire.

On en déduit que la courbe Γ est symétrique par rapport à l'axe Oy .



c) On teste la parité des fonctions coordonnées $x(t)$ et $y(t)$:

$$\bullet \quad x(t) = e^{-t} \cos t, \quad x(-t) = e^{+t} \cos(-t) = e^{+t} \cos t,$$

la fonction $x(t)$ n'est ni paire ni impaire, on peut donc déjà en déduire que la courbe Γ ne possède pas de symétrie déductible de la parité des fonctions coordonnées,

$$\bullet \quad y(t) = e^{-t} \sin t, \quad y(-t) = e^{+t} \sin(-t) = -e^{+t} \sin t,$$


la fonction $y(t)$ n'est ni paire ni impaire.

d) On teste la parité des fonctions coordonnées $x(t)$ et $y(t)$:

$$\bullet \quad x(t) = \frac{2t^2(t^2-1)}{(t^2+1)^2}, \quad x(-t) = \frac{2t^2(t^2-1)}{(t^2+1)^2} = x(t), \quad x(t) \text{ est donc paire},$$

$$\bullet \quad y(t) = \frac{4t^3}{(t^2+1)^2}, \quad y(-t) = -\frac{4t^3}{(t^2+1)^2} = -y(t), \quad y(t) \text{ est donc impaire}.$$

On en déduit que la courbe Γ est symétrique par rapport à l'axe Ox .



2. a) Pour la courbe paramétrée suivante, déterminer le point stationnaire et la tangente en ce point.

$$\Gamma : \begin{cases} x(t) = \frac{t^2}{1-2t} \\ y(t) = \frac{t^3}{1-2t} \end{cases}$$

$M(x, y)$ est un point stationnaire de Γ en $t = t_0$ si et seulement si $\dot{x}(t_0) = 0$ et $\dot{y}(t_0) = 0$.

$$\dot{x}(t) = \frac{2t(1-2t) + 2t^2}{(1-2t)^2} = \frac{-2t^2 + 2t}{(1-2t)^2} = \frac{-2t(t-1)}{(1-2t)^2}.$$

$$\dot{x}(t) = 0 \Leftrightarrow t = 0 \quad \text{ou} \quad t = 1.$$

$$\dot{y}(t) = \frac{3t^2(1-2t) + 2t^3}{(1-2t)^2} = \frac{-4t^3 + 3t^2}{(1-2t)^2} = \frac{-t^2(4t-3)}{(1-2t)^2}.$$

$$\dot{y}(t) = 0 \Leftrightarrow t = 0 \quad \text{ou} \quad t = \frac{3}{4}.$$

Γ admet en $t_0 = 0$ un point stationnaire : c'est l'origine.

La pente de la tangente en ce point est donnée par $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}$.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t^2(4t-3)}{-2t(t-1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(4t-3)}{2(t-1)} = 0.$$

Γ admet donc à l'origine un point stationnaire à tangente horizontale ($y = 0$).

Remarque :

En $t = 0$, $\dot{x}(t)$ change de signe et $\dot{y}(t)$ garde un signe constant.

Donc le point stationnaire est un point de rebroussement et la tangente est en fait une demi-tangente horizontale.

- b) Pour la courbe paramétrée suivante, déterminer les asymptotes, les tangentes horizontales et verticales :

$$\Gamma : \begin{cases} x(t) = t^2 + \frac{4}{t-1} \\ y(t) = 2t^2 - \frac{16}{t-1} \end{cases}$$

- Asymptotes

Limites aux points frontières de $D_{\text{def}} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

* Limites aux voisinages de $-\infty$ et de $+\infty$.

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = +\infty, \quad \lim_{t \rightarrow \pm\infty} y(t) = +\infty.$$

Recherche d'une éventuelle asymptote oblique.

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{2t^3 - 2t^2 - 16}{t^3 - t^2 + 4} = 2,$$

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} [y(t) - 2x(t)] = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} -\frac{24}{t-1} = 0.$$

Γ admet, lorsque $t \rightarrow \pm\infty$, une asymptote oblique d'équation $y = 2x$.

* Limites au voisinage de $t = 1$.

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} x(t) = -\infty, \quad \lim_{t \rightarrow 1^-} y(t) = +\infty$$

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} x(t) = +\infty, \quad \lim_{t \rightarrow 1^+} y(t) = -\infty$$

Recherche d'une éventuelle asymptote oblique.

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t^3 - 2t^2 - 16}{t^3 - t^2 + 4} = -4,$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} [y(t) + 4x(t)] = \lim_{t \rightarrow 1} 6t^2 = 6.$$

Γ admet, lorsque $t \rightarrow 1$, une asymptote oblique : $y = -4x + 6$.

- Tangentes horizontales et verticales

$$\dot{x}(t) = 2t - \frac{4}{(t-1)^2} = \frac{2(t^3 - 2t^2 + t - 2)}{(t-1)^2} = \frac{2(t-2)(t^2+1)}{(t-1)^2},$$

$$\dot{y}(t) = 4t + \frac{16}{(t-1)^2} = \frac{4(t^3 - 2t^2 + t + 4)}{(t-1)^2} = \frac{4(t+1)(t^2 - 3t + 4)}{(t-1)^2}.$$

$$\dot{x}(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2, \quad \dot{y}(t) = 0 \Leftrightarrow t = -1.$$

- * Lorsque $t = -1$, $\dot{y}(t) = 0$ et $\dot{x}(t) \neq 0$, Γ admet en $(-1; 10)$ une tangente horizontale d'équation $y = 10$.
- * Lorsque $t = 2$, $\dot{x}(t) = 0$ et $\dot{y}(t) \neq 0$, Γ admet en $(8; -8)$ une tangente verticale d'équation $x = 8$.

3. Déterminer les paramètres réels a et b pour que la droite $d : 9x + 3y + 4 = 0$ soit une asymptote oblique de la courbe Γ :

$$\Gamma : \begin{cases} x(t) = \frac{t^2}{(t-a)(t-b)} \\ y(t) = \frac{t^2}{t-b} \end{cases}$$

Pour que la courbe Γ admette une asymptote oblique, il est nécessaire que $x(t)$ et $y(t)$ tendent simultanément vers l'infini (condition nécessaire mais non suffisante).

Limite aux points frontières de $D_{\text{def}} = \mathbb{R} \setminus \{a, b\}$:

- lorsque $t \rightarrow \pm\infty$, $x(t) \rightarrow 1$ et $y(t) \rightarrow \pm\infty$, la courbe Γ admet une asymptote verticale d'équation $x = 1$,
- lorsque $t \rightarrow a$, ($a \neq b$), $x(t) \rightarrow \pm\infty$ et $y(t) \rightarrow \frac{a^2}{a-b}$, la courbe Γ admet une asymptote horizontale d'équation $y = \frac{a^2}{a-b}$,
- lorsque $t \rightarrow b$, $x(t) \rightarrow \pm\infty$ et $y(t) \rightarrow \pm\infty$, la courbe Γ admet peut-être une asymptote oblique.

La condition n'est remplie que lorsque t tend vers b .

La courbe Γ admet, lorsque t tend vers b , la droite $d : y = -3x - \frac{4}{3}$ comme asymptote oblique si et seulement si

$$\lim_{t \rightarrow b} \frac{y(t)}{x(t)} = -3 \quad \text{et} \quad \lim_{t \rightarrow b} [y(t) + 3x(t)] = -\frac{4}{3}.$$

$$\lim_{t \rightarrow b} \frac{y(t)}{x(t)} = -3 \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow b} (t - a) = -3 \Leftrightarrow b - a = -3 \Leftrightarrow a = b + 3.$$

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow b} [y(t) + 3x(t)] &= \lim_{t \rightarrow b} \left[\frac{t^2}{t-b} + \frac{3t^2}{(t-b-3)(t-b)} \right] = \lim_{t \rightarrow b} \frac{t^2(t-b-3) + 3t^2}{(t-b-3)(t-b)} \\ &= \lim_{t \rightarrow b} \frac{t^2}{t-b-3} = -\frac{b^2}{3}. \quad \text{Donc} \quad \lim_{t \rightarrow b} [y(t) + 3x(t)] = -\frac{4}{3} \Leftrightarrow b = \pm 2.\end{aligned}$$

Ce problème admet deux solutions : $(a, b) = (1, -2)$ ou $(a, b) = (5, 2)$.

4. On considère dans le plan, la courbe Γ définie par

$$\begin{cases} x(t) = \frac{2t^3}{t-1} \\ y(t) = \frac{t^4}{t^2-1} \end{cases}$$

- Etudier les branches infinies de la courbe Γ .
- Déterminer le point stationnaire de Γ et sa tangente.
Faire l'esquisse locale de la courbe Γ au voisinage de ce point.
En quoi ce point est-il remarquable ?

a) Limites aux points frontières du domaine de définition $D_{\text{def}} = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

$$\bullet \quad t \rightarrow \pm\infty : \quad \lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = +\infty, \quad \lim_{t \rightarrow \pm\infty} y(t) = +\infty.$$

Recherche d'une éventuelle asymptote oblique.

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t^4}{t^2-1} \cdot \frac{t-1}{2t^3} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t}{2(t+1)} = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} [y(t) - \tfrac{1}{2} x(t)] = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t^4 - t^3(t+1)}{t^2-1} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{-t^3}{t^2-1} = \mp\infty.$$

La courbe Γ admet, lorsque $t \rightarrow \pm\infty$ deux branches paraboliques de direction de pente $m = \frac{1}{2}$.

$$\bullet \quad t \rightarrow -1 : \quad \lim_{t \rightarrow -1} x(t) = 1, \quad \lim_{t \rightarrow -1^\pm} y(t) = \mp\infty.$$

La courbe Γ admet, lorsque $t \rightarrow -1$ une asymptote verticale : $x = 1$.

$$\bullet \quad t \rightarrow 1 : \quad \lim_{t \rightarrow 1} x(t) = \pm\infty, \quad \lim_{t \rightarrow 1} y(t) = \pm\infty.$$

Recherche d'une éventuelle asymptote oblique.

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t}{2(t+1)} = \frac{1}{4},$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} [y(t) - \tfrac{1}{4} x(t)] = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t^4 - t^3(t+1)}{2(t^2-1)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3}{2(t+1)} = \frac{1}{4}.$$

La courbe Γ admet, lorsque $t \rightarrow 1$ une asymptote oblique : $y = \frac{1}{4}(x+1)$.

b) Recherche du point stationnaire de Γ .

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \frac{6t^2(t-1) - 2t^3}{(t-1)^2} = \frac{4t^3 - 6t^2}{(t-1)^2} = \frac{2t^2(2t-3)}{(t-1)^2} \\ \dot{y}(t) &= \frac{4t^3(t^2-1) - t^4(2t)}{(t^2-1)^2} = \frac{2t^5 - 4t^3}{(t^2-1)^2} = \frac{2t^3(t^2-2)}{(t^2-1)^2}.\end{aligned}$$


$\dot{x}(t)$ et $\dot{y}(t)$ sont simultanément nuls si et seulement si $t = 0$. L'unique point stationnaire de Γ est l'origine O .

La pente de la tangente en ce point est donnée par $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}$.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t^3(t^2-2)}{(t^2-1)^2} \cdot \frac{(t-1)^2}{2t^2(2t-3)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(t^2-2)}{(t+1)^2(2t-3)} = 0.$$

La courbe Γ admet à l'origine une tangente horizontale.

Variation locale et esquisse de Γ au voisinage de O .



Le point stationnaire de Γ est un maximum à tangente horizontale.

5. On considère dans le plan la courbe paramétrée :

$$\Gamma : \begin{cases} x(t) = 2t + t^2 \\ y(t) = 2t^2 + at - \frac{1}{t^2} \end{cases} \quad a \in \mathbb{R}.$$

a) Pour quelle(s) valeur(s) de $a \in \mathbb{R}$, la courbe paramétrée Γ possède-t-elle un point stationnaire ?

Déterminer alors l'équation cartésienne de la tangente en ce point.

b) On pose $a = 4$. Etudier les branches infinies de Γ .

a) La courbe paramétrée Γ définie par $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ possède un point stationnaire en $t = t_0$ si et seulement si $\dot{\vec{r}}(t_0) = \vec{0}$.

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 2t \\ 4t + a + 2\frac{1}{t^3} \end{pmatrix}.$$

$\dot{x}(t_0) = 0 \Leftrightarrow t_0 = -1$, donc Γ admet un point stationnaire en t_0 si et seulement si $t_0 = -1$ et $\dot{y}(-1) = 0$:

$$\dot{y}(-1) = 0 \Leftrightarrow -4 + a - 2 = 0 \Leftrightarrow a = 6.$$

Γ admet un point stationnaire si et seulement si $a = 6$.

Ce point est atteint en $t = -1$ et $\vec{r}(-1) = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$.

L'équation de la tangente d à Γ en ce point s'écrit :

$$d : y - y(t_0) = m(x - x(t_0))$$

où la pente de la tangente est donnée par $m = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}$.

$$m = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{4t + 6 + 2\frac{1}{t^3}}{2 + 2t} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{4t^4 + 6t^3 + 2}{2t^3(1+t)} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{(1+t)(4t^3 + 2t^2 - 2t + 2)}{2t^3(1+t)}$$

$$m = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{(4t^3 + 2t^2 - 2t + 2)}{2t^3} = -1$$

D'où l'équation cartésienne de d : $x + y + 6 = 0$.

b) On pose $a = 4$. $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t + t^2 \\ 2t^2 + 4t - \frac{1}{t^2} \end{pmatrix}$, $D_{\text{def}} = \mathbb{R}^*$.

- Lorsque t tend vers 0.

$$\lim_{t \rightarrow 0} x(t) = \lim_{t \rightarrow 0} t(2+t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow 0} y(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(2t^2 + 4t - \frac{1}{t^2} \right) = -\infty.$$

La courbe Γ admet, lorsque t tend vers 0, une asymptote verticale d'équation $x = 0$.

- Lorsque t tend vers $\pm\infty$.

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} t(2+t) = +\infty, \quad \lim_{t \rightarrow \pm\infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{2t^4 + 4t^3 - 1}{t^2} = +\infty.$$

Recherche d'une éventuelle asymptote oblique.

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{2t^4 + 4t^3 - 1}{t^3(2+t)} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{2t^4}{t^4} = 2.$$

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} [y(t) - 2x(t)] = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{2t^4 + 4t^3 - 1 - 2t^3(2+t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} -\frac{1}{t^2} = 0.$$

La courbe Γ admet, lorsque t tend vers $\pm\infty$, une asymptote oblique d'équation $y = 2x$.