


Corrigé 13

1. A l'aide d'une feuille de carton carrée de côté a , on construit une boîte rectangulaire ouverte en découpant des carrés sur les angles et en pliant les rebords du domaine ainsi obtenu.

Comment faut-il couper la feuille pour que le volume de la boîte soit maximum ?

Figure d'étude.



Expression du volume V de la boîte en fonction de la variable h :

$$V(h) = h(a - 2h)^2,$$

avec $h > 0$ et tel que $a - 2h > 0$, d'où : $h \in]0, \frac{a}{2}[$.

Etude du signe de la dérivée de V par rapport à h sur l'intervalle $]0, \frac{a}{2}[$:

$$V'(h) = (a - 2h)^2 + h[2(a - 2h)(-2)] = (a - 2h)[(a - 2h) - 4h] = (a - 2h)(a - 6h).$$

On peut ordonner les deux zéros de $V'(h)$ car a est positif : $\frac{a}{6} < \frac{a}{2}$,


h	0	$\frac{a}{6}$	$\frac{a}{2}$
$V'(h)$	$+$	0	0

La fonction $V(h)$ est croissante à gauche de $\frac{a}{6}$ et décroissante à droite. Le volume V de la boîte est maximum lorsque $h = \frac{a}{6}$.


2. On considère le trapèze isocèle décrit ci-contre et défini par les grandeurs $a > 0$ et $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}[$.

La valeur de a est fixe, mais α est variable.

Pour quelle valeur de α l'aire du trapèze est-elle maximale ?



- Expression de l'aire A du trapèze en fonction de la variable α



L'aire A du trapèze vaut

$$A = a \cdot b + b \cdot c, \quad \text{avec } b = a \cdot \cos(\alpha) \quad \text{et} \quad c = a \cdot \sin(\alpha),$$

$$A(\alpha) = a^2 \cdot \cos(\alpha) + a^2 \cdot \cos(\alpha) \cdot \sin(\alpha) = a^2 \left[\cos(\alpha) + \frac{1}{2} \sin(2\alpha) \right]$$

- Extremum de la fonction $A(\alpha)$

On recherche les changements de signe de la dérivée de A par rapport à α sur $[0, \frac{\pi}{2}[$:

$$A'(\alpha) = a^2 \left[\cos(\alpha) + \frac{1}{2} \sin(2\alpha) \right]' = a^2 [-\sin(\alpha) + \cos(2\alpha)].$$

La fonction $A'(\alpha)$ est continue. Si elle change de signe sur l'intervalle $[0, \frac{\pi}{2}[$, c'est en passant par 0 :

$$A'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \sin(\alpha) = \cos(2\alpha) \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos(2\alpha)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} - \alpha = \pm 2\alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{6}.$$

La fonction dérivée $A'(\alpha)$ s'annule en $\alpha = \frac{\pi}{6}$ en passant des positifs ($A'(0) = a^2$) aux négatifs ($A'(\frac{\pi}{2}) = -a^2$).

La fonction $A(\alpha)$ est donc croissante à gauche de $\alpha = \frac{\pi}{6}$ et décroissante à droite.

L'aire A du trapèze est maximale lorsque $\alpha = \frac{\pi}{6}$.

3. Déterminer les extrema des fonctions suivantes.

a) $a(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 4$,

d) $d(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x}$,

b) $b(x) = x + \sqrt{1-x}$,

e) $e(x) = \sqrt[3]{x^3 - 6x^2 + 9x}$,

c) $c(x) = \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$,

f) $f(x) = \sqrt{\left| \frac{x+2}{x-2} \right|}$.

a) $a(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 4$, $D_a = \mathbb{R}$, a est continue sur \mathbb{R} .

$$a'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1), \quad D_{a'} = \mathbb{R}.$$

Les seuls points remarquables du graphe de a sont les points à tangente horizontale.

$$a'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2 \text{ ou } x = 1. \quad \text{Etude du signe de } a'(x):$$

x	-2		1		
$a'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Le graphe de a admet deux extrema à tangente horizontale :

un maximum en $(-2; 16)$ et un minimum en $(1; -11)$.

b) $b(x) = x + \sqrt{1-x}$, $D_b =]-\infty, 1]$, b est continue sur D_b .

$$b'(x) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{1-x}} = \frac{2\sqrt{1-x} - 1}{2\sqrt{1-x}} = \frac{3-4x}{2\sqrt{1-x}(2\sqrt{1-x}+1)}.$$

$$D_{b'} =]-\infty, 1[.$$

- Borne de D_b .

En $x = 1$ la fonction b est définie, mais n'est pas dérivable.

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow 1^-} b'(x) = -\infty.$$

Donc le graphe de b admet en $x = 1$ un minimum à demi-tangente verticale.

- Point du graphe de b à tangente horizontale.

$$b'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{4} \quad \text{et} \quad \text{sgn } b'(x) = \text{sgn}(3-4x) \quad \forall x \in D_{b'}.$$

Donc le graphe de b admet en $x = \frac{3}{4}$ un maximum à tangente horizontale.

c) $c(x) = \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$, $D_c = \mathbb{R} - \{-1\}$, c est continue sur D_c .

$$c(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x+1} & \text{si } x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\\ \frac{1-x}{x+1} & \text{si } x \in]-1, 1[\end{cases}$$

$$c'(x) = \begin{cases} \frac{2}{(x+1)^2} & \text{si } x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\\ -\frac{2}{(x+1)^2} & \text{si } x \in]-1, 1[\end{cases} \quad D_{c'} = \mathbb{R} - \{-1, 1\}.$$

On en déduit le signe de $c'(x)$:

x		-1		1	
$c'(x)$	$+$	\parallel	$-$	\parallel	$+$
			$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	

$x = -1$ n'est pas l'abscisse d'un extremum de c car $-1 \notin D_c$.

Le graphe de c admet en $x = 1$ un minimum qui est un point anguleux dont les pentes des deux demi-tangentes à gauche et à droite valent $-\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$.

d) $d(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x}$, $D_d = \mathbb{R}$, d est continue sur \mathbb{R} .

$$d'(x) = \frac{2}{3} x^{-1/3} - \frac{1}{3} x^{-2/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} = \frac{2\sqrt[3]{x} - 1}{3\sqrt[3]{x^2}}, \quad D_{d'} = \mathbb{R}^*.$$

- En $x = 0$ la fonction d est définie mais n'est pas dérivable.

$\lim_{x \rightarrow 0} d'(x) = -\infty$; le graphe de d admet en $x = 0$ une tangente verticale, mais pas d'extremum.

- Point du graphe à tangente horizontale.

$$d'(x) = 0 \Leftrightarrow 2\sqrt[3]{x} - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{8},$$

et $d'(x)$ change de signe en passant des négatifs aux positifs.

Le graphe de d admet en $x = \frac{1}{8}$ un minimum à tangente horizontale.

e) $e(x) = \sqrt[3]{x^3 - 6x^2 + 9x}$, $D_e = \mathbb{R}$, e est continue sur \mathbb{R} .

$$e'(x) = \frac{3x^2 - 12x + 9}{3\sqrt[3]{(x^3 - 6x^2 + 9x)^2}} = \frac{(x-3)(x-1)}{\sqrt[3]{x^2(x-3)^4}} = \frac{x-1}{\sqrt[3]{x^2(x-3)}},$$

$$D_{e'} = \mathbb{R}^* - \{3\}.$$

- En $x = 0$ la fonction e est définie mais n'est pas dérivable.

$\lim_{x \rightarrow 0} e'(x) = +\infty$; le graphe de e admet en $x = 0$ une tangente verticale, mais pas d'extremum.

- En $x = 3$ la fonction e est définie mais n'est pas dérivable.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} e'(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} e'(x) = +\infty.$$

Le graphe de e admet en $x = 3$ un minimum qui est un point de rebroussement (deux demi-tangentes verticales).

- Point du graphe à tangente horizontale.

$$e'(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 1,$$

et $e'(x)$ change de signe en passant des positifs aux négatifs.

Le graphe de e admet en $x = 1$ un maximum à tangente horizontale.

$$\text{f) } f(x) = \sqrt{\left| \frac{x+2}{x-2} \right|}, \quad D_f = \mathbb{R} - \{2\}, \quad f \text{ est continue sur } D_f.$$

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} & \text{si } x \in]-\infty, -2] \cup]2, +\infty[\\ \sqrt{\frac{x+2}{2-x}} & \text{si } x \in]-2, 2[\end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-2}{\sqrt{(x+2)(x-2)^3}} & \text{si } x \in]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[\\ \frac{2}{\sqrt{(x+2)(2-x)^3}} & \text{si } x \in]-2, 2[\end{cases}$$

$$D_{f'} = \mathbb{R} - \{-2, 2\}.$$

En $x = -2$ la fonction f est définie mais n'est pas dérivable.

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f'(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f'(x) = +\infty.$$

Le graphe de f admet en $x = -2$ un minimum qui est un point de rebroussement.

4. Trouver sur la courbe d'équation $4x^3 + y^3 = 1$ le point P du premier quadrant tel que l'aire du triangle déterminé par la tangente à la courbe en P et les axes de coordonnées soit minimum.
-


Soit Γ l'arc de courbe défini par

$$4x^3 + y^3 = 1 \quad \text{avec} \quad x \geq 0, y \geq 0.$$

$$P \in \Gamma \Leftrightarrow 4x_P^3 + y_P^3 = 1, \quad 0 \leq x_P \leq \sqrt[3]{\frac{1}{4}}.$$

Equation de la tangente t à Γ en P :

$$t: y - y_P = m(x - x_P) \quad \text{avec} \quad m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_P.$$



Dérivation implicite de la relation définissant Γ : $12x^2 + 3y^2 y' = 0$.

$$\text{Evaluation en } P : \quad 12x_P^2 + 3y_P^2 m = 0 \Leftrightarrow m = -\frac{4x_P^2}{y_P^2}.$$

$$\text{Equation de la tangente } t \text{ à } \Gamma \text{ en } P : \quad t: y - y_P = -\frac{4x_P^2}{y_P^2} (x - x_P).$$

$$\text{Coordonnées du point } A : \quad A(x_A, 0) \in t \Leftrightarrow 0 - y_P = -\frac{4x_P^2}{y_P^2} (x_A - x_P)$$

$$\Leftrightarrow x_A = \frac{y_P^3}{4x_P^2} + x_P = \frac{y_P^3 + 4x_P^3}{4x_P^2} = \frac{1}{4x_P^2}, \quad x_P \neq 0.$$

$$\text{Coordonnées du point } B : \quad B(0, y_B) \in t \Leftrightarrow y_B - y_P = -\frac{4x_P^2}{y_P^2} (0 - x_P)$$

$$\Leftrightarrow y_B = \frac{4x_P^3}{y_P^2} + y_P = \frac{4x_P^3 + y_P^3}{y_P^2} = \frac{1}{y_P^2}, \quad y_P \neq 0.$$

$$\text{Aire } \mathcal{A} \text{ du triangle } OAB : \quad \mathcal{A} = \frac{1}{2} x_A \cdot y_B = \frac{1}{2} \frac{1}{4x_P^2} \cdot \frac{1}{y_P^2} = \frac{1}{8x_P^2 y_P^2}.$$

$$\text{Expression de } \mathcal{A} \text{ en fonction de } x_P = x : \quad \mathcal{A}(x) = \frac{1}{8x^2 (1 - 4x^3)^{2/3}}, \quad 0 < x < \sqrt[3]{\frac{1}{4}}.$$

Recherche du minimum de \mathcal{A} sur l'intervalle $]0, \sqrt[3]{\frac{1}{4}}[$:

$$\mathcal{A}'(x) = -\frac{(8x^2 (1 - 4x^3)^{2/3})'}{(8x^2 (1 - 4x^3)^{2/3})^2} = -\frac{16x (1 - 4x^3)^{2/3} + 8x^2 \cdot \frac{2}{3} (1 - 4x^3)^{-1/3} \cdot (-12x^2)}{64x^4 (1 - 4x^3)^{4/3}}$$

$$\mathcal{A}'(x) = -\frac{16x (1 - 4x^3) - 64x^4}{64x^4 (1 - 4x^3)^{5/3}} = \frac{8x^3 - 1}{4x^3 (1 - 4x^3)^{5/3}}.$$

$\mathcal{A}'(x)$ s'annule en $x = \frac{1}{2} \in]0, \sqrt[3]{\frac{1}{4}}[$ et change de signe en passant des négatifs aux positifs.

$$\mathcal{A}(x) \text{ est donc minimum en } x = \frac{1}{2}. \quad x_P = \frac{1}{2} \Rightarrow y_P = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}, \quad P\left(\frac{1}{2}, \sqrt[3]{\frac{1}{2}}\right).$$