

Fitoquímica das Beta-Carbolinas no Cipó Tucunacá

Quantificação Cromatográfica de Harmina, THH e Harmalina: Estabilidade Farmacológica e
Classificação: Etnofarmacologia & Química de Produtos Naturais | Ano: 2026 | Conselho Científico Nativaram
Fontes Primárias: Universidade Federal do Acre (UFAC), Dr. Duke's Phytochemical Database, McKenna & Callaway

1. O Gênero Banisteriopsis caapi e suas Variedades

O Cipó Mariri / Jagube (*Banisteriopsis caapi*, família Malpighiaceae) é a liana sagrada fundamental para a decocção da Ayahuasca. Na bacia amazônica do Acre e do Juruá, destacam-se duas variedades morfológicas principais: o Cipó Caupuri (marcado por nós espessos e calosidades proeminentes) e o Cipó Tucunacá (de caule cilíndrico liso, casca nobre e entrecasca fibrosa).

2. Análise Cromatográfica Comparativa das Beta-Carbolinas

Estudos fitoquímicos com cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) revelam diferenças substanciais no perfil de alcaloides beta-carbolínicos entre as variedades:

- Harmina** (9,21 mg/g no Tucunacá): Inibidor potente, seletivo e reversível da enzima MAO-A periférica (RIMA), garantindo a bioatividade oral do sacramento de forma suave e fisiológica.
- Tetra-hidroharmina - THH** (4,20 mg/g): Atua como inibidor suave da recaptação de serotonina, promovendo mirações translúcidas, sustentação serena da corrente e elevação vibratória.
- Harmalina residual mínima** (0,65 mg/g): O teor residual diminuto no Tucunacá é o grande responsável por evitar quedas súbitas de pressão ortostática e os severos tremores motores somáticos provocados pelo Caupuri.

3. Implicações Litúrgicas para os Dirigentes

Para o dirigente que conduz rituais solenes, a previsibilidade fitoquímica do Cipó Tucunacá confere segurança e equilíbrio ao trabalho. Os participantes consagram um preparado límpido, de alta firmeza mental e física, onde o alinhamento da egrégora espiritual flui sem o desgaste de náuseas puramente somáticas decorrentes do excesso desregulador de harmalina.