

# O Feitio da Ayahuasca: Dinâmicas de Preparação, Sinergia Farmacológica e Graduações de Força

O Feitio da Ayahuasca: Dinâmicas de Preparação, Sinergia Farmacológica e Graduações de Força

A ayahuasca é uma decocção botânica complexa utilizada há séculos por pelo menos 160 povos indígenas diferentes na Bacia Amazônica ocidental, possuindo um papel central em suas cosmologias e práticas de cura tradicional [cite: 1, 2, 3]. A partir de meados do século XX, seu uso expandiu-se e consolidou-se em centros urbanos por meio de religiões sincretistas brasileiras, com destaque para o Santo Daime, a União do Vegetal (UDV) e a Barquinha [cite: 4]. Conhecida por designações como

nixi pae

,  
daime

,  
vegetal

e  
yagé  
, esta bebida constitui uma tecnologia etnofarmacológica refinada que se baseia na sinergia bioquímica entre duas plantas principais: o cipó

Banisteriopsis caapi

(mariri ou jagube) e as folhas do arbusto

Psychotria viridis

(chacrona ou rainha) [cite: 1, 4].

Cosmologia Indígena e os Contextos de Uso da Medicina da Floresta

Nas culturas originárias da Amazônia, a preparação da ayahuasca, frequentemente denominada "feitio", transcende a mera extração química, sendo compreendida como um processo de comunicação espiritual e sintonização cosmológica [cite: 1, 5, 6]. Entre o povo Huni Kuin (Kaxinawá), a bebida é chamada de

nixi pae

ou

huni pae

, termos que carregam profundas distinções semânticas [cite: 1]. O termo

huni

refere-se ao cipó em seu estado bruto e silvestre na floresta, enquanto

nixi

denota o conceito de "fio" ou "conexão", culminando na tradução de

nixi pae

como "fio de luz" após o preparo ritualístico [cite: 1].

A cosmologia Huni Kuin atribui a origem da medicina e o aprendizado de seus cantos cerimoniais (

huni meka

) ao povo-jiboia e aos seres espirituais transformadores conhecidos como

yuxibu

[cite: 1, 7]. O uso tradicional do

nixi pae

visa clarear os pensamentos, curar dores físicas, aprimorar a acuidade visual necessária para as atividades de caça e neutralizar o

nisu

— uma condição espiritual equivalente ao azar ou ao bloqueio energético pessoal [cite: 7]. O processo terapêutico é guiado por cantos específicos que modulam a intensidade da experiência: os cantos

pae txanima

são entoados para invocar e colorir as visões (

mirações

), ao passo que os cantos

kayatibu

atuam para suavizar a força psicotrópica quando esta se torna excessivamente intensa ou gera um estado de forte pressão psíquica [cite: 1].

Em ambientes urbanos contemporâneos, as cerimônias de consagração da ayahuasca frequentemente exibem dinâmicas de hibridismo cultural. Nestes cenários, os cantos tradicionais indígenas e as sessões de concentração das doutrinas sincretistas são algumas vezes intercalados com instrumentos ocidentais, como o violão, e rezas que homenageiam guias de matrizes religiosas afro-brasileiras, como Pretos Velhos, Caboclos e Orixás [cite: 1]. No entanto, independentemente do contexto cultural, a preservação do conhecimento tradicional e a sustentabilidade das espécies botânicas têm enfrentado pressões globais significativas devido ao rápido aumento do turismo espiritual e à necessidade de regulamentação do uso destas plantas fora de seus territórios de origem [cite: 3].

---

#### Quimiotaxonomia e Dinâmica Farmacocinética da Sinergia

A atividade psicotrópica da ayahuasca repousa sobre uma interação farmacodinâmica elegante e precisa entre diferentes classes de alcaloides acumulados nas plantas constituintes [cite: 4, 8]. O perfil quimiotaxonômico das espécies utilizadas revela uma ampla gama de compostos bioativos e potenciais aditivos botânicos que modulam o efeito final da bebida [cite: 4, 9].

Planta Constituinte

Família Botânica

Principais Alcaloides Presentes

Mecanismo de Ação Farmacológica

Banisteriopsis caapi

(Mariri / Jagube)

Malpighiaceae

Harmina, Tetrahydroharmina (THH), Harmalina [cite: 4, 8].

Inibição reversível da MAO-A (harmina/harmalina) [cite: 4]; inibição fraca da recaptação de serotonina (THH) [cite: 10, 11].

Psychotria viridis

(Chacrona / Rainha)

Rubiaceae

N,N

---

-Dimetiltryptamina (DMT) [cite: 4, 8].

Agonismo dos receptores de serotonina, principalmente o receptor

5-HT<sub>2A</sub>

[cite: 4].

Embora a associação entre

*B. caapi*

e

*P. viridis*

seja o padrão na maioria dos feitos, o repertório botânico amazônico abrange cerca de 90 plantas aditivas distintas [cite: 4]. Na Colômbia e no Equador, as folhas de

*Diplopterys cabrerana*

(chaliponga) são frequentemente utilizadas em substituição à chacrona, fornecendo altas concentrações de DMT [cite: 4]. No Peru, os feitores por vezes adicionam

*Nicotiana tabacum*

(tabaco),

*Brugmansia*

spp. e

*Brunfelsia*

spp. à decocção para intensificar ou alterar o caráter das visões [cite: 4]. Outras espécies, como a

*Psychotria carthagenensis*

, apresentam uma concentração média de

0,2%

de DMT em suas folhas secas [cite: 9], enquanto a casca da raiz da

*Mimosa hostilis*

(jurema-preta) chega a apresentar teores de

1%

a

1,7%

de DMT [cite: 9]. Por sua vez, as cascas de

*B. caapi*

acumulam teores de harmina que variam de

0,31%

a

0,84%

de seu peso seco [cite: 9].

[Folhas de *Psychotria viridis*] % DMT (Inativo por via oral isolada) %

1/4

[Trato Gastrointestinal] % DMT atinge o Cérebro (Ativação 5-HT<sub>2A</sub>)

%<sup>2</sup>

[Córtex de *Banisteriopsis caapi*] % Harmina/Harmalina % % % % % % % % % % % % % % % %

(Bloqueio temporário da enzima MAO-A)

Por via oral, o DMT puro é rapidamente destruído pelas enzimas monoamina oxidase A (MAO-A) do trato gastrointestinal, impedindo que quantidades psicoativas atinjam o cérebro [cite: 4, 12]. A ingestão concomitante das

\beta

-carbolinas presentes no cipó inibe temporariamente a MAO-A gástrica e hepática, permitindo que o DMT atinja a circulação sistêmica e atravesse a barreira hematoencefálica [cite: 4, 13]. O DMT atua como agonista de múltiplos receptores serotoninérgicos (

5\text{-HT}\_{1A}, 5\text{-HT}\_{1B}, 5\text{-HT}\_{1D}, 5\text{-HT}\_{2A}, 5\text{-HT}\_{2B}, 5\text{-HT}\_{2C}, 5\text{-HT}\_{5A}, 5\text{-HT}\_{6}

e

5\text{-HT}\_{7A}

) [cite: 12], sendo o receptor

5\text{-HT}\_{2A}

o principal responsável pelas profundas alterações perceptivas, visuais e cognitivas [cite: 4].

A farmacocinética clássica da ayahuasca revela que a biodisponibilidade do DMT quando consumido na decocção é de aproximadamente

10\%

a

15\%

[cite: 14]. O pico de concentração plasmática (

$C_{\max}$

) do DMT ocorre entre 90 e 105 minutos após a ingestão, apresentando valores que variam de

12,14\text{ ng/mL}

(para doses baixas) a

17,44\text{ ng/mL}

(para doses elevadas), com uma meia-vida de eliminação plasmática estimada em cerca de 1 hora [cite: 14]. O metabolismo do DMT ocorre por desaminação oxidativa, gerando o ácido indol-3-acético (IAA) como o metabólito urinário predominante, e por N-oxidação, produzindo o N,N-dimetiltriptamina-N-óxido (DMT-NO) como o segundo biomarcador urinário mais abundante de consumo [cite: 10]. A harmalina e a harmina também apresentam alta lipofilicidade e capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, sendo posteriormente metabolizadas e excretadas na forma de conjugados sulfatados ou glicuronídeos através de vias metabólicas de fase II [cite: 4].

---

## O Feitio da Ayahuasca: Parâmetros Físicos, Proporções e Técnicas de Extração

A produção de uma ayahuasca equilibrada requer dos feitores um controle preciso de parâmetros físicos e proporções de biomassa. O processo de feitio é caracterizado por etapas rigorosas de preparação física das matérias-primas, seguidas por decocções sequenciais prolongadas e processos de concentração térmica [cite: 1, 5].

### Preparação Física das Matérias-Primas e Economia Circular do Feitio

O feitio inicia-se com a colheita seletiva e a limpeza mecânica das plantas. No Santo Daime e na União do Vegetal, os homens realizam o corte e o batimento do cipó fresco com marretas de madeira diretamente sobre cepas de madeira dura ("bancas"), desestruturando as fibras lignificadas para expor o córtex e facilitar a solubilização das

\beta

-carbolinas [cite: 1, 15, 16]. As mulheres realizam a limpeza das folhas de chacrona, selecionando apenas espécimes maduros e descartando folhas em decomposição ou cobertas por fungos parasitas [cite: 3, 5, 15].

O processo de feitio gera uma quantidade significativa de resíduos orgânicos conhecidos como bagaço ou borra [cite: 5, 16]. Em alinhamento com os rituais tradicionais de respeito à floresta, esses subprodutos do cozimento são devolvidos à terra como adubo orgânico para nutrir os plantios ou são desidratados e reciclados para a confecção de incensos cerimoniais artesanais (geralmente combinados com breu-branco, olíbano e carvão vegetal), promovendo um ciclo completo de reaproveitamento da biomassa sagrada [cite: 5, 6, 16, 17].

### Relação de Proporção e Quantidades Absolutas

---

A proporção ideal entre as matérias-primas úmidas em um feíto equilibrado situa-se na faixa de

3:1

a

4:1

(três a quatro quilogramas de cipó

B. caapi

para cada quilograma de folha de

P. viridis

). Esta proporção garante que a quantidade de

$\beta$

-carbolinas seja estequiometricamente suficiente para saturar temporariamente os sítios ativos da enzima MAO-A gástrica sem induzir toxicidade aguda [cite: 4, 10].

Uma proporção excessiva de cipó (

5:1

) eleva drasticamente os teores de harmina e harmalina, desencadeando efeitos colaterais periféricos severos, como náusea intensa, vômitos agudos (conhecidos ritualisticamente como "a purga"), tremores e ataxia motora [cite: 4, 8, 10]. Por outro lado, um excesso de folhas de chacrona (

< 2:1

) resulta em uma concentração elevada de DMT livre em relação à capacidade de inibição enzimática disponível, o que pode provocar experiências psicodélicas caóticas, taquicardia transitória, surtos de ansiedade severa ou pânico em indivíduos susceptíveis [cite: 4, 8].

Para fins de padronização, a análise quantitativa de uma dose cerimonial equilibrada de

120\text{ mL}

de ayahuasca consumida por voluntários em um contexto ritualístico revelou as seguintes quantidades absolutas de compostos ativos:

Harmina

:

204,0\text{ mg}

[cite: 10]

Tetrahydroharmina (THH)

:

128,4\text{ mg}

[cite: 10]

Harmalina

:

24,0\text{ mg}

[cite: 10]

N,N

-Dimetiltriptamina (DMT)

:

28,8\text{ mg}

[cite: 10]

Esses valores fornecem uma referência técnica de equilíbrio químico para os fatores, demonstrando que a dose típica fornece uma quantidade de

---

\beta

-carbolinas aproximadamente dez vezes superior à quantidade de triptaminas, o que assegura a inibição enzimática necessária para a ação prolongada do DMT [cite: 4, 10].

Dinâmicas de Cozimento (Decocção) e Redução

A extração dos alcaloides é um processo térmico de longa duração, estruturado em duas fases distintas conduzidas em caldeirões de cobre, ferro ou aço inoxidável alimentados por fogo a lenha ou queimadores de gás [cite: 1, 3]:

Fase de Decocção (Extração)

: O cipó batido e as folhas limpas são organizados em camadas alternadas dentro do caldeirão e cobertos com água [cite: 1, 3]. O material é submetido à fervura contínua por períodos que variam de

4 a 6 horas

por ciclo. A água atua como solvente polar, lixiviando os sais solúveis de DMT e as

\beta

-carbolinas [cite: 4]. Muitas doutrinas realizam de duas a três decocções consecutivas da mesma matéria-prima vegetal, trocando a água a cada ciclo para esgotar completamente os alcaloides presentes no tecido lenhoso do cipó [cite: 1].

Fase de Apuração (Redução)

: Os líquidos lixiviados de todos os ciclos de decocção são combinados e filtrados finamente para a eliminação de resíduos particulados [cite: 16]. O caldo combinado é então submetido a um processo de evaporação lenta em fogo brando (mantido logo abaixo da fervura turbulenta, em torno de

$90^{\circ}\text{C}$

a

$95^{\circ}\text{C}$

) por períodos adicionais de

6 a 12 horas

[cite: 1]. Esta etapa reduz drasticamente o volume hídrico, concentrando os alcaloides solutos até que a bebida atinja o ponto de consumo desejado [cite: 1]. O controle cuidadoso da temperatura nesta fase impede a pirólise ou degradação térmica dos compostos ativos, especialmente da tetrahydroharmina (THH), que desempenha um papel fundamental na modulação dos efeitos psicotrópicos da decocção [cite: 4, 10].

---

Graduações da Ayahuasca: Concentração, Viscosidade e Força

As graduações da ayahuasca referem-se à densidade final de soluto obtida no processo de redução térmica e ao número de vezes que uma mesma quantidade de líquido foi reprocessada com plantas frescas [cite: 1, 4]. Essas graduações diferem drasticamente em viscosidade, teor de sólidos totais e concentração absoluta de alcaloides por unidade de volume [cite: 4, 10].

Grau Simples (Consumo de Linha / Chá de Sessão)

O Grau Simples apresenta um aspecto totalmente líquido, fluido e translúcido quando sob a luz, com coloração variando do marrom-avermelhado ao pardo escuro. É a formulação padrão utilizada nas atividades litúrgicas regulares de maior duração [cite: 4].

Química

: Concentrações padrão equilibradas (

$0,2\text{ mg/mL}$

a

$0,3\text{ mg/mL}$

de DMT e

$1,5\text{ mg/mL}$

---

a

3,0\text{ mg/mL}

de

\beta

-carbolinas totais) [cite: 10, 14].

Dosagem Litúrgica

: Administrado em copos de

100\text{ mL}

a

150\text{ mL}

[cite: 10].

Reconcentrado (Graduações 2x, 3x, 4x, etc.)

O Reconcentrado é produzido por meio de extrações cumulativas. Em vez de utilizar água pura para realizar a decocção das plantas frescas, o feitor utiliza uma ayahuasca já pronta de um feitiço anterior como solvente líquido para extrair os alcaloides de um novo lote de mariri e chacrona. Este ciclo de extração múltipla (lixiviação consecutiva) aumenta a concentração de princípios ativos sem a necessidade de reduzir excessivamente o volume de água por evaporação forçada.

Química

: A concentração de alcaloides é multiplicada de forma proporcional ao grau de reprocessamento (por exemplo, uma ayahuasca 2x apresenta cerca de

0,5\text{ mg/mL}

a

0,8\text{ mg/mL}

de DMT e de

4,0\text{ mg/mL}

a

6,0\text{ mg/mL}

de

\beta

-carbolinas) [cite: 10, 14].

Dosagem Litúrgica

: Administrado em volumes menores, geralmente de

30\text{ mL}

a

50\text{ mL}

, reduzindo o desconforto da ingestão de grandes volumes de líquido amargo e minimizando a distensão gástrica.

Grau Mel (ou Xarope)

O Grau Mel representa o limite físico do processo de redução por calor. O líquido combinado das decocções é evaporado continuamente até que a perda quase total de água livre force os açúcares naturais, as ligninas e as resinas solúveis do cipó a se polimerizarem, conferindo à bebida uma consistência altamente viscosa, densa e pegajosa, muito semelhante ao mel de abelha ou ao melaço de cana.

Química

: Apresenta a máxima densidade de alcaloides viável em soluções aquosas naturais, com teores de DMT que frequentemente excedem

1,5\text{ mg/mL}  
e concentrações de  
\beta  
-carbolinas acima de  
10,0\text{ mg/mL}  
[cite: 10, 14].

Dosagem Litúrgica

: Devido à sua extrema potência, o Grau Mel é ministrado em pequenas colheres ou microdoses calibradas de  
5\text{ mL}  
a  
15\text{ mL}

. Apresenta a vantagem prática de uma altíssima resistência à deterioração biológica, uma vez que a reduzida atividade de água na solução impede o crescimento de fungos e bactérias de fermentação.

---

Modelagem Comparativa de Formulações Tradicionais e de Referência Clínica

Para ilustrar as diferenças de dosagem e a busca por um perfil químico estável e reprodutível, a tabela abaixo compara a composição de doses de ayahuasca tradicional de diferentes graduações com as formulações padronizadas desenvolvidas para ensaios clínicos modernos.

Origem / Formulação

Volume de Dose

Quantidade de DMT

Quantidade de

\beta

-Carbolinas

Proporção Relativa (DMT :

\beta

-Carbolinas)

Propósito e Contexto de Aplicação

Ayahuasca Simples

(Tradicional)

120\text{ mL}

[cite: 10]

28,8\text{ mg}

[cite: 10]

356,4\text{ mg}

(harmina, harmalina e THH combinadas) [cite: 10].

Aprox.

1 : 12

[cite: 10]

Sessões meditativas e litúrgicas regulares de longa duração em comunidades tradicionais e sincretistas [cite: 1, 4].

Ayahuasca Grau Mel

(Tradicional)

15\text{ mL}

---



Aprox.

22,5\text{ mg}

Aprox.

150,0\text{ mg}

Aprox.

1 : 6.6

Práticas ritualísticas focadas em estados rápidos de transe profundo ou armazenamento prolongado do chá em condições de campo.

Formulação Clínica Acacia

(ACL-010 - Dose Baixa)

Administrada por peso corporal (

1\text{ mg/kg}

DMT /

4\text{ mg/kg}

harmalas) [cite: 11].

70,0\text{ mg}

(para indivíduo de

70\text{ kg}

) [cite: 11].

280,0\text{ mg}

(para indivíduo de

70\text{ kg}

) [cite: 11].

Rigorosamente

1 : 4

[cite: 11]

Estudos clínicos abertos fase I e II para o tratamento de depressão unipolar e dependência de substâncias [cite: 11].

Formulação Clínica Acacia

(ACL-010 - Dose Alta)

Administrada por peso corporal (

1,4\text{ mg/kg}

DMT /

5,6\text{ mg/kg}

harmalas) [cite: 11].

98,0\text{ mg}

(para indivíduo de

70\text{ kg}

) [cite: 11].

392,0\text{ mg}

(para indivíduo de

70\text{ kg}

) [cite: 11].

---

Rigorosamente

1 : 4

[cite: 11]

Indução de experiências místicas intensas de alta resolutividade terapêutica sob supervisão médica estrita [cite: 11].

---

#### Sinergia Terapêutica, Neurobiologia e Segurança Clínica

A busca histórica dos fatores por uma ayahuasca equilibrada alinha-se diretamente com descobertas recentes no campo da neurobiologia e da psiquiatria clínica [cite: 8, 10, 18]. A decocção equilibrada atua como um modulador profundo da plasticidade cerebral e dos sistemas de neurotransmissão, apresentando benefícios promissores que superam os efeitos dos compostos ativos quando administrados de forma isolada [cite: 10, 18].

#### Neurogênese e Neuroproteção

Pesquisas pré-clínicas de ponta revelam que a harmina, a harmalina e a tetrahidroharmina promovem a neurogênese por meio da estimulação direta da proliferação celular de progenitoras neurais colhidas da zona subventricular e do giro denteado de camundongos adultos [cite: 10]. Adicionalmente, em culturas de células de neuroblastoma humano (SH-SY5Y), a co-incubação de DMT e harmina em baixas concentrações (

$10^{-6}$  a  $10^{-4}$  M)

de DMT e

$20^{-6}$  a  $20^{-4}$  M)

de harmina) forneceu proteção celular completa contra a apoptose induzida pela exposição a altas concentrações de cocaína, reduzindo significativamente a expressão de proteínas pró-apoptóticas como a caspase-8 [cite: 18]. O extrato bruto de

B. caapi

também exibe efeitos anti-inflamatórios potentes, inibindo a expressão de fatores de transcrição pró-inflamatórios induzidos por lipopolissacarídeos (LPS), como o fator nuclear

$\kappa$ B

(NF-

$\kappa$ B

) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-

$\alpha$

) [cite: 10].

#### Eficácia Psicoterapêutica e Tolerabilidade

No âmbito clínico, a ayahuasca tem se mostrado altamente eficaz no manejo de transtornos mentais complexos, incluindo o Transtorno Depressivo Maior, transtornos de ansiedade generalizada e desordens relacionadas ao abuso de substâncias (como dependência de álcool, cocaína e anfetaminas) [cite: 4, 8, 11]. Os principais mecanismos psicoterapêuticos envolvidos compreendem [cite: 11]:

##### Capacidade de Descentramento (Decentering)

: Habilidade do indivíduo de observar seus próprios pensamentos e sentimentos de forma desapegada, neutra e objetiva, interrompendo ciclos de ruminação mental [cite: 11].

##### Aprimoramento da Aceitação Psicológica

: Facilitação de processos de processamento emocional não-reativo e não-julgador [cite: 11].

##### Modulação de Traços de Personalidade

: Estudos epidemiológicos indicam aumentos significativos nos traços de amabilidade e abertura à experiência, paralelos a reduções consistentes no neuroticismo [cite: 11].

A ingestão de ayahuasca em ambientes cerimoniais e estruturados é considerada fisiológica e psicologicamente segura [cite: 8]. Ao contrário de outras substâncias de abuso, a decocção não induz dependência física ou tolerância farmacológica [cite: 4]. Contudo, seu uso apresenta riscos evidentes em contextos recreativos desregulados, em

---

indivíduos com histórico pessoal ou familiar de psicoses e transtorno bipolar, ou em pacientes que façam uso concomitante de medicamentos antidepressivos de ação serotoninérgica (como inibidores seletivos de recaptação de serotonina), devido ao risco potencial de desenvolvimento de síndrome serotoninérgica grave [cite: 8]. Adicionalmente, o consumo abusivo de preparações altamente concentradas ou adulteradas pode resultar em intoxicações agudas perigosas e crises de pânico descompensadas, exigindo monitoramento rigoroso e a manutenção de protocolos rituais que assegurem um ambiente de suporte adequado ao longo de toda a duração da experiência [cite: 8, 19].

---

Cantos xamânicos Huni Kuin: cerimônias de ayahuasca, cosmologias e pontes entre mundos,

<https://periodicos.unespar.edu.br/vortex/article/download/8946/6970>

<https://periodicos.unespar.edu.br/vortex/article/download/8946/6970>

Uma medicina patrimônio de 160 povos indígenas: As origens da ayahuasca antes da globalização. - Daiara Tukano,

<https://www.daiaratukano.com/post/uma-medicina-ind%C3%ADgena-as-origens-da-ayahuasca-antes-da-globaliza%C3%A7%C3%A3o>

<https://www.daiaratukano.com/post/uma-medicina-ind%C3%ADgena-as-origens-da-ayahuasca-antes-da-globaliza%C3%A7%C3%A3o>

Pressão global sobre a ayahuasca ameaça plantas e saberes da Amazônia - Mongabay,

<https://brasil.mongabay.com/2026/05/pressao-global-sobre-a-ayahuasca-ameaca-plantas-e-saberes-da-amazonia/>

<https://brasil.mongabay.com/2026/05/pressao-global-sobre-a-ayahuasca-ameaca-plantas-e-saberes-da-amazonia/>

Toxicokinetics and Toxicodynamics of Ayahuasca Alkaloids N,N-Dimethyltryptamine (DMT), Harmine, Harmaline and Tetrahydroharmine: Clinical and Forensic Impact - MDPI,

<https://www.mdpi.com/1424-8247/13/11/334>

<https://www.mdpi.com/1424-8247/13/11/334>

Chacrona & Jagube & Breu Resin Incense Sticks - Moon and Chapel,

<https://www.moonandchapel.com/products/charcona-jagube-breu-resin-incense-sticks>

<https://www.moonandchapel.com/products/charcona-jagube-breu-resin-incense-sticks>

Incausa - Incense Sticks - Chacrona and Jagube - Bundle of 6 - VOLTA Vienna,

<https://voltavienna.com/shop/incausa-incense-sticks-chacrona-and-jagube-bundle-of-6/>

<https://voltavienna.com/shop/incausa-incense-sticks-chacrona-and-jagube-bundle-of-6/>

Cantos xamânicos Huni Kuin: cerimônias de ayahuasca, cosmologias e pontes entre mundos - SciELO,

<https://www.scielo.br/j/rv/a/y9SqxVzYfCW5MpCkJ4y964P/?lang=pt>

<https://www.scielo.br/j/rv/a/y9SqxVzYfCW5MpCkJ4y964P/?lang=pt>

Chemical structures of the ayahuasca alkaloids: dimethyltryptamine (DMT); harmine; tetrahydroharmine (THH); and harmaline. - ResearchGate,

[https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structures-of-the-ayahuasca-alkaloids-dimethyltryptamine-DMT-harmine\\_fig1\\_319310930](https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structures-of-the-ayahuasca-alkaloids-dimethyltryptamine-DMT-harmine_fig1_319310930)

[https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structures-of-the-ayahuasca-alkaloids-dimethyltryptamine-DMT-harmine\\_fig1\\_319310930](https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structures-of-the-ayahuasca-alkaloids-dimethyltryptamine-DMT-harmine_fig1_319310930)

List of psychoactive plants - Wikipedia,

[https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_psychoactive\\_plants](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_psychoactive_plants)

[https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_psychoactive\\_plants](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_psychoactive_plants)

Quantitation of N,N-Dimethyltryptamine and Harmala Alkaloids in Human Plasma after Oral Dosing with Ayahuasca - ResearchGate,

[https://www.researchgate.net/publication/14316626\\_Quantitation\\_of\\_NN-](https://www.researchgate.net/publication/14316626_Quantitation_of_NN-Dimethyltryptamine_and_Harmala_Alkaloids_in_Human_Plasma_after_Oral_Dosing_with_Ayahuasca)

[Dimethyltryptamine\\_and\\_Harmala\\_Alkaloids\\_in\\_Human\\_Plasma\\_after\\_Oral\\_Dosing\\_with\\_Ayahuasca](https://www.researchgate.net/publication/14316626_Quantitation_of_NN-Dimethyltryptamine_and_Harmala_Alkaloids_in_Human_Plasma_after_Oral_Dosing_with_Ayahuasca)

---

[https://www.researchgate.net/publication/14316626\\_Quantitation\\_of\\_NN-Dimethyltryptamine\\_and\\_Harmala\\_Alkaloids\\_in\\_Human\\_Plasma\\_after\\_Oral\\_Dosing\\_with\\_Ayahuasca](https://www.researchgate.net/publication/14316626_Quantitation_of_NN-Dimethyltryptamine_and_Harmala_Alkaloids_in_Human_Plasma_after_Oral_Dosing_with_Ayahuasca)  
DMT and harmala alkaloids: an exploratory study of oral Acacia based formulations in healthy volunteers - PMC,  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12395344/>  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12395344/>  
The pharmacological interaction of compounds in ayahuasca: a systematic review - SciELO,  
<http://www.scielo.br/j/rbp/a/s6rDBPvF99z7JccZf3gHNdz/?lang=en>  
<http://www.scielo.br/j/rbp/a/s6rDBPvF99z7JccZf3gHNdz/?lang=en>  
Toxicokinetics and Toxicodynamics of Ayahuasca Alkaloids N, N-Dimethyltryptamine (DMT), Harmine, Harmaline and Tetrahydroharmine: Clinical and Forensic Impact - PubMed,  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33114119/>  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33114119/>  
Human pharmacology of ayahuasca - TDX (Tesis Doctorals en Xarxa),  
<https://www.tdx.cat/handle/10803/5378>  
<https://www.tdx.cat/handle/10803/5378>  
Chacrona & Jagube Incense - The Alchemist's Kitchen,  
<https://www.thealchemistskitchen.com/products/chacrona-jagube-incense>  
<https://www.thealchemistskitchen.com/products/chacrona-jagube-incense>  
Incense Bundle | Chacrona & Jagube x6 Sticks - The Every Space,  
<https://www.theeveryspace.com/products/half-dozen-incense-bundles-chacrona-jagube>  
<https://www.theeveryspace.com/products/half-dozen-incense-bundles-chacrona-jagube>  
Chacrona & Jagube Breu Resin Incense Box - Handcrafted Modern,  
<https://www.handcraftedmodern.co/products/chacrona-and-jagube-breu-resin-incense-box>  
<https://www.handcraftedmodern.co/products/chacrona-and-jagube-breu-resin-incense-box>  
Dimethyltryptamine and harmine, components of ayahuasca, prevented cocaine-induced apoptosis in SH-SY5Y human neuroblastoma cells - PubMed,  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41222610/>  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41222610/>  
Harmina. Harmalina. Tetrahydroharmina (THH) - E-lactancia,  
<https://www.e-lactancia.org/breastfeeding/harmine-harmaline-tetrahydroharmine-thh/synonym/>  
<https://www.e-lactancia.org/breastfeeding/harmine-harmaline-tetrahydroharmine-thh/synonym/>

---

























