

การจำกัดเกลือโซเดียม

- จำกัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกราย
- รับประทาน Na < 2 กรัม/วัน หรือ NaCl < 5 กรัม/วัน

ตัวอย่างปริมาณโซเดียมในอาหารชนิดต่าง ๆ

คุณค่าทางอาหารต่อ 1 ส่วน		โซเดียม (มก.)
เกลือ	1 ช้อนชา	2,000
น้ำปลา/ซีอิ๊ว	1 ช้อนชา	400
ผงปรุงรส	1 ช้อนชา	950
ผงชูรส	1 ช้อนชา	600
กะปิ	1 ช้อนชา	240
น้ำจิ้มไก่/ซอสพริก	1 ช้อนชา	75



“เกลือ...ไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา”
“น้ำปลา...ไม่เกินวันละ 3-4 ช้อนชา”
“ไม่ปรุงอาหารเพิ่ม”
“ไม่ซดน้ำซุป”
“หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด”
“ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งของเดิม”


ปริมาณโปรตีนในอาหาร



เนื้อสัตว์ 2 ช้อนโต๊ะ (~ 4 ชิ้น)



ไข่ทั้งฟอง 1 ฟอง



ลูกชิ้น 4-5 ลูก

ตัวอย่างโปรตีน 7 กรัม = 1 ส่วน



กุ้ง 4-5 ตัว




ปลาหู 1 ตัวเล็ก



ปลาหู 1/2 ตัวกลาง



ไข่ขาว 2 ฟอง



เต้าหู้แข็ง 1/2 แผ่น



ถั่วต่างๆ 1/2 ถ้วยตวง



นมจืด 240 ml

CKD (non-dialysis) จำกัดโปรตีน 0.6 – 0.8 กรัม/กก./วัน
= 7 กรัม/10 กก. = 1 ส่วน/10 กก.

(ผู้ป่วย CKD G3b 50 กก. = รับประทานโปรตีนได้ 5 ส่วนต่อวัน)

ESKD (dialysis) โปรตีน 1.2 - 1.4 กรัม/กก./วัน (ไม่จำกัด)
= 14 กรัม/10 กก. = 2 ส่วน/10 กก.

(ผู้ป่วย CKD G5D 50 กก. = ควรรับประทานโปรตีน 10 ส่วนต่อวัน)

ผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำถึงปานกลาง และสูง

รับประทานได้

จำกัดปริมาณหรือหลีกเลี่ยง
เฉพาะผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมสูง (ไม่ทุกราย)

ปริมาณโพแทสเซียมในอาหารชนิดต่าง ๆ		มีระดับโพแทสเซียมต่ำถึงปานกลาง (100 - 200 มก./100 กรัม)	มีระดับโพแทสเซียมสูง (250 - 350 มก./100 กรัม)
	ประเภทผัก	 แดงร้าน  พริกหยวก  พริกหวาน  บวบ  ถั่วแขก  มะระ  มะเขือยาว  มะละกอดิบ  กะหล่ำปลี  หอมใหญ่  ผักกาดแก้ว  ฟักแม้ว  ฟักเขียว  ผักกาดขาว  ผักกาดหอม	 เห็ด  หน่อไม้ฝรั่ง  บรอกโคลี  ดอกกะหล่ำ  แครอท  แขนงกะหล่ำ  ผักโขม  กระเจี๊ยบ  ผักหวาน  ผักบุ้ง  หัวปลี  ผักคะน้า  ผักกวางตุ้ง  ยอดฟักแม้ว  ใบแค  ใบคื่นช่าย  น้ำผัก  สะเดา  ข้าวโพด  มันเทศ  มันฝรั่ง  ฟักทอง  อโวคาโด  น้ำมะเขือเทศ  น้ำแครอท  ผักแว่น
	ประเภทผลไม้	 สับปะรด  แดงโม  ส้มโอ  ส้มเขียวหวาน  ชมพู่  พุทรา  มังคุด  ลองกอง  องุ่นเขียว  เงาะ  แอปเปิ้ล	 กล้วย  น้ำมะพร้าว  กล้วยตาก  ฝรั่ง  ขนุน  ทูเรียน  น้อยหน่า  กระท้อน  ลำไย  ลูกพลับ  ลูกพรุน  ลูกเกด  มะม่วง  มะเฟือง  มะพร้าว  มะขามหวาน  แคนตาลูป  สันติพิศ  น้ำส้มคั้น

หมายเหตุ
* อ้างอิงข้อมูลจาก
<https://www.kidney.org/atoz/content/potassium>
เข้าถึงเมื่อ
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
**การประกอบอาหารด้วยวิธีต้มหรือนึ่งและการลดปริมาณบริโภค สามารถลดปริมาณโพแทสเซียมในอาหารลงได้



อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง

จำกัดปริมาณหรือหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยเฉพาะที่มีระดับฟอสฟอรัสสูง



- เนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ ไก่หยอง หมูหยอง กุนเชียง แหนม
- อาหารทะเลแช่แข็ง เช่น กุ้ง ปลา หรืออาหารอื่น ๆ ที่เติมฟอสเฟตก่อนแช่แข็ง
- อาหารที่มีผงฟูเป็นส่วนประกอบ เช่น เค้ก คุกกี้ แป้งซาลาเปา หมั่นโถ
- อาหารที่มียีสต์เป็นส่วนประกอบ เช่น ขนมปัง พิชซ่า
- นมและผลิตภัณฑ์จากนม
- ไข่แดง
- เครื่องดื่มสีเข้ม โดยเฉพาะโคคา-โคล่า โกโก้ ช็อคโกแลต



นม



กบ



แมลง/ดักแด้



ลูกชิ้น



ปลาตัวเล็ก (ทั้งก้าง)



ขนมปังโฮลวีท (Na + P)



เส้นบะหมี่



บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป



ข้าวกล็องงอก (uric + P)



เส้นพาสต้า