

Anti-Diabetes Drugs

	Stage 3b (eGFR 30-44 มล./นาที/1.73 ตร.ม.)	Stage 4 (eGFR 15-29 มล./นาที/1.73 ตร.ม.)	Stage 5 (eGFR < 15 มล./นาที/1.73 ตร.ม.)
Metformin	ลดขนาดเหลือ 1000 มก./วัน	ห้ามใช้	
Insulin	เริ่มและปรับขนาดยาโดยหลีกเลี่ยงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ		
SGLT2 inhibitors			
Canagliflozin	ขนาดสูงสุด 100 มก./วัน	ไม่แนะนำให้เริ่มยา หากใช้ยาอยู่แล้ว สามารถใช้ต่อไปจนเริ่มบำบัดทดแทนไตหรือเปลี่ยนไต	
Dapagliflozin	10 มก./วัน	ไม่แนะนำให้เริ่มยา เมื่อ eGFR < 25 มล./นาที/1.73 ตร.ม. หากใช้ยาอยู่แล้ว สามารถใช้ต่อไปจนเริ่มบำบัดทดแทนไตหรือเปลี่ยนไต	
Empagliflozin	10 มก./วัน	ไม่แนะนำให้เริ่มยา เมื่อ eGFR < 20 มล./นาที/1.73 ตร.ม. หากใช้ยาอยู่แล้ว สามารถใช้ต่อไปจนเริ่มบำบัดทดแทนไตหรือเปลี่ยนไต	
GLP-1 receptor agonists			
Exenatide	ระวังในการเริ่มและปรับขนาดยา หลีกเลี่ยงการใช้สูตรยาสัปดาห์ละครั้ง	ไม่แนะนำ	
Dulaglutide	ไม่ต้องปรับขนาดยา		
Liraglutide	ไม่ต้องปรับขนาดยา		
Semaglutide	ไม่ต้องปรับขนาดยา		
DDP-4 inhibitors			
Alogliptin	ขนาดสูงสุด 12.5 มก./วัน	ขนาดสูงสุด 6.25 มก./วัน	
Linagliptin	ไม่ต้องปรับขนาดยา		
Gemigliptin	ไม่ต้องปรับขนาดยา		
Sitagliptin	ขนาดสูงสุด 50 มก./วัน	ขนาดสูงสุด 25 มก./วัน	
Vildagliptin	ขนาดสูงสุด 50 mg/day		
Sulfonylureas (2 nd generation)			
Glipizide	ไม่ต้องปรับขนาดยา *เฝ้าระวังภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ		
Gliclazide	ไม่ต้องปรับขนาดยา *เฝ้าระวังภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ		
Glimepiride	เริ่มด้วยขนาด 1 มก./วัน	ห้ามใช้	
Glibenclamide	ไม่ควรใช้	ห้ามใช้	
Thiazolidinediones			
Pioglitazone	ไม่ต้องปรับขนาดยา		
α-Glucosidase inhibitors			
Acarbose	ไม่ต้องปรับขนาดยา	ไม่แนะนำ	