

Cholesterol & TG lowering agents

กลุ่มยา	ชื่อยา (มก./วัน)	ขนาดสูงสุด ตามระยะของโรคไตเรื้อรัง				หมายเหตุ
		ระยะที่ 1-2	ระยะ 3a	ระยะ 3b-5	ปลูกถ่ายไต	
ยาลดระดับ LDL						
Statins (มก./วัน)	Atorvastatin	40 - 80	40 - 80	20 - 40	20	
	Fluvastatin	80	80	ไม่มีข้อมูล	80	
	Pitavastatin	4	4	2	ไม่มีข้อมูล	
	Pravastatin	40	40	20	20	
	Rosuvastatin	40	20	10	5	
	Simvastatin	40	40	20	20	
Ezetimibe	Ezetimibe	10	10	10	10	
Bile acid sequestrants (กรัม/วัน)	Cholestyramine	16	16	16	16	*รับประทานหลังจากยาอื่น 4 ชม. หรือก่อนยาอื่น 1 ชม. *ห้ามใช้ถ้า TG > 500 มก./ดล.
PCSK9 inhibitors (มก./วัน)	Alirocumab	75-150	75-150	75-150	75-150	
	Evolocumab	140-420	140-420	140-420	140-420	
siRNA (มก./วัน)	Inclisiran	284	284	284	284	
ยาลดระดับ Triglyceride						
Fibric acid derivatives (มก./วัน)	Fenofibrate	300	100	ไม่ควรใช้	ไม่ควรใช้	
	Fenofibrate (micronized form)	200	100	ไม่ควรใช้	ไม่ควรใช้	
	Fenofibrate (micronized and micro-coated form)	160	80	ไม่ควรใช้	ไม่ควรใช้	
	Gemfibrozil	1,200	1,200	600	600	*ไม่ใช่ร่วมกับ statin
	Pemafibrate	0.4	0.4	0.2	ไม่มีข้อมูล	
Niacin (มก./วัน)	Niacin	2,000	2,000	1,000	ไม่มีข้อมูล	
Fish oil (มก./วัน)	Omega-3 fatty acid (EPA/DHA) / pure EPA	4,000	4,000	4,000	4,000	
	Ethyl icosapentate	2,700	2,700	2,700	2,700	