1. Productor: Hierba navajita / Pasto de hoja fina (Bouteloua gracilis)

Rol: Productor primario.

Detalle ecológico: Es una planta gramínea sumamente resistente a la sequía (xerófila). Utiliza la fotosíntesis para capturar la energía solar y almacena nutrientes clave en sus raíces durante los periodos secos.

2. Consumidor Primario: Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii)

Rol: Consumidor primario (Herbívoro).

Detalle ecológico: Se alimenta de los brotes tiernos, tallos y raíces de la hierba navajita. Tiene grandes orejas altamente irrigadas de vasos sanguíneos que le sirven para regular su temperatura corporal en el calor del desierto, además de un sistema digestivo especializado que procesa la fibra vegetal dura.

3. Consumidor Secundario: Cascabel de Mojave (Crotalus scutulatus)

Rol: Consumidor secundario (Depredador carnívoro mediano).

Detalle ecológico: Una serpiente altamente especializada que acecha madrigueras. Utiliza sus fosetas loreales (órganos termorreceptores situados entre los ojos y las fosas nasales) para detectar el calor corporal del conejo en plena oscuridad. Su veneno es una potente neurotoxina que inmoviliza a la presa con rapidez.

4. Consumidor Terciario: Coyote (Canis latrans)

Rol: Consumidor terciario (Depredador tope / Mesodepredador versátil).

Detalle ecológico: Un cánido oportunista e hiperinteligente. Aunque puede comer frutos o insectos, es un cazador tenaz capaz de acosar a serpientes venenosas usando su agilidad para evitar mordeduras, o bien arrebatar presas más grandes. Cuenta con un olfato y oído prodigiosos para rastrear la fauna del matorral.

5. Consumidor Cuaternario (Superdepredador): Águila Real (Aquila chrysaetos)

Rol: Consumidor cuaternario (Superdepredador aéreo).

Detalle ecológico: El apex predator de este ecosistema. Con una vista hasta 8 veces más aguda que la humana, divisa el movimiento a kilómetros de distancia. Posee garras colosales (el dedo hallux puede medir hasta 5-6 cm) con una presión de agarre estimada en más de 400 psi, capaz de fracturar instantáneamente el cráneo o la columna de un coyote joven o cualquier otro intruso en su territorio de caza.

Resumen de la cadena:












Productor: Hierba (utiliza la luz del sol para crecer).

Consumidor Primario: Saltamontes (se come la hierba).

Consumidor Secundario: Rana (se come al saltamontes).

& Consumidor Terciario: Serpiente (se come a la rana).

Consumidor Cuaternario (Superdepredador): Águila (se come a la serpiente).



Nivel Trófico	Especie	Papel Biológico
Superdepredador	Águila culebrera	Controla las poblaciones de serpientes y evita la superpoblación de reptiles.
Depredador Intermedio	Culebra ranera	Mantiene a raya los anfibios; sirve de alimento clave a las grandes rapaces.
Mesodepredador	Rana	Controla plagas de insectos herbívoros.
Herbívoro	Saltamontes	Transforma la materia vegetal viva en proteína animal.

Bacterias intestinales y del interior (Fase de putrefacción): Cuando el animal (por ejemplo, la rana, la serpiente o el águila) muere, las bacterias que ya vivían pacíficamente en su sistema digestivo (como Clostridium o Escherichia coli) se quedan sin control y empiezan a descomponer los tejidos blandos desde adentro hacia afuera, produciendo gases y olores característicos.

Bacterias del suelo y del aire: Una vez que el cuerpo se rompe o se expone al ambiente, entran en acción bacterias aeróbicas del suelo y hongos microscópicos (mohos) que atacan la piel, los músculos y los órganos.

Organismos carroñeros (Insectos auxiliares): Aunque no son microorganismos, en un ecosistema terrestre los insectos necrófagos (como las larvas de moscas y los escarabajos zapateros o de la familia Silphidae) son los primeros en llegar al animal muerto. Ellos despedazan y abren camino para que los hongos y bacterias penetren mucho más rápido.

Hongos del suelo (Fase final): Cuando ya solo quedan huesos, cartílagos o restos secos, entran en juego hongos especializados del suelo y bacterias filamentosas (actinobacterias) que terminan de reciclar los últimos compuestos orgánicos difíciles.









