

Alimentación a partir de los 6 meses

Bibliográfica 2021 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

PRONAP NUTRICIÓN Módulo 1 2020 – “El niño mal comedor” AEP – Pediatría en red 2015

Organizar horarios de comidas, pausas, favoreciendo hábitos y rutinas.

La frecuencia de comidas depende del apetito del niño, y las cantidades requeridas para complementar la lactancia materna; puede comenzarse 1-2 veces al día, para luego incorporarlos a los hábitos familiares, por ejemplo 4 comidas principales y dos colaciones.

Ofrecer porciones pequeñas, permitiéndole que las repita, de manera de mantener el interés por la comida, hacerlo partícipe del proceso de alimentación y evitar que se aburra o se abruma por las cantidades.

Mantener a los niños en “su silla” durante la comida. Estimular alimentación independiente, permitirles comer solos.

El acto de comer debe comenzar dentro de los 15 minutos de haber iniciado la comida y no debe durar más de 20 o 30 minutos.

Mantener una actitud neutral, no elogiar ni criticar el acto de comer.

No realizar juegos ni interrupciones durante la comida (pantallas, juguetes).

No emplear la comida como recompensa ni castigo ni expresión de afecto.

No permitir que “arrojen” comida, a modo de desafío.

Evitar las preparaciones líquidas (sopas, caldos), no contienen suficientes elementos nutritivos porque tienen mayor cantidad de agua.

Es importante hablarle, explicarle lo que va a comer e incorporar los alimentos de a uno por vez, para probar la tolerancia y la aceptación de sabores, y detectar posibles alergias. Es conveniente ofrecer el alimento durante varios días para que el niño/a se habitúe a su sabor.

NO hace falta agregar sal, los alimentos ya contienen, naturalmente, suficiente sal y no conviene que los niños se acostumbren desde pequeños a los sabores muy salados.

¿Qué alimentos se pueden dar y cómo ofrecerlos?

Comience a darle una vez al día con arroz bien cocido; polenta con zapallo u hortalizas (combinar papa sin brotes, camote, zapallo y zanahoria, enriquecidos con leche materna o leche fórmula en polvo).

Se les puede agregar: salsa blanca, ricota o queso tipo cremoso.

Para estimular habilidades manuales, de masticación y autonomía, incorporando textura menos fina, que pueda incrementarse progresivamente a grumos o trozos sugerido por el método “Baby Led Weaning”, en forma de bastones. Se sugieren también preparaciones firmes como tortillas, soufflés, guisos.

Hasta los 3 años conviene no dar más de una pequeña porción diaria de verduras ricas en nitratos (remolacha, espinaca, lechuga, zanahoria, acelga, porotos, lentejas, garbanzos), la eliminación del tallo y la nervadura central produce una disminución del contenido de nitratos.

Evitarse las verduras que causan flatulencia, como coliflor, repollo y las que contienen sustancias sulfuradas (ajo, cebolla, espárragos) responsables de sabores fuertes, ya que pueden resultar desagradables para el niño.

Agregar en cada comida una cucharadita de aceite (evitar el aceite mezcla).

Una semana más adelante agréguele un pequeño trozo de carne sin grasa de vaca, pollo, conejo, o cerdo, desmenuzada, picada finamente o rallada y bien cocida en forma esparcida (nunca en tipo hamburguesa o albóndiga) a la plancha, a la parrilla o hervida.

Evitar las vísceras (hígado, sesos, corazón, riñón) hasta los 12-15 meses por su alto contenido en grasas, y pueden ser portadores de parásitos y sustancias tóxicas por manejo inadecuado del ganado.

Pescado: al menos 2 veces por semana, pescados azules (jurel, salmón, sardina, caballa) o blancos (merluza, gallo, lenguado). El atún enlatado tiene el inconveniente de la sal; podría darse escurriendo el líquido y “lavarlo” previo a la preparación.

Huevo entero cocido (nunca crudo) hasta 2 o 3 veces por semana, en reemplazo de la carne.

Como postre, se pueden ofrecer todas las frutas maduras bien lavadas y peladas. Pueden darse trituradas o jugos. Al ofrecer las frutas en trozos, se recomienda no ofrecer la banana en forma de “monedas”, sino en trozos del largo del puño del niño, y si se ofrece manzana en bastones,

se recomienda dar una cocción ligera, para evitar ahogos si el niño come solo. Las uvas deben ofrecerse peladas, sin semillas, cortadas o pisadas.

Como bebida, lo ideal es el agua hervida y enfriada; también jugos de frutas naturales, colados, pueden diluirse con un poco de agua. No agregarles azúcar.

Yogures: es preferible no ofrecerlos hasta los 12 meses, aunque podrían iniciarse desde los 9-10 meses. Otros derivados lácteos, como postres industriales, natillas, flanes, se deben reservar para alrededor de los 12 meses.

Se les puede dar sabor con condimentos naturales, orégano, laurel, comino, albahaca, combinación de verduras (ajo, cebolla, apio, perejil) y canela.

Los frutos secos pueden ofrecerse desde el comienzo, aunque NO pueden darse enteros, por el riesgo de ahogos, ofrecer en pasta molido con preparaciones caseras.

No:

- Fiambres, hamburguesas, salchichas y otros embutidos, ya que todos contienen muchas grasas, sal y otras sustancias conservantes que pueden causar daño a la salud, sobre todo de los más chiquitos.
- Salsas muy elaboradas, caldo preparado con cubitos y las sopas en sobre.
- Comidas muy condimentadas y picantes.
- Té de yuyos (anís estrellado, tilo, manzanilla; etc.).
- Miel, hasta el año de edad, (puede adquirir botulismo).
- Soja o preparados con soja. Hasta los dos años.
- Gaseosas, ni jugos artificiales, ni de soja.
- Productos salados tipo copetín: papas fritas, chizitos, palitos.

Evolución de la alimentación

La primera vez que les damos un puré lo tocan, juegan con él y, finalmente, prueban una mínima cantidad, nunca el plato entero. Cuando, en lo sucesivo, lo vayan asociando a experiencia positiva lo irán aceptando y les generará apetito.

La familia paciente que insiste en la diversificación de alimentos evita el niño “comedor monótono” (que comen de solo uno o pocos alimentos y se niegan a probar otros): estos niños estarían en riesgo de un fallo de desnutrición, por alimentación desequilibrada. Sin embargo, cierto grado de rechazos, manías y monotonías son normales al inicio del aprendizaje alimentario.

Aceptación de un nuevo alimento

Puede precisar hasta 10 o 15 intentos frustrados, hay que probar a ofrecer pequeñas cantidades del alimento que rechaza 2-3 veces por semana, sin prisas ni forzamientos.

Los lactantes expuestos a más sabores aceptan mejor otros nuevos alimentos.

Hacia los 12-14 meses los niños manejan la cuchara con poca destreza. Hacia los 15-18 meses podrán comer solos combinando el uso de cuchara-mano y plato o taza.

La obligación generará rechazo, mientras la prohibición generará deseo, un ejemplo es el que sucede cuando decimos frases como: “no hay postre hasta que no te comas tus verduras”, por lo cual, las verduras son obligadas y no deseables. En ambientes donde no hay carencia de alimentos, los niños a veces, usan la comida como arma para enfrentarse con sus padres, aun a costa de quedarse sin comer. La estima y aceptación de los alimentos aumenta solo cuando se asocian a un contexto positivo.

Modelo posible aconsejado:

- Un horario regular y previsible.
- El aviso previo a la comida.
- Ordenar los juguetes antes de comer.
- Lavarse las manos.
- Participar en la preparación de la mesa.
- Colocarse el babero o ayudar a colocar las servilletas.
- Sentarse en su asiento.

- El orden de los platos.
- La selección de los alimentos.
- El ambiente de cordialidad e interés mutuo entre los que acompañan y también van a comer.
- Exclusión de la televisión y celulares al momento de comer de todos los integrantes de la familia.
- No eternizar la duración si no se ha comido todo, si a la media hora no ha acabado (o cuando el resto de la familia haya terminado de comer) retirar el plato.
- El cepillado de dientes al acabar las comidas, etc.

Errores del aprendizaje alimentario, según Llingworth

- Distracer al niño para que coma: TV, lecturas, música.
- Intentar convencerlo o persuadirle: mediante premios o castigos.
- Intentar chantajearlo: si comes te daré...
- Forzarlo: obligarlo físicamente, metérselo en la boca.
- Amenazarlo para que coma: si no comes te pasará que...
- Que coma lo que quiera ("a la carta"): ¿qué quieres para comer? Y ahora si no, ¿qué comerás?
- Darle entre comidas: así, al menos, come algo...

El uso de placebos farmacológicos o alternativos (polivitamínicos, tónicos, estimulantes, pólenes, jaleas reales, etc.) dificultan la alimentación al desviar la atención al niño.

A tener en cuenta:

- Desde el 6º mes, el niño crece menos y necesita menos alimento.
- El peso normal no es el peso promedio, sino el relacionado con la talla.
- Comparar la proporción ingesta/peso entre padres e hijo, evidencia el error de apreciación parental.
- En las frecuentes infecciones banales con fiebre perderá unos días el apetito.
- Cada niño tiene un apetito y un metabolismo distintos, igual que su carácter o su personalidad.
- Una conducta muy controladora o exigente de los padres impide que el niño aprenda a autorregularse la ingesta, principio básico en todas las especies animales, incluida la humana.
- El rol de los padres es ofrecer alimentos sanos y variados a su hijo, mientras es el niño quien decide la cantidad que come.
- Evite comentar los problemas de alimentación de su hijo cuando él esté presente.
- Adornar comidas para que sean atractivas



- Si su hijo se enrabieta cuando llega la hora de la comida, intente no darle tanta importancia

y hay que tratar de distraerlo para evitar perpetuar ese reclamo de atención.

- Si no le gusta un alimentos concretos, sustitúyalos por uno equivalente y vuélvase a ofrecer pasado un tiempo y preparado de otro modo que le resulte atractivo.
- Si su hijo apenas come y además no engorda ni crece desde hace varios meses, en primer lugar debe consultar con su pediatra.

Ofrézcale postres lácteos, quesitos o crema de leche en los purés, queso rallado o frutos secos triturados en pastas, verduras o arroces; alimentos ricos en hidratos de carbono como papa, arroz, o pasta; cocine con salsa blanca; reboce con pan rallado carnes , pollo y pescados.

Alimentación en preescolares

La etapa preescolar abarca las edades de 2 a 5 años de vida.

Grupos de alimentos

Leche, yogur y quesos: se recomienda nombrar de esta forma y no como lácteos para evitar la inclusión de crema, manteca o postres con leche industrializados en el grupo: fuente principal de calcio y proteínas enteras. A partir de los 2 años y en niños con estado nutricional normal se puede considerar consumo de lácteos descremados.

Carnes y otras fuentes de proteínas: fuente de proteínas de alta calidad. Las carnes (vaca, aves, pescados, otras) aportan hierro. Preferir los cortes magros y evitar los embutidos y fiambres. Las carnes de pescado tienen menor contenido energético y el pescado de mar es fuente de ácidos grasos omega 3. Huevos de todas las aves, limitar a uno al día. Es necesario promover el consumo de legumbres.

Cereales y pan: fuente principal de hidratos de carbono y fibras. La mitad de los almidones deben ser de grano entero. Trigo, avena, cebada, centeno, arroz y sus derivados, fideos, pan, galletas.

Frutas y verduras: fuente de vitaminas (principalmente A y C), fibras y minerales. Incluyen todas las frutas y verduras comestibles. De acuerdo con la iniciativa internacional 5 al día y adecuando el tamaño de la porción a la edad, se incluirán 5 porciones diarias entre frutas y verduras, preferentemente frescas. En el lavado y cocción se debe evitar la dilución de los nutrientes. Incluir en lo posible una fuente diaria de vitamina C (cítricos, frutilla, tomate o kiwi) y de vitamina A (vegetales o frutas verde oscuro o amarillos). Los jugos 100% naturales pueden reemplazar parte de las frutas, en volúmenes limitados a 120 cc a los 2 y 3 años y 180 cc a los 4 y 5 años.

Grasas y aceites: fuente de energía, colaboran en la absorción de vitaminas y pueden tener ácidos grasos beneficiosos. Las grasas saturadas deben limitarse a menos de 10% de las calorías totales. Se pueden alternar los aceites de diferentes semillas: de los disponibles aquí, girasol, maíz, oliva, colza.

Alimentos y bebidas de consumo ocasional: no son necesarios para ninguna finalidad. Aportan calorías y no ofrecen nutrientes saludables.

Recomendaciones dietarias para niños preescolares y escolares por grupos de alimentos expresadas en medidas caseras

Alimento o bebida	Frecuencia de consumo	Porciones Edad: 2 a 5 años	Porciones Edad: 6 a 11 años	Equivalencias de una porción
Leche, yogur y queso ⁽²⁾ (sin azúcar agregada)	Diaria	2 tazas	3 tazas	1 taza de leche o yogurt = 40 g queso natural
Verduras	Diaria	2 platos	2 platos	1 porción = un plato
Frutas frescas	Diaria	2 unidades	3 unidades	1 porción = 1 fruta o media taza de uvas o frutillas = el jugo natural de una fruta
Frutos secos	3 a 4 veces por semana	1 puñado. En los menores de 4 a 5 años, molidos	1 puñado	1 puñado del tamaño de la mano del niño
Carnes y otras fuentes de proteínas	Diaria	No más de una porción al día		1 porción, 30 g de carne de animales comestibles = 1/4 de taza de legumbres cocidas, 1 huevo
Carnes rojas y blancas	2-3 veces por semana	1 bife pequeño	1 bife pequeño	
Pescado	2-3 veces por semana	1 filete pequeño	1 filete pequeño	
Legumbres cocidas	2 veces por semana	1/4 de taza	1/4 de taza	
Huevos	2-3 veces por semana	1 unidad	1 unidad	
Cereales, pastas cocidas, idealmente integrales, papas	4-5 veces por semana	½ taza	½ taza	1 porción = media taza de cereal cocido, arroz o pastas, una taza de cereal seco
Pan	Diaria	1 ½ rebanadas	2 rebanadas	
Grasas y aceites	Diaria	Para cocinar o condimentar		

1. Los grupos de alimentos son comunes para las edades preescolar y escolar, lo que varía es el tamaño de las porciones. A tener en cuenta: las variaciones individuales en las características del apetito, el potencial genético que modificará el ritmo de crecimiento, las características de cada grupo de alimento en las diferentes zonas del país de acuerdo a la cultura, disponibilidad y tradiciones locales. Los tamaños de los platos se regulan por tamaño del niño, apetito, otros factores individuales.
2. sugiere mencionar como leche, yogur y queso para evitar la inclusión de otros derivados lácteos como manteca, crema de leche, postres lácteos.

Alimentos funcionales: los agregados de prebióticos, probióticos y simbióticos en los alimentos de consumo habitual, no tienen actualmente evidencia para su indicación en la nutrición de niños sanos con una alimentación variada.

Líquidos: el agua en los volúmenes sugeridos para la edad acompañará a todas las comidas y entre comidas será la bebida elegida. Agua y leche, preferentemente baja en grasas, satisfacen los requerimientos de líquidos.