

Dieta hipofermentativa

Esta dieta busca reducir la carga osmótica y la fermentación bacteriana en el colon, aliviando la distensión, el dolor abdominal y los cambios en el hábito evacuatorio.

Pautas Generales

Fraccionar: Realizar 4 a 5 comidas diarias para evitar sobrecarga digestiva.

Priorizar hervido, horno o plancha.

Evitar frituras y guisos.

Hidratación: Agua, no gaseosas o jugos artificiales.

Esquema Dietario Sugerido

Momento	Opciones Recomendadas
Desayuno / Merienda	Infusión ligera (té común o de yerbiado/mate cocido) + Pan blanco tostado o galletas de arroz (ideal esta última). Queso (si es posible reducido en lactosa). Evitar dulces
Media Mañana	1 unidad de fruta permitida (banana madura o manzana) o un puñado pequeño de frutos secos.
Almuerzo	Proteína magra (pollo sin piel carne de vaca o pescado) a la plancha + Arroz blanco o polenta + Zanahorias hervidas.
Cena	Tortilla de zapallo (sin semillas ni cebolla) o al horno + Huevo revuelto (no frito) o carne de ternera magra.

Selección de Alimentos

Permitidos (Bajos en fermentación)

- Vegetales: Zanahoria, zapallo), papa, camote.
- Frutas: Banana madura, manzana, pera (mejor si es en compota), tomate (sin piel y sin semillas).
- Cereales: Arroz, fideos, polenta, productos "sin TACC" (por ausencia de fructanos en el trigo).
- Proteínas: Huevo, pollo, pescado, carnes rojas magras.
- Lácteos: leche sin lactosa, queso bajo en lactosa.
- Endulzantes: estevia (sola, revisar el edulcorante porque muchas veces es mezcla), sucraosa.

Evitar!! (Altamente fermentables)

- Vegetales: Cebolla, ajo, puerro, brócoli, coliflor, espárragos.
- Frutas: naranja, sandía, durazno, ciruela (altas en fructosa y sorbitol).
- Legumbres: Porotos, lentejas, garbanzos, soja.
- Cereales: Trigo, centeno, cebada.
- Endulzantes: Miel, azúcar, sorbitol, xilitol (presente en algunos edulcorantes).