

Miasis

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

Enfermedad parasitaria ocasionada por larvas de mosca que afecta los tejidos y órganos de vertebrados.

La afectación en humanos y las demás especies es de distribución mundial, pero predomina en la Zona Tropical y Subtropical.

Miasis auditiva

Signo/sintomatología: prurito intenso y tremor en el oído, asociado a secreción de sensaciones y zumbidos. Si ocurre en el oído medio, las larvas pueden migrar hasta el cerebro por lo que debe ser evaluado por ORL.



Miasis del cuero cabelludo

En pediatría se localizan sobre todo en cuero cabelludo, por lesiones de rascado secundarias a pediculosis. En nuestro medio se observa sobre todo en época de verano.



Evolución

Dentro de las 24 hs aparecen pápulas eritematosas (similar a una picadura de insecto), con secreción serosa o purulenta, rodeada de edema y eritema. En general son 1 a 4 lesiones forunculares.

2 semanas: encontramos criptas con secreción purulenta y larvas adultas (en 5-10 semanas maduran a mosca).

Pueden destruir cartílago y hueso y producir hemorragias o meningoencefalitis. Por lo que si la lesión es importante se solicita Rx de cráneo.

Factores de riesgo

- Úlceras
- Hemorragias
- Infecciones bacterianas de heridas o cavidades
- Cría de animales
- Pediculosis

Diagnóstico diferencial

- Forunculosis piógena por Estafilococos
- Abscesos
- Quiste epidérmico sebáceo infectado
- Celulitis
- Reacción a cuerpo extraño
- Reacción alérgica
- Lesiones por escabiosis

Tratamiento

- Debe eliminarse la larva mediante presión u extracción directa, no dejar restos ya que predisponen a procesos infecciosos. No escarbar sobre lesión. Para facilitar la extracción puede ocluirse la entrada a la lesión con Éter en forma local o un agente impermeable como vaselina para asfixiar a la larva, ambas medidas le ocasionan la muerte, permitiendo su extracción con mayor facilidad debido a que en este estado ya no es capaz de sujetarse al tejido.
- Cefalexina a 80 mg/Kg/día como profilaxis para evitar infecciones por gérmenes de piel (la herida habitualmente es estéril)
- Ivermectina: droga que está aprobada únicamente para el tratamiento de la pediculosis. Actúa estimulando la liberación de ácido gamma aminobutílico, un inhibidor de la transmisión nerviosa.

Se utiliza en una dosis oral única de 200 mg /kg en ayuna, en pacientes mayores de 2 años.

No debe indicarse en pacientes con trastornos del sistema nervioso central que pudiesen tener alguna alteración en la barrera hematoencefálica. Fuera de estos casos en particular la droga tiene un margen de seguridad amplio.