

Alimentación a partir de los 6 meses

Organizar horarios de comidas, pausas, favoreciendo hábitos y rutinas.

La frecuencia de comidas depende del apetito del niño, y las cantidades requeridas para complementar la lactancia materna; puede comenzarse 1-2 veces al día, para luego incorporarlos a los hábitos familiares, por ejemplo 4 comidas principales y dos colaciones.

Ofrecer porciones pequeñas, permitiéndole que las repita, de manera de mantener el interés por la comida, hacerlo participe del proceso de alimentación y evitar que se aburra o se abrume por las cantidades.

Mantener a los niños en "su silla" durante la comida. Estimular alimentación independiente, permitirles comer solos.

El acto de comer debe comenzar dentro de los 15 minutos de haber iniciado la comida y no debe durar más de 20 o 30 minutos.

Mantener una actitud neutral, no elogiar ni criticar el acto de comer.

No realizar juegos ni interrupciones durante la comida (pantallas, juguetes).

No emplear la comida como recompensa ni castigo ni expresión de afecto.

No permitir que "arrojen" comida, a modo de desafío.

Evitar las preparaciones líquidas (sopas, caldos), no contienen suficientes elementos nutritivos porque tienen mayor cantidad de agua.

Es importante hablarle, explicarle lo que va a comer e incorporar los alimentos de a uno por vez, para probar la tolerancia y la aceptación de sabores, y detectar posibles alergias. Es conveniente ofrecer el alimento durante varios días para que el niño/a se habitúe a su sabor.

NO hace falta agregar sal, los alimentos ya contienen, naturalmente, suficiente sal y no conviene que los niños se acostumbren desde pequeños a los sabores muy salados.

¿Qué alimentos se pueden dar y cómo ofrecerlos?

Comience a darle una vez al día con arroz bien cocido; polenta con zapallo u hortalizas (combinar papa sin brotes, camote, zapallo y zanahoria, enriquecidos con leche materna o leche fórmula en polvo).

Se les puede agregar: salsa blanca, ricota o queso tipo cremoso.

Para estimular habilidades manuales, de masticación y autonomía, incorporando textura menos fina, que pueda incrementarse progresivamente a grumos o trozos sugerido por el método "Baby Led Weaning", en forma de bastones. Se sugieren también preparaciones firmes como tortillas, soufflés, guisos.

Alimentación a partir de los 6 meses

Organizar horarios de comidas, pausas, favoreciendo hábitos y rutinas.

La frecuencia de comidas depende del apetito del niño, y las cantidades requeridas para complementar la lactancia materna; puede comenzarse 1-2 veces al día, para luego incorporarlos a los hábitos familiares, por ejemplo 4 comidas principales y dos colaciones.

Ofrecer porciones pequeñas, permitiéndole que las repita, de manera de mantener el interés por la comida, hacerlo participe del proceso de alimentación y evitar que se aburra o se abrume por las cantidades.

Mantener a los niños en "su silla" durante la comida. Estimular alimentación independiente, permitirles comer solos.

El acto de comer debe comenzar dentro de los 15 minutos de haber iniciado la comida y no debe durar más de 20 o 30 minutos.

Mantener una actitud neutral, no elogiar ni criticar el acto de comer.

No realizar juegos ni interrupciones durante la comida (pantallas, juguetes).

No emplear la comida como recompensa ni castigo ni expresión de afecto.

No permitir que "arrojen" comida, a modo de desafío.

Evitar las preparaciones líquidas (sopas, caldos), no contienen suficientes elementos nutritivos porque tienen mayor cantidad de agua.

Es importante hablarle, explicarle lo que va a comer e incorporar los alimentos de a uno por vez, para probar la tolerancia y la aceptación de sabores, y detectar posibles alergias. Es conveniente ofrecer el alimento durante varios días para que el niño/a se habitúe a su sabor.

NO hace falta agregar sal, los alimentos ya contienen, naturalmente, suficiente sal y no conviene que los niños se acostumbren desde pequeños a los sabores muy salados.

¿Qué alimentos se pueden dar y cómo ofrecerlos?

Comience a darle una vez al día con arroz bien cocido; polenta con zapallo u hortalizas (combinar papa sin brotes, camote, zapallo y zanahoria, enriquecidos con leche materna o leche fórmula en polvo).

Se les puede agregar: salsa blanca, ricota o queso tipo cremoso.

Para estimular habilidades manuales, de masticación y autonomía, incorporando textura menos fina, que pueda incrementarse progresivamente a grumos o trozos sugerido por el método "Baby Led Weaning", en forma de bastones. Se sugieren también preparaciones firmes como tortillas, soufflés, guisos.

Hasta los 3 años conviene no dar más de una pequeña porción diaria de verduras ricas en nitritos (remolacha, espinaca, lechuga, zanahoria, acelga, porotos, lentejas, garbanzos), la eliminación del tallo y la nervadura central produce una disminución del contenido de nitritos.

Evitarse las verduras que causan flatulencia, como coliflor, repollo y las que contienen sustancias sulfuradas (ajo, cebolla, espárragos) responsables de sabores fuertes, ya que pueden resultar desagradables para el niño.

Agregar en cada comida una cucharadita de aceite (evitar el aceite mezcla).

Una semana más adelante agréguele un pequeño trozo de carne sin grasa de vaca, pollo, conejo, o cerdo, desmenuzada, picada finamente o rallada y bien cocida en forma esparcida (nunca en tipo hamburguesa o albóndiga) a la plancha, a la parrilla o hervida. Evitar las vísceras (hígado, sesos, corazón, riñón) hasta los 12-15 meses por su alto contenido en grasas, y pueden ser portadores de parásitos y sustancias tóxicas por manejo inadecuado del ganado.

Pescado: al menos 2 veces por semana, pescados azules (jurel, salmón, sardina, caballa) o blancos (merluza, gallo, lenguado). El atún enlatado tiene el inconveniente de la sal; podría darse escurriendo el líquido y "lavarlo" previo a la preparación.

Huevo entero cocido (nunca crudo) hasta 2 o 3 veces por semana, en reemplazo de la carne.

Como postre, se pueden ofrecer todas las frutas maduras bien lavadas y peladas. Pueden darse trituradas o jugos. Al ofrecer las frutas en trozos, se recomienda no ofrecer la banana en forma de "monedas", sino en trozos del largo del puño del niño, y si se ofrece manzana en bastones, se recomienda dar una cocción ligera, para evitar ahogos si el niño come solo. Las uvas deben ofrecerse peladas, sin semillas, cortadas o pisadas.

Como bebida, lo ideal es el agua hervida y enfriada; también jugos de frutas naturales, colados, pueden diluirse con un poco de agua. No agregarles azúcar.

Yogures: es preferible no ofrecerlos hasta los 12 meses, aunque podrían iniciarse desde los 9-10 meses. Otros derivados lácteos, como postres industriales, natillas, flanes, se deben reservar para alrededor de los 12 meses.

Se les puede dar sabor con condimentos naturales, orégano, laurel, comino, albahaca, combinación de verduras (ajo, cebolla, apio, perejil) y canela.

Los frutos secos pueden ofrecerse desde el comienzo, aunque NO pueden darse enteros, por el riesgo de ahogos, ofrecer en pasta molido con preparaciones caseras.

No: Fiambres, hamburguesas, salchichas y otros embutidos, ya que todos contienen muchas grasas, sal y otras sustancias conservantes que pueden causar daño a la salud, sobre todo de los más chiquitos.

Salsas muy elaboradas, caldo preparado con cubitos y las sopas en sobre.

Comidas muy condimentadas y picantes.


Té de yuyos (anís estrellado, tilo, manzanilla; etc).

Miel, hasta el año de edad, (puede adquirir botulismo).

Soja o preparados con soja. Hasta los dos años.

Gaseosas, ni jugos artificiales, ni de soja.

Productos salados tipo copetín: papas fritas, chizitos, palitos.



Hasta los 3 años conviene no dar más de una pequeña porción diaria de verduras ricas en nitritos (remolacha, espinaca, lechuga, zanahoria, acelga, porotos, lentejas, garbanzos), la eliminación del tallo y la nervadura central produce una disminución del contenido de nitritos.

Evitarse las verduras que causan flatulencia, como coliflor, repollo y las que contienen sustancias sulfuradas (ajo, cebolla, espárragos) responsables de sabores fuertes, ya que pueden resultar desagradables para el niño.

Agregar en cada comida una cucharadita de aceite (evitar el aceite mezcla).

Una semana más adelante agréguele un pequeño trozo de carne sin grasa de vaca, pollo, conejo, o cerdo, desmenuzada, picada finamente o rallada y bien cocida en forma esparcida (nunca en tipo hamburguesa o albóndiga) a la plancha, a la parrilla o hervida. Evitar las vísceras (hígado, sesos, corazón, riñón) hasta los 12-15 meses por su alto contenido en grasas, y pueden ser portadores de parásitos y sustancias tóxicas por manejo inadecuado del ganado.

Pescado: al menos 2 veces por semana, pescados azules (jurel, salmón, sardina, caballa) o blancos (merluza, gallo, lenguado). El atún enlatado tiene el inconveniente de la sal; podría darse escurriendo el líquido y "lavarlo" previo a la preparación.

Huevo entero cocido (nunca crudo) hasta 2 o 3 veces por semana, en reemplazo de la carne.

Como postre, se pueden ofrecer todas las frutas maduras bien lavadas y peladas. Pueden darse trituradas o jugos. Al ofrecer las frutas en trozos, se recomienda no ofrecer la banana en forma de "monedas", sino en trozos del largo del puño del niño, y si se ofrece manzana en bastones, se recomienda dar una cocción ligera, para evitar ahogos si el niño come solo. Las uvas deben ofrecerse peladas, sin semillas, cortadas o pisadas.

Como bebida, lo ideal es el agua hervida y enfriada; también jugos de frutas naturales, colados, pueden diluirse con un poco de agua. No agregarles azúcar.

Yogures: es preferible no ofrecerlos hasta los 12 meses, aunque podrían iniciarse desde los 9-10 meses. Otros derivados lácteos, como postres industriales, natillas, flanes, se deben reservar para alrededor de los 12 meses.

Se les puede dar sabor con condimentos naturales, orégano, laurel, comino, albahaca, combinación de verduras (ajo, cebolla, apio, perejil) y canela.

Los frutos secos pueden ofrecerse desde el comienzo, aunque NO pueden darse enteros, por el riesgo de ahogos, ofrecer en pasta molido con preparaciones caseras.

No: Fiambres, hamburguesas, salchichas y otros embutidos, ya que todos contienen muchas grasas, sal y otras sustancias conservantes que pueden causar daño a la salud, sobre todo de los más chiquitos.

Salsas muy elaboradas, caldo preparado con cubitos y las sopas en sobre.

Comidas muy condimentadas y picantes.

Té de yuyos (anís estrellado, tilo, manzanilla; etc).

Miel, hasta el año de edad, (puede adquirir botulismo).

Soja o preparados con soja. Hasta los dos años.

Gaseosas, ni jugos artificiales, ni de soja.

Productos salados tipo copetín: papas fritas, chizitos, palitos.

