Nav Coaching
Where Passion Meets Quality

دليل عملي للتمرين والتغذية والتطبيق الذاتي

كتيّب التدريب الرياضي

طريقك الصحيح، مع دليلك الأصح

إعداد المدرّبة ساره

NAVCOACHING.COM

إشعار حفظ الحقوق وإخلاء المسؤولية

جميع حقوق هذا الكتيّب محفوظة للمؤلفة، المدرّبة ساره (Nav Coaching). لا يحق لحامل النسخة، مدفوعة كانت أو مجانية، نشرها أو نسخها أو مشاركتها أو إعادة بيعها بأي شكل من الأشكال، ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

يستند محتوى الكتيّب إلى مراجع علمية معتمدة وخبرة عملية، وهو محتوى تثقيفي موجّه للأفراد الأصحاء. لا تغني المعلومات الواردة فيه عن استشارة الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي أو أخصائي التغذية المرخّص، خصوصًا في حالات الحمل، أو الأمراض المزمنة، أو الإصابات، أو عند تناول أدوية.

تنبيه

لا تتحمّل المدرّبة مسؤولية فهم المحتوى أو تطبيقه بطريقة غير صحيحة. وعند الشعور بألم حاد أو دوخة أو ضيق تنفّس غير معتاد أثناء التمرين، يجب التوقف فورًا ومراجعة مختص.

المقدمة

في ظل قلّة المراجع العربية الموثوقة في مجال الرياضة، يأتي هذا الكتيّب ليقدّم أسس التمرين والتغذية الصحية بأسلوب مبسّط وواضح، بحيث يتمكّن المبتدئ من إعداد جدول تمارين واتّباع نمط غذائي يستند إلى مبادئ علمية راسخة.

أضع بين يديك في هذا الكتيّب حصيلة خبرتي مع أكثر من 600 مشترك ومشتركة في مجالَي التغذية والتمارين. ستجد فيه الأساسيات والمعلومات الضرورية لفهم التمرين والتغذية فهمًا أعمق وتطبيق النصائح بشكل عملي، بما يدعم تقدّمك نحو أسلوب حياة صحي ومستدام، سواء كان هدفك خسارة الوزن، أو بناء العضلات، أو الحفاظ على صحتك العامة.

لا يقتصر هذا الكتيّب على نصائح عابرة، بل يلخّص سنوات من العمل مع مئات المتدرّبين والمتدرّبات، لتتعلّم كيف تصمّم جدولك التدريبي الخاص وتحافظ على لياقتك ومرونتك، وتستمتع برحلة التحوّل نحو الأفضل بإذن الله.

> **إن كنت من المتدرّبين معي**
>
> لا تتردد في التواصل معي متى احتجت إلى توضيح أي نقطة في هذا الكتيّب. من المهم الاطلاع على محتواه، مع أنك ستكتسب معظم المعلومات خلال التطبيق العملي معي. وتذكّر أن ما ورد هنا قد لا يتوافق تمامًا مع حالتك الخاصة، فخطتك الشخصية موجودة في ملفك التدريبي.

خالص الشكر والامتنان لاختيارك لي شريكًا في رحلتك نحو حياة صحية ومتوازنة.

الفهرس

— المقدمة 3

01 الهدف من الكتيّب 6
الهدف · خلفية المدرّبة وخبراتها

02 المصطلحات المهمة 9
قاموس المصطلحات · أنواع الانقباضات العضلية

03 لماذا أتمرّن؟ 13
التغيير يبدأ من الداخل

04 تصحيح مفاهيم خاطئة 15
أشهر المعتقدات وتصحيحها

05 نقاط مهمة 21
جودة التمرين تعتمد على النوم والتغذية · الراحة السلبية مهمة جدًا للاستشفاء · أهمية الإحماء (Warm Up) · أهمية التهدئة (Cool Down)

06 العدّات والأوزان ومقاييس الجهد 25
علاقة الفشل العضلي بالعدّات · الوزن المناسب لك · مقياسا RPE وRIR · نوعا الفشل العضلي

07 كيف تصمّم جدولك الرياضي؟ 29
أساسيات تصميم الجدول الرياضي · تكرار تمرين العضلة في الأسبوع · أنماط الحركة: الأساس الذي يُبنى عليه الجدول · كيف تحسب جولاتك الأسبوعية؟

08 العضلات ووظائفها 36
القاعدة الذهبية · الجزء العلوي · الجزء السفلي

09 التطوّر والاستشفاء 39
الزيادة التدريجية · الاستشفاء · أسبوع التخفيف (Deload) · متى تعدّل حجمك التدريبي؟

10 مكتبة تمارين مصغّرة 44
مكتبة تمارين مصغّرة

11 **أمثلة جداول التمرين** 45
مثال على جداول تمرين من تصميمي

12 **أساسيات التغذية** 48
الصحة توازن، لا قائمة ممنوعات · طعام مغذٍّ وطعام أقل تغذية · كيف تركّب طبقًا متوازنًا؟ · توازن الطاقة: القاعدة التي لا يتجاوزها أي نظام

13 **من الهدف إلى النتيجة** 54
كيف تختار هدفك؟ · خسارة الدهون · زيادة الوزن والبناء العضلي · الوصول لهدفك دون حساب السعرات

14 **التغذية في حياتك اليومية** 59
الأكل خارج المنزل والمناسبات · أخطاء شائعة في حساب السعرات · المكملات الغذائية: المفيد وغير المفيد

15 **هل يمكنني التمرّن أثناء الدورة الشهرية؟** 64
ما هي الدورة الشهرية؟ · متلازمة ما قبل الدورة (PMS) · الدورة والشهية · الهرمونات المتحكّمة في الدورة

16 **الأسئلة الشائعة** 71
أسئلة عن التمرين · أسئلة عن الألم والإصابات · أسئلة عن التغذية حول التمرين · أسئلة عن متابعة التقدّم

17 **أدوات التطبيق** 78
حساب الاحتياج · خطة الأسبوع · سجل التمرين · متابعة التقدّم

18 **الخاتمة** 83
شكرًا لك · مصادر لتتعلّم أكثر · مراجع علمية مختارة

الفصل الأول

01 الهدف من الكتيّب

لماذا كُتب هذا الكتيّب، ومن هي المدرّبة التي تقف خلفه.

1.1 الهدف

يهدف هذا الكتيّب إلى تقديم مرجع شامل ومتكامل عن عالم التمارين الرياضية وأسلوب الحياة الصحي، من خلال الدمج بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي بأسلوب سهل وممتع. ويسعى إلى تمكين القارئ من فهم أساسيات التمرين وعلاقتها الوثيقة بالصحة واللياقة، مع إرشادات عملية وخطوات واضحة تسهّل إدماج النشاط البدني المنتظم في الروتين اليومي.

ومن خلال الجمع بين المعلومات الموثوقة وخطط التمارين المجرّبة والنصائح المبسّطة، يساعد الكتيّب قرّاءه على بناء أسلوب حياة صحي ومستدام، وتحقيق أهدافهم البدنية دون الوقوع في فخ البرامج القاسية أو الروتين الممل.

1.2 خلفية المدرّبة وخبراتها

بدأتُ رحلتي في عالم الصحة واللياقة بعد أن أدركتُ الأثر العميق للعادات الغذائية والرياضية على جودة حياتنا. كانت البداية مع كرة السلة لاعبةً وقائدةً لفريق الجامعة (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، ثم في تدريب زميلاتي على أساسيات اللعبة. ومع مرور السنوات نما شغفي باللياقة من خلال القراءة والاطلاع المستمر على أحدث الدراسات العلمية، إضافةً إلى الممارسة العملية التي ساعدتني على بناء أسلوب تدريب فعّال ومرن في آنٍ واحد؛ وذلك بعد أن بدأتُ في هذا المجال وأنا لا أميّز حتى بين عضلتَي الباي والتراي!

1. العمل الميداني والخبرة العملية

عملتُ مدرّبةً شخصية في نادي «بيور جم»، وأشرفتُ على تدريب كثير من المشتركات وفق خطط مدروسة ومتابعة شخصية. تعاملتُ مع شرائح عمرية مختلفة وأهداف متنوعة: من خسارة الوزن، إلى التمرين بعد إصابات الركبة والظهر بالتنسيق مع المختصين، وصولًا إلى بناء الكتلة العضلية وتحسين اللياقة العامة. هذا التنوّع منحني فهمًا أعمق للتحديات التي قد يواجهها كل شخص، وعلّمني طرقًا

متعددة لإيجاد الحلول المناسبة.

2. الاعتمادات والشهادات

أحرص دائمًا على تعزيز معرفتي بالعلم الحديث، ومن الشهادات والاعتمادات التي حصلتُ عليها:

- ماجستير في التدريب الرياضي — جامعة ستيرلنق (University of Stirling).
- مدرّبة معتمدة في السجل السعودي لمحترفي اللياقة البدنية (Saudi REPs — Level 4).
- رخصة مهنية للمدرّب الشخصي — المستوى الثالث.
- مدرّب شخصي — المستوى الرابع (NCSF Personal Trainer Level 4).
- مدرّب شخصي — المستوى الثالث، وشهادة تدريب اللياقة قبل الولادة — أكاديمية أسباير (Aspire Academy).
- شهادة المدرّب الشخصي من برنامج الباحث مينو هنسلمانز (Menno Henselmans CPT).
- شهادة في الحركة الوظيفية (Functional Mobility).
- شهادة تغذية رياضية — الجمعية الدولية لعلوم الرياضة (ISSA).

3. الإنجازات

من أبرز إنجازاتي المهنية حصولي على جائزة المدرّب الأول في «بيور جم» على مستوى المنطقة الشرقية، والمركز الثاني على مستوى المملكة في التدريب الشخصي. وتعكس هذه الجوائز حرصي على مواكبة التطوّرات العلمية وترجمتها إلى أساليب تدريب عملية تساعد كل متدرّب ومتدرّبة على تحقيق أهدافهم بفاعلية.

4. تجارب التدريب الحضوري والأونلاين

درّبتُ ما يقارب 1800 جلسة تدريب حضوري، إضافةً إلى التدريب عن بُعد الذي يتيح متابعة الأداء وتقييمه أسبوعيًا لمن لا تتاح لهم فرصة الحضور. وقد تجاوز عدد المشتركين الذين تعاملتُ معهم 600 مشترك ومشتركة في سنة واحدة، مما أكسبني خبرة عميقة في التدريب بحسب الفروق الفردية والأهداف المتنوعة.

5. المنهج العلمي والإنساني

أعتمد في أسلوبي على مزيج من المنهج العلمي والمرونة الشخصية؛ أتابع الأبحاث الحديثة في مجالَي التغذية والرياضة، وأطبّقها بما يتناسب مع ظروف الحياة اليومية لكل فرد. كما أؤمن بدور الدعم

النفسي والتواصل البنّاء في تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة، فالعوامل النفسية لا تقل أهمية عن البدنية في مسيرة أي شخص نحو حياة أفضل.

وآمل من خلال هذا الكتيّب أن أشارك ما تعلّمته على مدار سنوات من الخبرة الميدانية والدراسة، بأسلوب بسيط وعملي. ستجد في ثنايا المحتوى مسارًا تدريبيًا متكاملًا، مبنيًا على أسس علمية، وقابلًا للتكيّف مع متطلبات نمط حياتك وأهدافك الشخصية.

الفصل الثاني

02 المصطلحات المهمة

قاموس مختصر للمصطلحات التي ستتكرر في جدولك وفي هذا الكتيّب.


قاموس المصطلحات

المصطلح	الشرح
Set	الجولة أو المجموعة: عدد من التكرارات المتتالية تليها راحة.
Rep	العدّة أو التكرار: أداء الحركة مرة واحدة كاملة.
Volume	حجم التمرين: إجمالي العمل، ويُقاس غالبًا بعدد الجولات الصعبة لكل عضلة أسبوعيًا.
Tempo	سرعة أداء التمرين أو إيقاعه في مرحلتَي الرفع والإنزال.
Rest	الراحة بين الجولات.
Concentric	الانقباض بالتقصير (الحركة الإيجابية)، مثل رفع الدمبل في تمرين الباي؛ وهي عادةً المرحلة الأصعب.
Eccentric	الانقباض بالإطالة (الحركة السلبية)، مثل إنزال الدمبل في تمرين الباي؛ تعمل فيها العضلة وهي تطول، ويُنزَل الوزن بتحكّم مع اتجاه الجاذبية.
Isometric	الانقباض الثابت: تعمل العضلة دون تغيّر في طولها ولا حركة في المفصل، مثل تمرين البلانك.
Isolation	تمارين العزل: يتحرك فيها مفصل واحد، مثل Biceps Curl.
Compound	التمارين المركّبة: يتحرك فيها أكثر من مفصل، مثل Squat.
Super Set	أداء تمرينين متتاليين دون راحة بينهما، لنفس العضلة أو لعضلتين مختلفتين.
AMRAP	As Many Reps As Possible: أكبر عدد ممكن من التكرارات بأداء صحيح.
Drop Set	بعد الاقتراب من الفشل العضلي في الجولة الأخيرة، يُخفَّض الوزن مباشرة بنحو 10–30% (غالبًا 15–25%) وتُستكمل التكرارات دون راحة.
Failure	الفشل العضلي: الوصول إلى نقطة لا يمكن عندها أداء تكرار إضافي بأداء صحيح.
1RM	One Repetition Max: أقصى وزن يمكن رفعه لتكرار واحد فقط.
Calories	السعرات الحرارية: وحدة قياس الطاقة في الطعام.
Macros	المغذّيات الكبرى التي يحتاجها الجسم: البروتين، والكربوهيدرات، والدهون.


المصطلح	الشرح
Mechanical Tension	التوتر الميكانيكي: الشدّ الذي تتعرض له العضلة عند مقاومة حمل خارجي، وهو المحفّز الأهم للبناء العضلي.
Metabolic Stress	الإجهاد الأيضي: تراكم نواتج الأيض (مثل اللاكتات وأيونات الهيدروجين) أثناء الجولات الطويلة، ويرتبط بالإحساس بالحرقان (Pump/Burn) أثناء التمرين، لا بألم العضلات في الأيام التالية.
Junk Volume	الحجم التدريبي غير المفيد: جولات إضافية لا تضيف تحفيزًا يُذكر بل تزيد التعب؛ ويُشار عادةً إلى أن تجاوز نحو 10 جولات صعبة للعضلة الواحدة في الجلسة قد يدخل في هذا النطاق.
RIR	Reps in Reserve: عدد التكرارات المتبقية قبل الفشل العضلي؛ مثلًا RIR 5 يعني أنك تستطيع أداء 5 تكرارات إضافية.
RPE	Rate of Perceived Exertion: معدل الجهد المحسوس من 1 إلى 10؛ RPE 1 جهد منخفض جدًا كالمشي الهادئ، وRPE 9 جهد قريب من الأقصى.
Recovery	الاستشفاء: العملية التي تتعافى فيها العضلات والجهاز العصبي بعد التمرين وتتكيّف، وهي جزء أساسي من التقدّم.

أنواع الانقباضات العضلية


كل تكرار في التمرين يمرّ بمرحلتين أو ثلاث، وفهمها يساعدك على التحكّم في الوزن بدل أن يتحكّم بك:



الانقباض بالتقصير
Concentric
تقصر العضلة وهي ترفع الوزن.



الانقباض بالإطالة
Eccentric
تطول العضلة وهي تقاوم الوزن نزولًا.



الانقباض الثابت
Isometric
تعمل العضلة دون حركة في المفصل.

لماذا يهمّك هذا؟

التحكّم في مرحلة الإنزال (Eccentric) بدل إسقاط الوزن يرفع جودة التمرين ويقلّل احتمال الإصابة.

الرسوم: تصميم Nav Coaching خصيصًا لهذا الكتيّب.

الفصل الثالث

03 لماذا أتمرّن؟

فوائد التمرين تبدأ من الذهن قبل الجسد.

التغيير يبدأ من الداخل

- **التغيير يبدأ من الناحية النفسية أولًا، ثم الجسدية.**
- **التغيير البسيط في البداية يضمن الاستمرار.** نحن بشر، ومن الصعب أن نتأقلم مع تغييرات كثيرة دفعة واحدة؛ لذلك فأفضل طريقة هي تغيير العادات السلبية واحدةً تلو الأخرى، حتى الوصول إلى نمط الحياة المناسب والرضا عن نفسك.
- **ذهن أقوى = جسد أقوى.**
- **فكّر في نفسك بعد سنوات:** التمرين المنتظم استثمار يساعدك على الحفاظ على قوتك ولياقتك واستقلاليتك مع التقدّم في العمر.

الفوائد النفسية

- تعلّمك الرياضة الالتزام واحترام الذات، وهذا يعزّز ثقتك بنفسك وحضورك الاجتماعي.
- تساعد على تقليل التوتر وأعراض الاكتئاب وصفاء الذهن، ويصبح لديك هدف أسبوعي يحفّزك ويمنحك لذة الإنجاز.
- تساعدك على ترتيب يومك والتزاماتك أولًا بأول، فتترتب أولوياتك.
- تعوّد النفس على الصبر، وأن لكل شيء وقته.
- ترفع تقدير الذات.

الفوائد الجسدية

- تحسّن كبير في القوة البدنية يسهّل أداء المهام اليومية الشاقة.
- تحسّن في اللياقة القلبية، فيصبح صعود الدرج أو المشي لفترات طويلة أسهل وبتعب أقل.
- كثير من الآلام الشائعة المرتبطة بضعف العضلات وقلة الحركة قد تتحسّن مع تقوية العضلات ويتحسّن القوام بإذن الله، ويبقى تقييم المختص ضروريًا عند الألم المستمر.
- مع ازدياد قوة الجسم يقل الخمول والكسل ويزيد النشاط.
- مع التغذية المناسبة: إبراز ملامح العضلات وتقليل الدهون الزائدة.

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ اكتب سببك الشخصي للتمرين في سطر واحد، وضعه في مكان تراه يوميًا.
- ✓ اختر عادة واحدة فقط لتغييرها هذا الأسبوع، لا خمس عادات.
- ✓ قِس نجاحك بالالتزام والقوة والطاقة، لا بالميزان وحده.

الفصل الرابع

تصحيح مفاهيم خاطئة

04

كثيرًا ما نسمع معلومات من غير المختصين في الرياضة أو التغذية، وقد تُبعد بعضنا عن التمرين. إليك أشهرها وتصحيحها.

أشهر المعتقدات وتصحيحها

01

«إذا توقفتُ عن التمرين تتحوّل العضلات إلى دهون.»

الصحيح: العضلات والدهون نسيجان مختلفان تمامًا، ولا يتحوّل أحدهما إلى الآخر. ما يحدث عند التوقف أن الكتلة العضلية قد تقل تدريجيًا، وإذا لم تنخفض السعرات المتناولة قد تزيد الدهون، فيبدو الأمر كأنه «تحوّل».

02

«المرأة إذا رفعت الأثقال تصبح عضلاتها ضخمة مثل الرجال.»

الصحيح: مستوى هرمون التستوستيرون لدى النساء أقل بكثير منه لدى الرجال، لذلك يصعب جدًا الوصول إلى هذه الضخامة دون سنوات من التدريب المتخصص والتغذية الموجّهة لذلك أو استخدام هرمونات. النتيجة المعتادة: جسم أقوى وأكثر تناسقًا.

03

«تمارين البطن تحرق دهون البطن.»

الصحيح: لا يمكن حرق الدهون من منطقة محددة بالتمرين. لدينا جميعًا عضلات بطن (Six pack)، لكن تغطيها طبقة من الدهون، وظهورها يحتاج إلى خفض نسبة الدهون عمومًا عبر نظام غذائي بعجز معتدل في السعرات مع النشاط. وينطبق ذلك على باقي أجزاء الجسم.

04 «تمارين الخصر تنحت الخصر.»

الصحيح: تمارين العضلات الجانبية (المائلة) تقوّيها وقد تزيد حجمها قليلًا، ولا تُذيب الدهون فوقها. مظهر الخصر يتأثر أساسًا بنسبة الدهون، وبتوازن عرض الظهر والأرداف. الهدف الأول من التمارين هو تقوية العضلات، والعضلات القوية تشدّ المنطقة وتحسّن مظهرها.

05 «الأكل قبل النوم يزيد دهون البطن.»

الصحيح: العبرة بإجمالي ما تأكله خلال اليوم، لا بتوقيت الوجبة. لكن يُفضّل تجنّب وجبة كبيرة قبل النوم مباشرة لأنها قد تؤثر على جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

06 «يجب تناول البروتين مباشرة بعد التمرين وإلا ضاعت الفائدة.»

الصحيح: الأهم هو إجمالي البروتين اليومي وتوزيعه على الوجبات. يُنصح بتناول وجبة متكاملة تحتوي على بروتين خلال ساعات قليلة بعد التمرين (ويُفضّل خلال نحو ساعتين، خاصة إذا تمرّنت دون أكل قبلها)، ولا داعي للقلق إذا تأخرت قليلًا.

07 «الملح غير مفيد للجسم.»

الصحيح: الصوديوم معدن ضروري لوظائف الأعصاب والعضلات وتوازن السوائل، وإلغاؤه تمامًا خطأ. المطلوب الاعتدال؛ إذ توصي منظمة الصحة العالمية البالغين بألا يتجاوز الملح 5 غرامات يوميًا، وقد يحتاج من يتعرّق كثيرًا إلى تعويض أكبر.

08 «الأكل العضوي مفيد أكثر من الأكل العادي.»

الصحيح: الفروق الغذائية بين المنتجات العضوية والتقليدية صغيرة غالبًا، والعضوي لا «ينحّف» ولا يعوّض عن نظام غذائي غير متوازن. قد يكون خيارًا شخصيًا لأسباب أخرى، لكن لا داعي لدفع مبالغ إضافية بحجة أنه أفضل لخسارة الوزن أو للصحة بشكل ملحوظ.

09 «أكل الدهون يرفع نسبة الدهون في الجسم، فالأفضل قطعها تمامًا.»

الصحيح: الدهون الصحية مهمة جدًا: تدخل في بناء الخلايا، وهي مصدر للطاقة، وتساعد على امتصاص الفيتامينات (A Dg Eg Kg)، وتكوين الهرمونات، وتنظيم الحرارة، ودعم المناعة وصحة الدماغ. يُنصح بأن تشكّل نحو 20–35% من السعرات اليومية، وانخفاضها عن 20% لفترات طويلة قد يضر بالصحة الهرمونية.

10 **«التجويع والحرمان أسرع حل لنزول الوزن.»**

الصحيح: صحيح أن الرقم على الميزان ينزل، لكن الثمن كبير: خسارة جزء من الكتلة العضلية، ونقص الفيتامينات المهمة، وانخفاض الطاقة والمزاج، وترهّل الجسم، وصعوبة الاستمرار والعودة السريعة للوزن. الأفضل اتباع نظام غذائي مناسب لاحتياج جسمك بعجز معتدل.

11 **«النظام الغذائي الصحي يعني قطع المطاعم والأكل المفضّل.»**

الصحيح: النظام الصحي لا يحرمك من أكلك المعتاد؛ إنما هو إدارة ذكية للسعرات. يمكن الالتزام بنحو 80% من الأكل المغذّي، وترك نحو 20% لما تحبه ضمن سعراتك.

12 **«اقطع الكارب تمامًا لأنه أساس المشكلة.»**

الصحيح: الكربوهيدرات مصدر طاقة رئيسي للجسم، خصوصًا للتمرين، وقطعها تمامًا ليس ضروريًا لخسارة الدهون. المهم الكمية ضمن سعراتك، واختيار المصادر الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضار والفواكه.

13 **«خل التفاح يساعد على الحرق.»**

الصحيح: الأدلة على أن خل التفاح يسرّع خسارة الدهون ضعيفة ومحدودة، ولا علاقة له بمعدل الحرق بشكل يُذكر. قد يفضّله بعض الأشخاص هضميًا، لكنه لا يغني عن العجز في السعرات، ويُستخدم مخففًا لحماية الأسنان والمعدة.

14 **«الكيتو أفضل نظام لنزول الدهون.»**

الصحيح: عند تساوي السعرات والبروتين تكون نتائج خسارة الدهون متقاربة بين الأنظمة المختلفة. الكيتو خيار يناسب بعض الأشخاص، لكن تطبيقه بطريقة خاطئة قد يسبب مشكلات أنت في غنى عنها؛ ويُستشار المختص قبل اتباعه، خاصة مع وجود حالة صحية.

15 **«يجب أداء تمرين جديد كل يوم.»**

الصحيح: تغيير التمارين يوميًا غير مفيد وقد يعطي نتيجة عكسية؛ فالجسم يحتاج إلى تكرار التمرين حتى يتكيّف ويتقدّم فيه. يكون التغيير بحسب تقدّمك، وغالبًا كل عدة أشهر (مثل 3–6 أشهر)، مع مراقبة التطوّر تدريجيًا.

16 **«الكارديو للتنحيف، وتمارين الحديد غير مهمة.»**

الصحيح: الكارديو مهم للياقة القلبية والصحة العامة، لكن تمارين المقاومة مهمة جدًا أيضًا لخسارة الدهون؛ فهي تحافظ على الكتلة العضلية أثناء العجز وتحسّن شكل الجسم وقوته. وزيادة الكتلة العضلية ترفع معدل الحرق اليومي بدرجة بسيطة لكنها مفيدة على المدى البعيد.

17 **«مشدّ الرياضة يستهدف البطن ويحرق دهونه.»**

الصحيح: لا يوجد جهاز أو مشدّ يستهدف دهونًا محددة ويحرقها؛ ما يفقده الجسم تحت المشدّ هو ماء بسبب التعرّق، ويعود بمجرد الشرب.

18 **«كلما تعرّقت أكثر في التمرين حرقت أكثر.»**

الصحيح: لو كان كذلك لكفى الوقوف تحت الشمس! التعرّق وسيلة الجسم لتنظيم حرارته، ويختلف بين الأشخاص. لا العرق ولا التعب ولا الألم هي ما يحدد جودة التمرين؛ فقد تتمرّن دون تعب واضح وجسمك يحرق ويبني عضلًا، والألم لم يكن يومًا مقياسًا لجودة التمارين.

19 **«تمارين الخفسات (Hip dips) تزيل الخفسات.»**

الصحيح: شكل الخفسات يعتمد كثيرًا على بنية عظام الحوض وتوزيع الدهون الوراثي، وهي ليست عيبًا. تقوية عضلات الأرداف قد تحسّن مظهر المنطقة وتملأ الفراغ جزئيًا، وخفض الدهون عمومًا يساعد أيضًا، لكن لا يوجد تمرين يلغيها تمامًا.

20 **«الإحماء غير مهم.»**

الصحيح: الإحماء يجهّز العضلات والمفاصل والجهاز العصبي للمجهود، ويُعد إهماله من العوامل التي قد تزيد احتمال الإصابة وتقلّل الأداء. (التفاصيل في فصل «نقاط مهمة»).

21 **«تمارين كثيرة في اليوم = نتيجة أسرع.»**

الصحيح: بالعكس؛ الإفراط في التمرين قد يوصلك إلى مرحلة الإجهاد التدريبي (Overtraining): ثبات في الأوزان، وإجهاد وإعياء مستمر، وأحيانًا إصابات لا سمح الله. التقدّم يحدث أثناء الاستشفاء، لا أثناء التمرين فقط.

22 **«أيام الراحة لا تهم فيها جودة الأكل.»**

الصحيح: الهدف من أيام الراحة هو الاستشفاء التام للعضلات والجهاز العصبي، والتغذية الجيدة جزء أساسي من ذلك. إهمال هذه الأيام يبطئ الوصول إلى هدفك.

23 **«المكسرات تسمّن.»**

الصحيح: لا يوجد طعام يسمّن أو ينحّف بذاته؛ هناك كمية تزيد الوزن وكمية تناسب هدفك. المكسرات مفيدة وغنية بالدهون الصحية، لكنها عالية السعرات، فالاعتدال في الكمية هو ما يحدد.

24 **«أقلّل وقت الراحة حتى لا «تبرد» العضلة.»**

الصحيح: العضلة لا تبرد بين الجولات. خذ راحتك واسترجع طاقتك لتكمل الجولة التالية بجودة، بشرط أن تعود نبضات قلبك إلى مستوى قريب من الطبيعي. وغالبًا تكون الراحة بين 1–3 دقائق للتمارين الأساسية (التفاصيل في فصل «نقاط مهمة»).

25 **«شرب البروتين شيك قبل التمرين يتعارض مع هدف التمرين.»**

الصحيح: هذا غير صحيح؛ التمرين يحفّز العضلة، والبروتين يزوّدها بما تحتاجه للبناء والاستشفاء، وتناوله قبل التمرين أو بعده كلاهما مناسب. الأهم هو إجمالي البروتين اليومي، مع وجود مصدر طاقة مناسب قبل التمرين بفترة كافية.

26 **«الكارديو الشديد قبل الحديد أفضل.»**

الصحيح: يناسب ذلك من هدفه الأساسي التحمّل، لكن لمن هدفه بناء العضلات وتحسين القوة، الأفضل أداء الكارديو بعد تمارين المقاومة أو في وقت منفصل؛ للحفاظ على مخزون الطاقة لتمارين الأوزان التي تتطلب جهدًا كبيرًا.

27 **«الليمون مع الماء يحرق سعرات أكثر.»**

الصحيح: لا يوجد مشروب يحرق السعرات بشكل يُذكر؛ الليمون مجرد منكّه، ويمكن الاستمتاع به لزيادة شرب الماء.

28 **«شرب الماء أثناء التمرين غير مفيد.»**

الصحيح: شرب الماء مهم جدًا أثناء التمرين؛ فالجسم يفقد مع التعرّق كمية من الماء والأملاح، والجفاف من الأسباب الشائعة للدوخة وانخفاض الأداء. اشرب رشفات منتظمة خلال الجلسة.

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ لا تبحث عن تمرين «يحرق» منطقة معيّنة؛ خسارة الدهون تأتي من العجز في السعرات.
- ✓ لا تقطع مجموعة غذائية كاملة؛ اضبط الكمية بدلًا من ذلك.
- ✓ لا تقِس جودة تمرينك بالعرق أو الألم، بل بالتطوّر في أوزانك وتكراراتك.

الفصل الخامس

05 نقاط مهمة

تفاصيل صغيرة تصنع الفرق في جودة تمرينك واستمرارك.

جودة التمرين تعتمد على النوم والتغذية

مهما كانت جودة وجبة ما قبل التمرين، فإن النوم والأكل المتراكمين على مدار الأسبوع لهما تأثير قوي على جودة التمرين. ستمرّ بأيام يكون فيها التمرين ممتازًا والأوزان خفيفة، وأيام أخرى بالأوزان نفسها لكنها ثقيلة عليك، أو تشعر فيها بانخفاض الطاقة؛ وغالبًا ما يرجع ذلك إلى تغذيتك وجودة نومك. لذلك أرجو الاهتمام بهذا الجانب: لصحتك أولًا، ولتمارينك ثانيًا.

الراحة السلبية مهمة جدًا للاستشفاء

النوم أولًا: تتمثّل الراحة السلبية أولًا في النوم، ويُنصح البالغون بنحو 7–9 ساعات متواصلة لضمان عمقه؛ فالنوم مهم جدًا للاستشفاء العضلي.

التحكّم في التوتر وضغوط الحياة: من الأفضل عدم إهمال هذا الجانب. إذا مررت بضغط في العمل أو الدراسة أو أي ظرف آخر، فمن المهم تقليل حجم التدريب تفاديًا للإصابات، والتركيز على الاستشفاء التام.

للمتدرّبين معي

شاركني موضوع الضغوطات لأعدّل لك حجم التدريب بالطريقة المناسبة، بحيث لا تضغط على نفسك ولا تقلّل بدرجة مبالغ فيها. أنا معك لمساعدتك، والرياضة موجودة لمساعدتنا على تخطّي عقبات الحياة.

أهمية الإحماء (Warm Up)

تكمن أهمية الإحماء في تنشيط الجسم وتهيئته للمجهود القادم، وتقليل احتمال الإصابات. وهو نوعان: إحماء عام وإحماء خاص.

الإحماء العام — اختياري

ممارسة أي نشاط منخفض الشدة لمدة 5–15 دقيقة تقريبًا، والغرض منه رفع حرارة الجسم ونبضات القلب. أنا شخصيًا يكفيني 8 دقائق على جهاز الأوبتكال (الإهليجي) حتى أشعر أن جسمي احترّ وتدفّق الدم إلى عضلاتي وارتفعت نبضات قلبي؛ وفي النهاية الأمر يرجع لما يريحك.

الإحماء الخاص — أساسي

هو تهيئة للعضلات التي ستتمرّن عليها في ذلك اليوم: جولة أو جولتان من التمرين نفسه بوزن أخف، بنحو 50–75% من وزن تمرينك الأساسي.

> **مثال**
>
> في تمرين Bench Press إذا كان وزنك المعتاد 30 كيلو: الجولة الأولى للإحماء 15 كيلو، والثانية 22 كيلو، ثم تبدأ جولاتك الأساسية.

ماذا عن الإطالات الثابتة قبل التمرين؟

الإطالات الثابتة الطويلة (أكثر من نحو 60 ثانية للعضلة الواحدة) قبل التمرين مباشرة قد تقلّل القوة والأداء مؤقتًا، لذلك يُفضّل الاعتماد قبل التمرين على الإحماء الحركي. أما الإطالات القصيرة فتأثيرها بسيط، والإطالات الثابتة بعد التمرين تُؤدّى إذا رغبت بها.

أهمية التهدئة (Cool Down)

مثل الإحماء، تكمن أهميتها في إعادة الجسم تدريجيًا إلى حالته الطبيعية بعد المجهود. الإحماء والتهدئة عمودان أساسيان لا تقل أهميتهما عن التمرين نفسه.

- 5–15 دقيقة مشي خفيف على السير بعد التمرين تُعد كافية جدًا.
- الإطالات الثابتة ليست ضرورية، ويمكن الاستغناء عنها.

الراحة بين الجولات

الهدف من الراحة بين الجولات هو استعادة مصادر الطاقة السريعة (ATP وCP)، وإراحة الجهازين التنفسي والعصبي والذهن أيضًا. ويختلف الوقت اللازم من شخص لآخر ومن تمرين لآخر، ويمكن تحديده من خلال:

1. **كمية الجهد في الجولة:** إذا شعرت أنك تستطيع أداء 5 تكرارات إضافية بجودة، فقد انتهى وقت الراحة ويمكنك البدء.
2. **نوع التمرين:** التمارين المركّبة تحتاج وقتًا أطول من تمارين العزل، لأنها تستهدف عضلات أكثر ومفاصل أكثر.
3. **نبضات القلب:** إذا عادت نبضات قلبك إلى معدلها الطبيعي أو قريبة منه، فقد انتهى وقت الراحة.
4. **هدفك من التمرين:** للتحمّل العضلي يكون وقت الراحة أقل، ولبناء العضلات أو القوة تحتاج وقتًا أطول.

القاعدة العامة

تتراوح الراحة غالبًا بين 30 ثانية و5 دقائق: نحو 1–3 دقائق لمعظم تمارين البناء العضلي، وقد تصل إلى 3–5 دقائق في التمارين المركّبة الثقيلة. استمع لجسدك، ولا تبدأ الجولة التالية إلا بعد أن تتأكد أنك مستعد جسديًا وذهنيًا.

طريقة التنفّس الصحيحة أثناء التمرين

كثيرون يجهلون هذا الموضوع أو يظنون أنه قليل الأهمية في التمارين. القاعدة العامة: **شهيق** في الجزء **السهل** من الحركة، و**زفير** خلال الجزء **الصعب** منها.

1. خذ نفسًا **عميقًا** قبل البدء بالتكرار، وشدّ عضلات بطنك.
2. مع حركة رفع الوزن أخرج الهواء تدريجيًا عن طريق الفم، ولا تكتم نفَسك طوال وقت الرفع.
3. خذ شهيقًا عند إنزال الوزن، ولا بأس أن يكون من الفم أو الأنف.
4. كرّر العملية مع كل تكرار.

تنبيه

حبس النفس أثناء الرفع الثقيل يرفع ضغط الدم مؤقتًا، لذلك يُتجنّب لمن لديهم ارتفاع في ضغط الدم أو أمراض القلب أو أثناء الحمل، ويُستشار الطبيب عند وجود أي حالة صحية.

◂ شاهد فيديو شرح التنفّس الصحيح أثناء التمرين

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ نَم 7–9 ساعات، وخفّف حجم التمرين في فترات الضغط.
- ✓ ابدأ كل تمرين أساسي بجولة أو جولتين إحماء بوزن أخف.
- ✓ خذ راحة بين الجولات تكفي لتبدأ التالية بجودة، غالبًا 1–3 دقائق.
- ✓ ازفر مع الجزء الصعب من الحركة، ولا تحبس نفَسك إن كان ضغطك مرتفعًا.

الفصل السادس

06 العدّات والأوزان ومقاييس الجهد

كيف تعرف أن الوزن مناسب، وكم تكرارًا يجب أن يتبقّى لديك.

علاقة الفشل العضلي بالعدّات

الهدف في التمارين أن تقترب من الفشل العضلي دون الوصول إليه في أغلب الجولات، بحيث يتبقّى لديك من 1 إلى 4 تكرارات.

مثال

إذا كان مسجّلًا في جدولك 10 تكرارات لتمرين الباي بالدمبل، ووصلت إلى التكرار العاشر وما زلت قادرًا على أداء 6 تكرارات إضافية، فأمامك خياران لضمان **جودة التمرين**:

1. تزيد الوزن **كيلو واحدًا** أو إلى وزن تشعر فيه بصعوبة يمكن التحكّم بها حتى تصل إلى 10 تكرارات.
2. تكمل 2–3 تكرارات إضافية بالوزن نفسه، بحيث يصبح المتبقّي لديك 2–3 تكرارات فقط.

بهذا تفهم أن عدد التكرارات المتبقية أمر **تقديري**، ويحدّده إحساسك بكم تكرارًا يفصلك عن الفشل العضلي، مع ترك مسافة 1–4 تكرارات بينك وبينه.

الوزن المناسب لك


كيف تعرف إن كان الوزن مناسبًا لك أم لا؟ ببساطة، نقسّم الأمر إلى أربع حالات:

ما تشعر به	ماذا يعني؟
تستطيع أداء **15 تكرارًا أو أكثر** بسهولة	الوزن خفيف جدًا.
تبدأ بالشعور بالثقل عند التكرار **الثامن** تقريبًا	هذا هو الوزن المطلوب، ومناسب للتمارين التي تتطلب 8–12 تكرارًا.
تشعر بثقل شديد عند التكرار **الثالث**	الوزن ثقيل جدًا لهذا النطاق.
تستطيع أداء **تكرار واحد فقط**	هذا أقصى حد لك، ويسمى 1RM.

مقياسا RPE وRIR

وُجد هذان المقياسان لتسهيل معرفة التكرارات المتبقية قبل الفشل العضلي (مخزون التكرارات)، وعلى أساسهما تُحدَّد شدة التمرين، وتُقسَّم على النحو التالي:

RIR Reps in Reserve	الوصف العام	RPE Rate of Perceived Exertion
6 أو أكثر	سهل للغاية، مجهود منخفض جدًا	1–4
5	سهل نسبيًا، يمكنك الاستمرار طويلًا	5
4	متوسط إلى خفيف، مع تعب بسيط	6
3	متوسط، تعب واضح لكنه محتمل	7
2	مجهود عالٍ، لكن لا تزال لديك قدرة	8
1	مجهود قريب من الأقصى، صعوبة كبيرة	9
0 (فشل عضلي)	أقصى مجهود، لا مزيد من التكرارات	10



RPE: الجهد المحسوس — **النطاق المستهدف للبناء: RIR 1–4 · RPE 6–9** — RIR: التكرارات المتبقية

النطاق المستهدف

النطاق الذي نستهدفه في معظم التمارين يكون بين 1 و4 على مقياس RIR (أي بين 6 و9 على مقياس RPE).

نوعا الفشل العضلي

الفشل العضلي ليس شكلًا واحدًا، ومعرفة نوعه تساعدك على تقدير الجهد بدقة وبأمان:

فشل العضلة المستهدفة

- يحدث غالبًا في تمارين العزل والأجهزة الثابتة.
- تتوقف لأن العضلة نفسها لم تعد قادرة على تحريك الوزن، لا لأن نفَسك انقطع أو تعبت عمومًا.
- مثال: جهاز مدّ الركبة أو ثني الذراعين.

فشل الأداء الصحيح

- يحدث في التمارين المركّبة الحرّة، مثل السكوات والديدلفت.
- تشارك فيها عضلات ومفاصل كثيرة، فيختلّ الأداء قبل أن تفشل العضلة المستهدفة.
- بمجرد أن يتغيّر شكل الحركة، اعتبر الجولة منتهية حتى لو استطعت «سرقة» تكرار إضافي.

من هو المبتدئ؟

لا يُقاس المستوى بعدد سنوات التسجيل في النادي، بل بجودة التمرين والالتزام والتطوّر الفعلي في القوة والكتلة العضلية. فقد يتمرّن شخص ثلاث سنوات دون خطة واضحة ويبقى مبتدئًا من الناحية العملية.

والمبتدئ حساس جدًا للتمرين؛ يتطوّر من محفّز بسيط، فلا يحتاج إلى حجم تدريبي كبير ولا إلى الوصول للفشل. الأهم في مرحلته: إتقان الأداء، والانتظام، وإنهاء الجولات بصعوبة واضحة.

كيف تتدرّب على تقدير الجهد؟

تقدير التكرارات المتبقية مهارة تُكتسب بالممارسة. جرّبها بأمان على تمرين عزل على جهاز ثابت:

1. عندما تشعر أن الجولة صارت صعبة، توقّف لحظة وقدّر: «أظن أن لديّ تكرارين فقط» (أي RIR 2).
2. أكمل حتى لا تستطيع أداء تكرار صحيح إضافي، وعُدّ التكرارات التي أكملتها فعليًا.
3. قارن تقديرك بالواقع. إذا كان الفرق تكرارًا واحدًا أو اثنين، فأنت تقدّر جيدًا.

للسلامة

لا تتدرّب على الوصول للفشل في التمارين الحرّة الثقيلة كالسكوات والبنش بريس، إلا بوجود مساعد أو أذرع أمان.

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ أنهِ أغلب جولاتك وقد تبقّى لديك 1–4 تكرارات فقط (RIR 1–4).
- ✓ إذا استطعت 15 تكرارًا بسهولة فالوزن خفيف؛ زده.
- ✓ تدرّب على تقدير الجهد في تمارين الأجهزة الآمنة أولًا.

الفصل السابع

07 كيف تصمّم جدولك الرياضي؟

الأساسيات التي يقوم عليها أي جدول ناجح، مع مثال عملي.

أساسيات تصميم الجدول الرياضي

تُعد جدولة التمارين مجالًا واسعًا يشمل كثيرًا من الأساليب، ويُقصد بها توزيع التمارين وتنظيمها على فترات زمنية محددة (أيام، أو أسابيع، أو أشهر) بهدف تحقيق أفضل النتائج البدنية والعضلية على المدى الطويل. ورغم تنوّع الطرق والبرامج التدريبية، يظل الالتزام بالمبادئ العامة والأنماط الحركية الأساسية العنصر الأهم للحصول على نتائج ثابتة ومستدامة.

1. لا يوجد جدول مثالي

من المهم إدراك أنه لا يوجد جدول مثالي يصلح لجميع الأفراد؛ فالاختلافات الجسدية والوراثية والعمرية ومستويات اللياقة تؤدي دورًا بارزًا في استجابة الجسم للتدريب. ومع ذلك، فإن التركيز على الأساسيات ودمج أنماط الحركة الرئيسية في البرنامج يساعد على تحقيق تقدّم ملحوظ في القوة والكتلة العضلية والمرونة.

2. أهمية الأساسيات في بناء الجدول

تتميز الأساسيات بأنها بسيطة لكنها فعّالة؛ إذ يُوصى بدمج التمارين المركّبة (Compound Movements) مثل القرفصاء (Squat)، والرفعة الميتة (Deadlift)، وتمارين السحب (Pull-ups/Rows)، وتمارين الضغط للصدر (Bench Press)، مع التمارين المعزولة (Isolation Exercises) التي تركّز على مجموعة عضلية واحدة. ويتيح هذا التنويع تحفيزًا أوسع للعضلات ويضمن تطوّرًا متوازنًا.

3. عدد الجولات الأسبوعية الموصى به

وفقًا لعدد من الأبحاث الحديثة، يُعد نطاق 10–20 جولة أسبوعيًا لكل مجموعة عضلية مناسبًا لتحقيق تطوّر عضلي ملحوظ لدى المبتدئين ومتوسطي المستوى، ويمكن للمبتدئ أن يبدأ من الحد

الأدنى. يحقق هذا النطاق توازنًا بين حجم التمرين (Volume) والاستشفاء (Recovery)، مع مراعاة قدرة الجسم على التكيّف تدريجيًا.

مثال مبسّط

إذا قررت تمرين عضلة الصدر بـ 12 جولة أسبوعيًا، يمكنك تقسيمها على يومين:

اليوم الأول: 6 جولات (مثلًا 3 جولات من تمرين الصدر العلوي بالدمبل، و3 جولات من تمرين الصدر المستوي بالدمبل).

اليوم الثاني: 6 جولات أخرى (يمكن تغيير التمارين أو إبقاؤها نفسها مع تعديل الأوزان والتكرارات).

4. توزيع أنماط التمارين

في سياق التدريب للبناء العضلي، تُقسَّم التمارين عمومًا إلى نوعين رئيسيين:

التمارين المركّبة Compound

- تعمل على أكثر من مفصل ومجموعة عضلية معًا.
- تساعد على بناء القوة الشاملة والتناسق العضلي.
- أمثلة: القرفصاء، الرفعة الميتة، تمارين السحب والدفع بالأوزان الحرّة.

التمارين المعزولة Isolation

- تستهدف عضلة واحدة أو مجموعة صغيرة من العضلات.
- تُستخدم عادةً لتعزيز نقاط الضعف أو لإضافة حجم تدريبي على مجموعة محددة.
- أمثلة: تمرين العضلة ذات الرأسين (Biceps Curls)، وتمرين العضلة ثلاثية الرؤوس (Triceps Extensions)، وتمرين عضلات الفخذ الخلفية (Leg Curls).

5. مثال على تقسيم جدول

لدمج هذه التوصيات في جدول أسبوعي، يمكن اعتماد ما يلي:

- **اليوم الأول:** تمارين مركّبة للجزء السفلي (السكوات، الديدلفت) + تمارين معزولة للفخذين.
- **اليوم الثاني:** تمارين مركّبة للجزء العلوي (تمارين الصدر، العقلة أو السحب) + تمارين معزولة للذراعين والأكتاف.
- **اليوم الثالث:** تمرين شامل للجسم، يجمع تمارين للجزء السفلي (السكوات، الهب ثرست) وتمارين للجزء العلوي (صدر، ظهر، أكتاف، وتراي أو باي).

بهذه الطريقة يمكن تغطية احتياج المجموعات العضلية ضمن نطاق 10–20 جولة لكل عضلة أسبوعيًا، دون المساس بجودة التمارين أو فترة التعافي. وستجد أمثلة جاهزة في الفصل الحادي عشر.

تكرار تمرين العضلة في الأسبوع

المقصود عدد المرات التي تمرّن فيها العضلة نفسها خلال الأسبوع. والتوصية العملية: **مرتان على الأقل لكل عضلة أسبوعيًا**، لسببين:

- **جودة الجولات:** كلما تراكم التعب في الجلسة الواحدة قلّت جودة الجولات الأخيرة.
- **حدّ الفائدة في الجلسة:** بعد نحو 6–10 جولات صعبة للعضلة الواحدة في الجلسة، يقلّ التحفيز الإضافي ويزيد التعب فقط.

> **مثال**
>
> إذا كان هدفك 12 جولة أسبوعيًا للفخذ الأمامية، فقسّمها على يومين (6 + 6) أو ثلاثة أيام (4 + 4 + 4) بدل أن تؤديها كلها في يوم واحد.

التقسيم	عدد مرات تمرين كل منطقة أسبوعيًا
جسم كامل × 3 أيام	كل العضلات 3 مرات
علوي / سفلي × 4 أيام	كل العضلات مرتين
جسم كامل × 2 + سفلي × 1	السفلي 3 مرات، والعلوي مرتين
جسم كامل × 2 + علوي × 1	العلوي 3 مرات، والسفلي مرتين

أنماط الحركة: الأساس الذي يُبنى عليه الجدول

بدل حفظ أسماء مئات التمارين، فكّر في **أنماط الحركة**. الجدول المتوازن يغطي هذه الأنماط على مدار الأسبوع، ثم يضيف تمارين عزل لما يحتاج تركيزًا إضافيًا:

النمط	أمثلة	العضلات الأساسية
نمط السكوات	Squat · Leg Press · Hack Squat	الفخذ الأمامية، الأرداف
نمط ثني الورك	Romanian Deadlift · Hip Thrust	الفخذ الخلفية، الأرداف، أسفل الظهر

النمط	أمثلة	العضلات الأساسية
تمرين بساق واحدة	Lunges · Split Squat · Step-ups	الفخذ الأمامية، الأرداف (مع توازن وثبات)
دفع أفقي	Bench Press · DB Press · Push-up	الصدر، الكتف الأمامي، الترايسبس
دفع عمودي	Overhead Press · Shoulder Press	الكتف الأمامي والجانبي، الترايسبس
سحب أفقي	Seated Row · DB Row	أعلى الظهر، اللاتس، الكتف الخلفي، البايسبس
سحب عمودي	Lat Pulldown · Pull-up	اللاتس، البايسبس، الكتف الخلفي

تمارين العزل المفيدة: الكتف الجانبي (لا يأخذ كفايته من تمارين الدفع)، والبايسبس، والترايسبس، والفخذ الأمامية، والفخذ الخلفية، والأرداف، والسمانة. أما الساعد والترابيس والبطن فاختيارية، لأنها تعمل جيدًا ضمن التمارين المركّبة.

ليس كل يوم

لا يلزم أن يحتوي كل يوم تمرين على كل الأنماط. المهم أن تُغطّى جميعها خلال الأسبوع، مثل نمط السكوات في يوم ونمط ثني الورك في يوم آخر.

كيف تحسب جولاتك الأسبوعية؟

طريقة عملية: احسب **جولة كاملة** للعضلة الأساسية في التمرين، و**نصف جولة** للعضلة المساعدة. ثم اجمع لكل عضلة ما أدّته طوال الأسبوع.

مثال

3 جولات من Bench Press (دفع أفقي): 3 جولات للصدر، و1.5 للكتف الأمامي، و1.5 للترايسبس.
4 جولات من Seated Row (سحب أفقي): 4 لأعلى الظهر واللاتس، و2 للبايسبس.

مستواك	البداية المقترحة لكل عضلة أسبوعيًا
لم تتمرّن من قبل	نحو 6 جولات لأول 3–4 أسابيع، ثم 8–10
مبتدئ يتمرّن منذ فترة	8–10 جولات، وتُرفع عند الحاجة
متوسط ومتقدّم	10–20 جولة بحسب الاستجابة والاستشفاء

نطاق التكرارات

كل نطاق من نحو 5 إلى 30 تكرارًا يبني العضل، بشرط أن تكون الجولة قريبة من الفشل. لكن التكرارات العالية جدًا أكثر إرهاقًا وأصعب في تقدير الجهد، لذلك:

- **للقوة:** 1–6 تكرارات بأوزان ثقيلة.
- **للبناء العضلي:** غالبًا 6–10 في التمارين المركّبة، و8–15 في تمارين العزل.
- حاول ألا تتجاوز 4 جولات للتمرين الواحد، وابدأ أول أسبوع من أي جدول جديد بشدة متوسطة.

قوالب جاهزة لتصمّم جدولك

اختر عدد الأيام المناسب لك، ثم املأ كل خانة بتمرين من النمط المطلوب من مكتبة التمارين. نوّع تمارين العزل بين الأيام إن أمكن، وإن كررتها فلا بأس؛ فالاستمرار أهم من التنويع.

4 أيام **علوي / سفلي**

اليوم الأول — سفلي	
1	نمط السكوات
2	تمرين مركّب للأرجل
3	عزل الفخذ الخلفية
4	عزل السمانة

اليوم الثاني — علوي	
1	سحب عمودي
2	دفع عمودي
3	تمرين مركّب اختياري
4	عزل البايسبس
5	عزل الكتف الجانبي

اليوم الثالث — سفلي	
1	نمط ثني الورك
2	تمرين بساق واحدة
3	عزل الفخذ الأمامية
4	عزل اختياري

اليوم الرابع — علوي	
1	سحب أفقي
2	دفع أفقي
3	تمرين مركّب اختياري
4	عزل الترايسبس
5	عزل اختياري

4 أيام **جسم كامل**

اليوم الأول	
1	نمط السكوات أو مركّب للأرجل
2	سحب أفقي
3	عزل الفخذ الخلفية
4	عزل البايسبس

اليوم الثاني	
1	مركّب للأرجل
2	دفع أفقي
3	عزل الفخذ الأمامية
4	عزل الترايسبس

اليوم الثالث	
1	نمط ثني الورك
2	سحب عمودي
3	عزل السمانة
4	تمرين اختياري

اليوم الرابع	
1	مركّب للأرجل (غير تمرين اليوم الأول)
2	دفع عمودي
3	عزل اختياري للأرجل
4	عزل الكتف الجانبي

3 أيام **جسم كامل**

اليوم الأول	
1	نمط السكوات
2	دفع أفقي
3	سحب عمودي
4	مركّب للأرجل
5	عزل الترايسبس

اليوم الثاني	
1	نمط ثني الورك
2	دفع عمودي
3	سحب أفقي
4	تمرين بساق واحدة
5	عزل الكتف الجانبي والبايسبس

اليوم الثالث	
1	مركّب للأرجل
2	دفع أفقي (تمرين مختلف)
3	سحب عمودي
4	عزل الفخذ الخلفية
5	عزل اختياري

تنبيهات عامة

سجّل أوزانك وتكراراتك في كل جلسة. أضف تمرينًا لتقوية الجذع (مثل البلانك) مرة أسبوعيًا على الأقل. وعضلات البطن تعمل في التمارين المركّبة، فإن أحببت عزلها فيكفي 1–3 تمارين أسبوعيًا.

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ مرّن كل عضلة مرتين أسبوعيًا على الأقل.
- ✓ غطِّ أنماط الحركة السبعة خلال الأسبوع، ثم أضف العزل.
- ✓ ابدأ بنحو 6–10 جولات لكل عضلة أسبوعيًا بحسب مستواك.
- ✓ اختر قالبًا من القوالب الثلاثة واملأه من مكتبة التمارين.

الفصل الثامن

08 العضلات ووظائفها

لتستهدف عضلة ما، اجعلها تؤدي وظيفتها. هذا الفصل يربط كل عضلة بحركتها.

القاعدة الذهبية

كل عضلة لها وظيفة، أي حركة تؤديها. ولكي تستهدفها، اختر تمرينًا يجعلها تؤدي هذه الوظيفة ضد مقاومة.

لا يمكن عزل جزء من العضلة عزلًا تامًا، فالعضلات متداخلة وتعمل معًا. لكن زاوية الحركة وموضع الذراع أو الساق يغيّران التركيز. هذه التفاصيل تفيد المستوى المتقدّم ومن لديه نقطة ضعف واضحة، أما المبتدئ فيكفيه إتقان الأنماط الأساسية.

الجزء العلوي

العضلة	وظيفتها	كيف تستهدفها
أعلى ومنتصف الظهر Traps · Rhomboids	تقريب لوحَي الكتف إلى بعضهما وتثبيتهما	السحب الأفقي مع ضمّ لوحَي الكتف في نهاية الحركة
الظهر الجانبي Latissimus Dorsi	سحب الذراع من الأعلى أو الأمام نحو الجسم	السحب العمودي، والسحب الأفقي بمرفق قريب من الجسم
أسفل الظهر Erector Spinae	تثبيت العمود الفقري وفرده	يعمل بما يكفي في السكوات والديدلفت، وعزله اختياري (مثل Back Extension)
الصدر Pectoralis Major	تقريب الذراع نحو منتصف الجسم	الدفع على مقعد مائل للأعلى (الجزء العلوي)، ومستوٍ (الأوسط)، ومائل للأسفل أو الضغط المنحدر (السفلي)
الكتف الأمامي	رفع الذراع للأمام	يعمل كفاية في تمارين الدفع، ولا يحتاج عزلًا غالبًا
الكتف الجانبي	رفع الذراع جانبًا	الرفرفة الجانبية (Lateral Raise)، وهو الأحق بالعزل
الكتف الخلفي	سحب الذراع للخلف وتدويرها للخارج	يعمل في تمارين السحب، ويمكن إضافة Reverse Fly
البايسبس Biceps	ثني المرفق وتدوير الساعد	الرأس الطويل: الذراع خلف الجسم (Incline Curl). الرأس القصير: الذراع أمام الجسم (Preacher Curl)
الترايسبس Triceps	فرد المرفق	الرأس الطويل: الذراع فوق الرأس (Overhead Extension). الرأسان الآخران: الدفع للأسفل (Pushdown)

الجزء السفلي

العضلة	وظيفتها	كيف تستهدفها
الفخذ الأمامية Quadriceps	فرد الركبة	السكوات، ودفع الأرجل، والطعنات، ومدّ الركبة
الفخذ الخلفية Hamstrings	ثني الركبة وفرد الورك	ثني الركبة (Leg Curl)، والرفعة الرومانية (RDL)
الألوية الكبرى Gluteus Maximus	فرد الورك	دفع الورك، والرفعة الرومانية، والسكوات العميق، والطعنات
الألوية الوسطى والصغرى Gluteus Medius · Minimus	إبعاد الفخذ جانبًا وتثبيت الحوض	جهاز فتح الفخذين (Hip Abduction)، والتمارين بساق واحدة
السمانة Gastrocnemius · Soleus	رفع الكعب	وقوفًا والركبة ممدودة (Gastrocnemius)، وجلوسًا والركبة مثنية (Soleus)

كيف تستفيد عمليًا؟

إذا شعرت أن عضلة ما لا تتطوّر، فارجع لهذا الجدول، وتأكّد أن جدولك يتضمن تمرينًا يجعلها تؤدي وظيفتها، بمدى حركي كامل وجهد كافٍ.

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ لتستهدف عضلة، اختر تمرينًا يجعلها تؤدي وظيفتها.
- ✓ إذا تأخرت عضلة ما، فتأكد أن جدولك يتضمن حركتها الأساسية بمدى كامل.

الفصل التاسع

09 التطوّر والاستشفاء

كيف تستمر في التقدّم دون إرهاق: الزيادة التدريجية، والاستشفاء، وأسابيع التخفيف، والنشاط اليومي.

الزيادة التدريجية

الجسم يتكيّف مع ما يُطلب منه. إذا بقي الحمل نفسه شهورًا، فلن يجد الجسم سببًا للتطوّر.

الزيادة التدريجية تعني رفع المتطلبات شيئًا فشيئًا. ومع تقدّم مستواك تصبح أبطأ وأصعب، وهذا طبيعي. وتذكّر أن التطوّر لا يقتصر على الأرقام؛ فتحسّن الأداء والتحكّم بالوزن تطوّر أيضًا.

الطريقة الأساسية: الزيادة المزدوجة

1. حدّد نطاق تكرارات للتمرين، مثل 8–10.
2. ابدأ بوزن تنهي به الجولات عند نحو 8 تكرارات بصعوبة.
3. حاول في كل جلسة زيادة تكرار واحد، حتى تصل إلى 10 تكرارات في كل الجولات.
4. عندها ارفع الوزن قليلًا، فتعود غالبًا إلى 8 تكرارات، وتبدأ الدورة من جديد.

ماذا لو انخفضت التكرارات كثيرًا مع الوزن الجديد؟

إذا نزلت مثلًا إلى 4–5 تكرارات، فارجع للوزن السابق واستمر في زيادة التكرارات، حتى لو تجاوزت الحد الأعلى قليلًا، ثم جرّب الزيادة مرة أخرى. وهذا شائع في تمارين العزل التي تكون فيها قفزات الأوزان كبيرة.

طرق أخرى للزيادة

- **زيادة الوزن:** الأنسب غالبًا للتمارين المركّبة.
- **زيادة التكرارات:** الأنسب غالبًا لتمارين العزل.
- **زيادة الجولات:** تُستخدم بحذر، وغالبًا للمستويات المتقدّمة، لأنها ترفع التعب بسرعة.

الاستشفاء

الاستشفاء هو ما يحدث بين الجلسات: إصلاح الأنسجة، وتكيّف الجهاز العصبي، وبناء العضل فعليًا. وهو لا يُقاس بعدد ساعات ثابت؛ فعبارة «الأرجل تحتاج 48 ساعة» تبسيط مخلّ. ما يحدّد قدرتك على الاستشفاء هو حجم الجهد ومدى ملاءمته لظروفك.

> **مثال**
>
> 12 جولة أسبوعيًا للأرجل يمكن تقسيمها على يومين (6 + 6) أو على أربعة أيام (3 جولات يوميًا). في الحالتين يستشفي الجسم، لأن الجهد في كل جلسة مناسب.

أهم العوامل المؤثرة

الحجم التدريبي إذا تراجع أداؤك من جلسة لأخرى، أو استمرت آلام المفاصل، أو اضطرب نومك وشهيتك، أو فقدت حماسك، فقد يكون الحجم أكبر من قدرتك الحالية.

النوم هو أقوى أدوات الاستشفاء (التفاصيل أدناه).

التغذية سعرات وبروتين كافيان. والعجز الكبير في السعرات يضعف الاستشفاء، فالأفضل ألا يتجاوز نحو 20–25% أغلب الوقت.

الضغوط الجسم لا يفرّق بين ضغط التمرين وضغط الحياة؛ في فترات الامتحانات أو العمل المرهق خفّف الحجم مؤقتًا، واطلب مساعدة مختص إذا كان التوتر مرتفعًا ومستمرًا.

نصائح لنوم أعمق

- أوقف الكافيين قبل النوم بنحو 6–8 ساعات؛ حتى لو استطعت النوم بعده، فقد تقلّ جودة نومك.
- ثبّت موعد نومك واستيقاظك قدر الإمكان، بفارق لا يتجاوز ساعة إلى ساعتين.
- خفّف الإضاءة والشاشات قبل النوم بنصف ساعة على الأقل، واجعل الغرفة مظلمة وهادئة وباردة نسبيًا.
- استخدم السرير للنوم فقط قدر الإمكان، وابتعد عن مصادر التوتر قبل النوم.

أسبوع التخفيف (Deload)

هو أسبوع تخفّف فيه الحمل التدريبي عمدًا، ليرتاح الجسم والجهاز العصبي ثم يعود أقوى.

تخفيف مُخطّط

- يُحدَّد مسبقًا، مثل 4–8 أسابيع تمرين ثم أسبوع تخفيف.
- يناسب المستويات المتوسطة والمتقدّمة.

تخفيف عند الحاجة

- عند تعب مرتفع مستمر أو فقدان الحماس.
- عند تراجع الأداء أو توقّف التطوّر لأكثر من 3–4 أسابيع.
- عند آلام المفاصل.

كيف تطبّقه؟

- قلّل عدد الجولات إلى النصف تقريبًا، مع الحفاظ على الأوزان، **أو**
- قلّل الأوزان والجهد (ابتعد عن الفشل بـ 4–5 تكرارات) مع الحفاظ على الجولات.
- يمكنك الدمج بينهما، أو تخفيف تمرين واحد فقط إذا كان هو مصدر التعب.

المبتدئ يحتاج التخفيف أقل من غيره، وكلما تقدّم المستوى زادت الحاجة إليه.

متى تعدّل حجمك التدريبي؟

للزيادة إذا شعرت أن عضلة ما لا تتطوّر رغم التزامك ونومك وتغذيتك، فأضف لها جولة أو جولتين أسبوعيًا واستمر عدة أسابيع. المبتدئ يتطوّر طويلًا على حجم بسيط، فلا يستعجل الزيادة.

للتقليل أول أسبوعين أو ثلاثة من أي جدول جديد يصاحبها ألم أعلى من المعتاد. إذا استمر الألم بعدها وأعاق أداءك، فقلّل جولة أو جولتين. وإن كنت تصل للفشل كثيرًا، فابدأ بإيقاف جولات الفشل قبل تقليل الحجم.

للمحافظة إذا وصلت إلى المستوى الذي تريده، يمكنك الحفاظ على معظم نتائجك بحجم أقل بكثير، يصل إلى نحو ثلث الحجم السابق، بشرط الحفاظ على الشدة. مثال: من 9 جولات أسبوعيًا للصدر إلى نحو 3.

الكارديو والخطوات اليومية

دورهما يختلف بحسب الهدف:

- **للصحة العامة:** توصي منظمة الصحة العالمية البالغين بـ 150–300 دقيقة أسبوعيًا من النشاط متوسط الشدة (أو 75–150 دقيقة عالي الشدة)، إضافة إلى تمارين تقوية العضلات يومين أسبوعيًا على الأقل.
- **لخسارة الدهون:** الأساس هو العجز في السعرات، ثم يأتي النشاط لزيادة الحرق. والخطوات اليومية خيار ممتاز لأنها لا تُرهق الاستشفاء، ولا تحتاج مكانًا أو وقتًا محددًا، ويسهل تتبعها وتعديلها.

هدف عملي

ابدأ من متوسط خطواتك الحالي، وارفعه تدريجيًا نحو 7,000–10,000 خطوة يوميًا بحسب ظروفك. وإن أدّيت الكارديو في يوم الحديد نفسه، فاجعله بعد تمارين المقاومة.

لمحة عن رياضة القوة (Powerlifting)

كمال الأجسام يهدف إلى أكبر بناء عضلي ومظهر متناسق، بلا تمارين إلزامية. أما رياضة القوة فتهدف إلى رفع أثقل وزن ممكن لتكرار واحد في ثلاث رفعات: السكوات، والبنش بريس، والديدلفت. لذلك ينتقل لاعبها بين مراحل خلال السنة:

المرحلة	الهدف	التكرارات والشدة (تقريبية)
بناء الكتلة	زيادة العضل الذي سيصبح قوة لاحقًا؛ حجم أعلى وشدة متوسطة، مع تمارين مساعدة	5–8 تكرارات · RPE 6–8
بناء القوة	تعلّم استخدام العضل بكفاءة على أوزان أثقل؛ حجم أقل وشدة أعلى	3–5 تكرارات · RPE 7–9
التجهيز للبطولة	للمنافسين فقط؛ حجم منخفض وشدة قريبة من الأقصى	1–3 تكرارات · RPE 8–10

للهواة

يمكنك الاستفادة من الفكرة دون منافسة: فترات أطول للبناء، ثم فترات قصيرة للتركيز على القوة.
والمبتدئ يتطوّر في القوة والعضل معًا دون حاجة لهذا التقسيم.

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ طبّق الزيادة المزدوجة: زد التكرارات أولًا، ثم الوزن.
- ✓ إذا تراجع أداؤك واستمر التعب، فخذ أسبوع تخفيف.
- ✓ ارفع خطواتك اليومية تدريجيًا نحو 7,000–10,000.
- ✓ للمحافظة على نتائجك يكفي نحو ثلث حجمك التدريبي السابق.

الفصل العاشر

10 مكتبة تمارين مصغّرة

مجموعة من التمارين الأساسية، مع رابط فيديو يشرح الأداء الصحيح لكل تمرين.

مكتبة تمارين مصغّرة

هنا مجموعة من التمارين الأساسية وأفضل طريقة لشرحها. اضغط على اسم التمرين ليفتح لك رابط الفيديو.

#	اسم التمرين	العضلات المستهدفة
1	Flat DB Press	الصدر (ضغط مستوٍ بالدمبل)
2	Incline Chest Press	الصدر العلوي (ضغط مائل)
3	Lat Pulldowns	الظهر (سحب عالٍ)
4	Seated Rows	الظهر (سحب أفقي جالس)
5	Leg Press	الفخذ الأمامية والأرداف (دفع الأرجل)
6	DB Lateral Raises	الكتف الجانبي (رفرفة جانبية)
7	Leg Extension	الفخذ الأمامية (مدّ الركبة)
8	Lunges	الأرجل والأرداف (الطعنات)
9	Hip Adduction	العضلات الضامّة (الفخذ الداخلية)
10	DB Hip Thrust	الأرداف (دفع الورك بالدمبل)
11	DB Overhead Extension	الترايسبس (مدّ فوق الرأس)
12	Hip Abduction	الأرداف الجانبية (فتح الفخذين)
13	Crunches	عضلات البطن
14	Leg Curl	الفخذ الخلفية (ثني الركبة)

الفصل الحادي عشر

11 أمثلة جداول التمرين

نموذجان من تصميمي: جدول 3 أيام، وجدول 4 أيام.

مثال على جداول تمرين من تصميمي

أسماء التمارين التي تظهر باللون الأزرق مرتبطة بفيديو الشرح في مكتبة التمارين. يُحدَّد عدد الجولات والتكرارات بحسب مستواك، مع الالتزام بنطاق 10–20 جولة أسبوعيًا لكل عضلة، وترك 1–4 تكرارات قبل الفشل العضلي.

3 أيام جدول ثلاثة أيام في الأسبوع

اليوم الأول — جسم كامل (1)		
1	ضغط الصدر	CHEST PRESS
2	سحب عالٍ للظهر	LAT PULLDOWN
3	سحب أفقي جالس	SEATED ROW
4	دفع الأرجل	LEG PRESS
5	فتح الفخذين	HIP ABDUCTION
6	ثني الذراعين (باي)	BICEPS CURL
7	بلانك	PLANK

اليوم الثاني — جسم كامل (2)		
1	الصعود على صندوق	STEP UPS
2	سحب أفقي جالس	SEATED ROW
3	ضغط الصدر	CHEST PRESS
4	سحب عالٍ للظهر	LAT PULLDOWN
5	بلانك	PLANK
6	جسر الأرداف	GLUTE BRIDGE

اليوم الثالث — الجزء السفلي		
1	سكوات بالبار	BACK SQUAT
2	دفع الورك بالبار	BB HIP THRUST
3	ثني الركبة	LEG CURL
4	مدّ الركبة	LEG EXTENSION
5	ضم الفخذين	ADDUCTION
6	تمرين البطن	CRUNCHES

4 أيام جدول أربعة أيام في الأسبوع

اليوم الأول — الجزء العلوي		
1	ضغط صدر مائل بالدمبل	INCLINE DB PRESS
2	ضغط صدر مستوٍ بالدمبل	FLAT DB PRESS
3	سحب عالٍ للظهر	LAT PULLDOWN
4	سحب أفقي جالس	SEATED ROW
5	ثني الذراعين بالدمبل	DB CURL

اليوم الثاني — الجزء السفلي		
1	دفع الأرجل	LEG PRESS
2	رفعة رومانية بالدمبل	DB RDL
3	فتح الفخذين	ABDUCTION
4	رفع الأرداف	GLUTE RAISE
5	بلانك	PLANK

اليوم الثالث — الجزء العلوي		
1	سحب عالٍ للظهر	LAT PULLDOWN
2	ضغط صدر مائل بالدمبل	INCLINE DB PRESS
3	سحب أفقي جالس	SEATED ROW
4	رفرفة جانبية	LATERAL RAISE
5	مدّ الترايسبس فوق الرأس	DB OVERHEAD EXT.
6	تمرين البطن	CRUNCHES

اليوم الرابع — الجزء السفلي		
1	الطعنات	LUNGES
2	دفع الورك بالبار	BB HIP THRUST
3	ثني الركبة	LEG CURL
4	مدّ الركبة	LEG EXTENSION
5	رفع السمانة جالسًا	SEATED CALF RAISE

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ اختر الجدول الذي يناسب عدد أيامك، والتزم به 6–8 أسابيع قبل تغييره.
- ✓ سجّل أوزانك وتكراراتك في «سجل التمرين الأسبوعي» في فصل أدوات التطبيق.

الفصل الثاني عشر

12 أساسيات التغذية

علاقة متوازنة مع الطعام، وطبق متكامل، وحساب احتياجك من السعرات والمغذيات خطوة بخطوة.

الصحة توازن، لا قائمة ممنوعات

تعرّف منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والاجتماعية، لا مجرد غياب المرض.

إذا اهتممت بجسمك على حساب نفسيتك وحياتك الاجتماعية، فقد اختلّ التوازن. قطعة كعك مع أصدقائك لا تجعلك «غير صحي»، وحبة تفاح لا تجعلك «صحيًا». الذي يحدد صحتك هو نمطك العام وعلاقتك بالطعام على المدى الطويل.

عادات تستحق أن تتخلّى عنها

- **معاملة الطعام كذنب والتمرين كعقاب:** التمرين لتحسين صحتك وأدائك، لا لـ«حرق» ما أكلته.
- **أهداف غير واقعية:** النظام الذي لا تستطيع الاستمرار عليه يعيدك إلى نقطة البداية، وغالبًا أبعد منها.
- **العزلة بحجة الالتزام:** يمكنك حضور المناسبات والاستمتاع بها مع الحفاظ على تقدّمك (التفاصيل في الفصل الرابع عشر).
- **قطع الأطعمة المفضّلة تمامًا:** لا يوجد صنف واحد يزيد وزنك بذاته؛ العبرة بالكمية الإجمالية.

طعام مغذٍّ وطعام أقل تغذية

بدل تصنيف الطعام إلى «صحي» و«غير صحي»، صنّفه بحسب قيمته الغذائية، لتعرف كيف تدخله في يومك بذكاء:

طعام مغذٍّ

- غني بالبروتين أو الألياف أو الفيتامينات والمعادن.
- يُشبع لفترة أطول مقابل سعراته.
- أمثلة: الخضار، والفواكه، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والشوفان، والبيض، واللحوم والأسماك، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

طعام أقل تغذية

- سعراته عالية مقابل قيمة غذائية أقل، ويسهل الإفراط فيه.
- إشباعه أقل، لكنه يمنح متعة تساعد على الاستمرار.
- أمثلة: الحلويات، والشوكولاتة، والعصائر المحلّاة، والمقرمشات.


قاعدة عملية

اجعل نحو 80% من طعامك من الصنف المغذّي، ونحو 20% مما تحبه ضمن سعراتك. وتذكّر أن الإفراط سلوك غير صحي حتى مع الطعام المغذّي، وأن ما يناسب شخصًا قد لا يناسب غيره (كالحساسية مثلًا).

كيف تركّب طبقًا متوازنًا؟

الطبق الصحي لا يحتاج منتجات «عضوية» أو مكونات نادرة؛ هو موجود في كل مطبخ. اختر عنصرًا من كل فئة:

الفئة	أمثلة
بروتين	دجاج، لحم قليل الدهن، سمك، تونة، بيض، زبادي يوناني، أجبان قليلة الدسم، بقوليات
كربوهيدرات	أرز، برغل، خبز، مكرونة، بطاطس، شوفان، فواكه
خضار	خضار غير نشوية بكمية وفيرة: خس، خيار، طماطم، بروكلي، كوسا، فلفل، ورقيات
دهون	زيت الزيتون، مكسرات، أفوكادو، بذور. ويمكنك الاكتفاء بالزيت المستخدم في الطبخ
نكهة	بهارات، ليمون، صوصات خفيفة. لا بأس بالصوصات العادية إذا حسبت كميتها



نصف الطبق: خضار
أكبر حجم بأقل سعرات

ربع: بروتين
بحجم كف اليد تقريبًا

ربع: كربوهيدرات
تزيد أو تقل بحسب هدفك ونشاطك

قليل من الدهون
ملعقة زيت أو حفنة مكسرات


مثال لطبق متكامل

150 غ سمك أو دجاج مشوي متبّل + كوب ونصف أرز مطبوخ + طبق سلطة كبير بملعقة زيت زيتون + عصرة ليمون.

توازن الطاقة: القاعدة التي لا يتجاوزها أي نظام

تتغيّر كتلة جسمك بحسب العلاقة بين ما تأكله من طاقة وما تصرفه:

- إذا تساوت الطاقة الداخلة مع المصروفة: **ثبات** في الكتلة.
- إذا زادت الداخلة: **زيادة** في الكتلة.
- إذا زادت المصروفة: **نقص** في الكتلة.



لاحظ أننا قلنا «كتلة» لا «دهون»؛ فالكتلة تشمل الدهون والعضل والماء ومخزون الجلايكوجين. ونوع الكتلة التي تزيد أو تنقص تحدده عوامل أخرى، أهمها البروتين وتمارين المقاومة.

أين تذهب السعرات التي تحرقها؟

المكوّن	المقصود	نسبته التقريبية
معدل الأيض الأساسي	طاقة الوظائف الحيوية وأنت في راحة: التنفس، والدورة الدموية، وحرارة الجسم	60–70%
هضم الطعام	الطاقة اللازمة لهضم الطعام وامتصاصه، وهي أعلى مع البروتين	نحو 10%
النشاط البدني	التمرين، والأهم منه الحركة اليومية: المشي، وأعمال المنزل، والوقوف	20–30%

يمكنك التأثير في جزء من هذه المعادلة: بزيادة الحركة اليومية، وتناول بروتين كافٍ، وبناء العضل الذي يرفع معدل الأيض الأساسي بدرجة بسيطة لكنها مفيدة.

احتياجك من السعرات والمغذيات

معادلات حساب السعرات **تقديرية**؛ هي نقطة بداية، والحكم الحقيقي لاستجابة جسمك خلال الأسابيع التالية. يمكنك استخدام حاسبة السعرات في موقع navcoaching.com، ثم تقسيم السعرات على المغذيات هكذا:

المغذّي	سعراته	الاحتياج المقترح
البروتين	4 سعرات/غ	للمتمرّن: 1.6–2.2 غ لكل كغ من الوزن (الحد الأعلى مفيد أثناء خسارة الدهون). لغير المتمرّن: 0.8–1.2 غ/كغ. ولمن لديه وزن زائد كبير: يُحسب على الوزن المستهدف المنطقي بدل الوزن الحالي
الدهون	9 سعرات/غ	20–35% من السعرات، وألا تقل عن نحو 0.5 غ لكل كغ من الوزن، لدعم الصحة الهرمونية وامتصاص الفيتامينات
الكربوهيدرات	4 سعرات/غ	ما تبقّى من السعرات، وهي مصدر الطاقة الأساسي للتمارين الشديدة
الألياف	—	نحو 14 غ لكل 1000 سعرة (تقريبًا 25 غ للنساء و38 غ للرجال)، من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات

البروتين النباتي

يحتاج الجسم تسعة أحماض أمينية أساسية من الطعام. توفرها المصادر الحيوانية وفول الصويا كاملة، ويمكن للنباتيين الحصول عليها بتنويع المصادر النباتية (بقوليات + حبوب) أو باستخدام بروتين نباتي مكمّل.

تقسيم المغذيات نطاق، لا رقم مقدّس

الفرق بين مرحلة التنشيف ومرحلة الزيادة في إجمالي السعرات أساسًا، لا في «سرّ» توزيع المغذيات.

مثال تطبيقي خطوة بخطوة

لنفترض متدرّبة: الوزن 65 كغ، الطول 165 سم، العمر 28 سنة، تمشي نحو 8,000 خطوة يوميًا وتتمرّن مقاومة 3–4 مرات أسبوعيًا، وهدفها الثبات.

البند	الحساب	النتيجة
السعرات	من حاسبة السعرات	**2,150** سعرة
البروتين	1.8 × 65	**117** غ · 468 سعرة
الدهون	30% × 2,150 ÷ 9 (الحد الأدنى 0.5 × 65 = 33 غ)	**72** غ · 645 سعرة
الكربوهيدرات	(2,150 − 468 − 645) ÷ 4	**259** غ
الألياف	14 × 2.15	**30** غ تقريبًا

النتيجة

نحو 2,150 سعرة: 117 غ بروتين، و72 غ دهون، و259 غ كربوهيدرات، ونحو 30 غ ألياف.

هل سعراتك صحيحة؟ وكيف تعدّلها

1. **التزم بالأرقام 2–3 أسابيع على الأقل** قبل الحكم. قد يزيد وزنك قليلًا في أول أيام بسبب امتلاء مخزون الكربوهيدرات والماء ووزن الطعام في الجهاز الهضمي، وهذه ليست دهونًا.
2. **راقب المتوسط الأسبوعي للوزن** مع محيط الخصر والصور، لا قراءة يوم واحد.
3. **إذا كان المتوسط مستقرًا تقريبًا** (تذبذب ضمن نحو 0.5% من وزنك) فهذه سعرات الثبات.
4. **إذا تغيّر المتوسط بوضوح** فعدّل بهذه القاعدة التقريبية: كل 1 كغ تغيّر في الأسبوع ≈ 1,100 سعرة يوميًا (لأن الكيلو من دهون الجسم يعادل نحو 7,700 سعرة).

مثال

زاد متوسط وزنك 0.3 كغ في الأسبوع بعد مرحلة الاستقرار، وهدفك الثبات: 0.3 × 1,100 ≈ 330 سعرة. خفّض سعراتك اليومية بنحو 300 سعرة وراقب أسبوعين آخرين. والعكس إذا كان الوزن ينزل.

قبل أي تعديل، تأكّد من دقة حسابك ونومك وانتظام الهضم، وضع في الحسبان تأثير الدورة الشهرية على الوزن لدى النساء.

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ احسب احتياجك من السعرات ثم البروتين والدهون والكربوهيدرات بورقة «حساب احتياجك».
- ✓ ركّب كل وجبة من بروتين + كربوهيدرات + خضار + قليل من الدهون.
- ✓ التزم 2–3 أسابيع، ثم قيّم بالمتوسط الأسبوعي للوزن وعدّل.

الفصل الثالث عشر

13 من الهدف إلى النتيجة

اختر هدفك الغذائي بوعي، وطبّقه بطريقة مستدامة، وتعامل مع الثبات والأنظمة القاسية.

كيف تختار هدفك؟

ليس كل هدف مناسبًا لكل شخص في كل وقت. لديك ثلاثة خيارات، ولكلٍّ منها أولوية:

المرحلة	السعرات	الأولوية	تناسب غالبًا
خسارة الدهون	عجز	خفض الدهون مع الحفاظ على العضل	من لديه نسبة دهون مرتفعة
الثبات (إعادة التشكيل)	ثبات	بناء عضل وخفض دهون ببطء معًا	من نسبة دهونه متوسطة، والمبتدئ، ومن يريد «شد الجسم» دون أولوية واضحة
البناء العضلي	فائض بسيط	أكبر بناء عضلي بأقل زيادة دهون	من لديه نسبة دهون منخفضة أو نحافة

أرقام تقريبية للاسترشاد فقط

تبدأ أولوية خسارة الدهون غالبًا عند نحو 32% فأكثر للنساء و25% فأكثر للرجال، وأولوية البناء عند نحو 22% فأقل للنساء و15% فأقل للرجال، وما بينهما يناسبه الثبات أو أي من المرحلتين. هذه ليست قواعد صارمة، وقراءات أجهزة تحليل الجسم تقريبية؛ والمظهر والقياسات والصحة العامة أهم من الرقم.

ومع تقدّم مستواك يصبح التغيير على سعرات الثبات أبطأ؛ فالمبتدئ يلاحظ تغيّرًا واضحًا، بينما يحتاج المتقدّم مراحل محددة للبناء أو التنشيف. لكن فترات الثبات تبقى مهمة نفسيًا وجسديًا بين المراحل.

خسارة الدهون

عندما تأكل أقل من سعرات الثبات، يعوّض الجسم الفرق من مخزونه، ومنه الدهون. وخسارة الدهون تحدث في الجسم كله، لا في المنطقة التي تمرّنها.

1. **عجز معتدل:** نحو 10–25% أقل من سعرات الثبات.
2. **معدل نزول آمن:** نحو 0.5–1% من وزنك أسبوعيًا. وقد يكون النزول أسرع في البداية لمن لديه وزن زائد كبير.
3. **بروتين كافٍ:** في الحد الأعلى من التوصية (نحو 2 غ لكل كغ) للحفاظ على العضل والشبع.
4. **تمارين المقاومة:** الإشارة التي تخبر جسمك بأن يحافظ على العضل.
5. **الحركة اليومية:** خطوات منتظمة، والأفضل ألا تقل عن 7,000–8,000 خطوة في المتوسط، مع نشاط منخفض إلى متوسط الشدة.
6. **روتين ثابت:** وجبات متكررة من مكونات تعرف سعراتها، وتقليل الاعتماد على سعرات المطاعم التقديرية خلال هذه المرحلة المؤقتة.
7. **الجوع المعتدل طبيعي:** اعتمد على الأطعمة الكبيرة الحجم قليلة السعرات: الخضار، والبروتين الصافي، والفاكهة بدل العصير.

استراحة من العجز

بعد نحو 8–12 أسبوعًا من العجز، فكّر في أسبوعين إلى أربعة على سعرات الثبات، ثم أكمل. يساعد ذلك نفسيًا وجسديًا على الاستمرار.

زيادة الوزن والبناء العضلي

للبناء تحتاج فائضًا في السعرات، لكن الفائض الكبير لا يعني بناءً أسرع؛ فللجسم حد للبناء، والزائد يُخزَّن دهونًا.

- **فائض بسيط:** نحو 5–10% فوق سعرات الثبات (غالبًا 150–300 سعرة).
- **معدل زيادة مناسب:** نحو 0.25–0.5% من وزنك أسبوعيًا بعد استقرار الأسبوعين الأولين، والحد الأدنى كلما تقدّم مستواك.
- **راقب محيط الخصر:** إذا زاد بسرعة مع الوزن، فالفائض أكبر من اللازم.
- **إذا صعب عليك الأكل:** استخدم أطعمة عالية السعرات وصغيرة الحجم، مثل المكسرات وزبدة الفول السوداني والزيوت في الطبخ والحليب والعصائر والسموذي.

> **لأسباب صحية**
>
> إذا نصح الطبيب برفع الوزن بسبب نحافة شديدة، فقد يكون الفائض أكبر من ذلك، ويتم تحت إشراف مختص.

الوصول لهدفك دون حساب السعرات

يُنصح بتعلّم حساب السعرات ولو لفترة قصيرة، لتكتسب وعيًا بالكميات. لكن يمكنك التقدّم دون حساب، بشرط ألا يعني ذلك العشوائية:

1. ثبّت روتينًا من 3–5 وجبات بين رئيسية وخفيفة.
2. استخدم قاعدة الطبق: بروتين + كربوهيدرات + خضار + قليل من الدهون في كل وجبة.
3. ثبّت أداة قياس واحدة للكميات: ميزان طعام، أو ملاعق وأكواب، أو كفّ اليد.
4. عدّل اختياراتك بحسب هدفك: المشوي بدل المقلي، ومشروبات «الدايت» بدل المحلّاة أثناء التنشيف، وأطعمة أعلى سعرات أثناء الزيادة.
5. استمر أسبوعين على الأقل، وقِس وزنك 3–7 مرات أسبوعيًا لحساب المتوسط.
6. قارن متوسط الأسبوعين: إن لم يتحرك الوزن والقياسات باتجاه هدفك، فعدّل الكمية (مثلًا ربع كمية الكربوهيدرات في وجبتين يوميًا) واستمر أسبوعين آخرين.

ثبات النتائج: متى يكون ثباتًا فعلًا؟

الثبات الحقيقي هو عدم أي تغيّر في متوسط الوزن والقياسات والصور لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، رغم التزام حقيقي. قبل أن تحكم، أجب بصدق:

السؤال	إذا كانت الإجابة «لا»
هل التزمت بالخطة 80–90% على الأقل؟	هذا ليس ثباتًا، بل التزام أقل من اللازم.
هل استمر التزامك 3 أسابيع متتالية؟	أعطِ الخطة وقتها قبل الحكم.
هل حسابك دقيق، وتعتمد على أكل معروف السعرات أغلب الوقت؟	راجع طريقة الحساب (انظر الأخطاء الشائعة في الفصل التالي).
هل نومك جيد وتوترك تحت السيطرة؟	النوم السيئ والتوتر المرتفع يحبسان الماء ويخفيان النتائج؛ عالجهما أولًا.

إذا تأكّدت أنه ثبات حقيقي

- أضف 2,000–3,000 خطوة يوميًا، **أو** قلّل السعرات بنحو 5–10%، أيهما أنسب لك. فإذا كانت خطواتك مرتفعة أصلًا (12,000 فأكثر) فالأنسب تقليل السعرات، والعكس صحيح.
- في مرحلة الزيادة: ارفع السعرات بنحو 5–10%، ولا تقلّل الحركة إذا كانت أصلًا منخفضة.

متى تتوقف عن التقليل؟

إذا وصلت إلى سعرات منخفضة جدًا (أقل من نحو 1,200 سعرة للنساء أو 1,500 للرجال)، أو لم تعد قادرًا على زيادة نشاطك، أو تأثرت طاقتك ونومك ودورتك الشهرية، فارفع سعراتك إلى الثبات مدة 1–3 أشهر، ثم ارجع لخسارة الدهون بعجز معتدل.

التكيّف الأيضي والخروج من الأنظمة القاسية

تسمع كثيرًا عبارة «الأيض عندي تدمّر» بعد أنظمة الحرمان. الحقيقة أن الأيض **لا يتدمّر**، لكنه **يتكيّف**. عندما تأكل أقل من احتياجك لفترة طويلة، يقلّل جسمك ما يصرفه، خصوصًا الحركة اليومية غير الواعية، ليقترب من الطاقة المتاحة. والخبر الجيد أن هذا التكيّف قابل للعكس.

إذا كنت تتبع نظامًا قاسيًا

1. **ارفع سعراتك** نحو سعرات الثبات: مباشرة، أو تدريجيًا (مثلًا 100–200 سعرة كل أسبوع). النتيجة متقاربة، والتدرّج أريح نفسيًا لبعض الناس.
2. **توقّع زيادة 1–3 كغ على الميزان** بسبب امتلاء مخزون الجلايكوجين والماء ووزن الطعام، وهي ليست دهونًا. خفّف مراقبة الميزان في هذه الفترة.
3. **استبدل الكارديو المفرط** بخطوات يومية معتدلة.
4. **لا تستعجل العودة للتنشيف:** انتظر حتى يستقر وزنك وتتحسن طاقتك ونومك وأداؤك، واستغل الفترة في البناء والتطوّر.

تذكّر

زيادة كيلوين أو ثلاثة لإصلاح جذور المشكلة أفضل بكثير من الدوران في حلقة من الحرمان والتعب دون نتائج.

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ اختر هدفًا واحدًا لهذه المرحلة: خسارة دهون، أو ثبات، أو بناء.
- ✓ في التنشيف: عجز 10–25%، ونزول 0.5–1% من الوزن أسبوعيًا.
- ✓ في البناء: فائض 5–10%، وزيادة 0.25–0.5% أسبوعيًا.
- ✓ لا تحكم بالثبات قبل 3 أسابيع من التزام حقيقي.

الفصل الرابع عشر

14 التغذية في حياتك اليومية

الأكل خارج المنزل، وأخطاء الحساب الشائعة، والمكملات الغذائية بين المفيد وغير المفيد.

الأكل خارج المنزل والمناسبات

لا أحب مصطلح «الوجبة المفتوحة»؛ لأنه يوحي بأن هذا الطعام ممنوع إلا في يوم محدد، فيزيد الرغبة في «الانتقام» والإفراط. الطعام هو نفسه، وطريقة التحضير مختلفة فقط.

وجبة واحدة من بين عشرات الوجبات في الأسبوع لن تفسد خطة تمتد أشهرًا. استمتع بها بوعي، وتوقّف عند الشبع، ثم عُد لنظامك في الوجبة التالية دون تعويض أو تأنيب.

وإن كنت تأكل خارج المنزل كثيرًا؟

قد يبطئ ذلك تقدّمك، لكنه لا يمنعه. الغاية بناء سلوكيات تستمر معك، حتى لو استغرق الوصول وقتًا أطول.

سلوكيات تساعدك

1. **لا تذهب وأنت جائع جدًا:** ابدأ يومك بوجبة مشبعة، ولا تراكم الجوع حتى موعد المناسبة.
2. **أمّن بروتينك مسبقًا:** تناول وجبة غنية بالبروتين والألياف خلال اليوم.
3. **كُل ببطء وتركيز:** امضغ جيدًا واستمتع بالطعم، لتلتقط إشارات الشبع.
4. **استخدم قاعدة الطبق** في البوفيهات والأكل الجماعي، واطلب الصوصات جانبًا لتتحكم في كميتها.
5. **وزّع سعراتك على الأسبوع** إن كنت متمكنًا من الحساب: احسب احتياجك الأسبوعي (احتياجك اليومي × 7)، وخفّض قليلًا من بقية الأيام لتعطي يوم المناسبة سعرات أكثر. لا يُنصح بالإكثار منها أثناء التنشيف، لأنها تزيد العجز في الأيام الأخرى.
6. **يوم مرن:** ثبّت البروتين فقط، وتعامل مع بقية السعرات كرقم واحد دون تقسيمها إلى كربوهيدرات ودهون.
7. **قدّر السعرات بذكاء:** قارن وجبتك بوجبة مشابهة من مطعم يعلن سعراته، أو فكّكها إلى مكوناتها (خبز + 120 غ دجاج + ملعقة صوص). ومع الممارسة يصبح تقديرك أدق.

أخطاء شائعة في حساب السعرات

الخطأ	الصواب
اعتبار وزن الطعام هو وزن البروتين: «أكلت 100 غ دجاج، إذن أخذت 100 غ بروتين»	100 غ صدر دجاج مطبوخ فيها نحو 30 غ بروتين فقط. احسب القيمة الغذائية لا وزن الميزان
خلط وزن الطعام نيئًا ومطبوخًا	إذا وزنت الطعام مطبوخًا فاختر قيمته مطبوخًا في التطبيق، والعكس. والأدق وزن الطعام نيئًا
الاعتماد على أي إدخال في تطبيقات حساب السعرات	كثير من الإدخالات يضيفها المستخدمون وفيها أخطاء؛ قارنها بالملصق الغذائي أو بقاعدة بيانات موثوقة
نسيان الزيوت والصوصات والمشروبات	ملعقة الزيت نحو 120 سعرة. احسب كل ما يُضاف، وبخاخ الزيت ليس «صفر سعرات» عند الإكثار منه
الثقة الكاملة بسعرات المطاعم والمقاهي، خصوصًا «الصحية» منها	هامش الخطأ فيها قد يكون كبيرًا؛ اعتبرها تقديرًا، وأضف هامشًا احتياطيًا
حساب «صافي الكربوهيدرات» فقط من الملصق	احسب إجمالي الكربوهيدرات كما هو مكتوب، إلا إذا كانت خطتك مبنية على غير ذلك
الدقة طوال الأسبوع، والعشوائية في عطلة نهاية الأسبوع	يومان غير محسوبين قد يلغيان عجز خمسة أيام. خطّط لعطلتك مسبقًا

المكملات الغذائية: المفيد وغير المفيد

المكملات وسيلة مساعدة لسدّ نقص أو تسهيل الوصول للاحتياج، ولا ترقى لأهمية الأساسيات: السعرات، والبروتين، والنوم، والتمرين. وإن قررت استخدامها، فاختر منتجات تحمل شهادات فحص من طرف ثالث، مثل NSF Certified for Sport أو Informed Sport.

قبل أي مكمّل

استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدوية، أو لديك مرض مزمن (خصوصًا في الكلى أو الكبد)، أو في حالة الحمل والرضاعة، أو كان عمرك أقل من 18 سنة.

مكملات لها أدلة جيدة

المكمّل	فائدته	الاستخدام الشائع
بروتين الواي Whey Protein	طريقة سهلة لإكمال البروتين اليومي. الـ Concentrate نحو 70–80% بروتين، والـ Isolate نحو 90% فأكثر وأقل لاكتوز، فهو أنسب لمن يتحسّس منه	بحسب ما ينقصك من البروتين اليومي، غالبًا 1–2 مغرفة
كرياتين مونوهيدرات Creatine Monohydrate	من أكثر المكملات دراسة؛ يدعم القوة والأداء في الجهد القصير والبناء العضلي. قد يزيد الوزن قليلًا بسبب الماء داخل العضلات، وهذا متوقع	3–5 غ يوميًا في أي وقت، باستمرار
أوميغا 3 EPA + DHA	يدعم صحة القلب ويقلل الدهون الثلاثية؛ مفيد لمن لا يأكل الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيًا	نحو 1–2 غ من EPA + DHA يوميًا (اقرأ الملصق؛ فالكبسولة ليست كلها أوميغا 3)
المغنيسيوم Magnesium	معدن مهم لوظائف العضلات والأعصاب والطاقة؛ قد يفيد من لا يحصل على كفايته من الطعام	نحو 200–350 ملغ يوميًا من المكمل (غالبًا مساءً)، ولا تتجاوز 350 ملغ من المكملات دون استشارة
بروتين نباتي أو أحماض أمينية أساسية EAA	للنباتيين الذين يصعب عليهم إكمال البروتين والأحماض الأمينية الأساسية من الطعام	بحسب النقص في البروتين اليومي

مكملات فائدتها ضعيفة لمعظم الناس

- **BCAA:** تحتوي على 3 أحماض أمينية فقط من تسعة أساسية. وإذا كان بروتينك اليومي كافيًا فلن تضيف شيئًا يُذكر.
- **إل-كارنتين وحوارق الدهون:** لا توجد أدلة كافية على أنها تسرّع خسارة الدهون بشكل ملموس؛ المحرك الأساسي هو العجز في السعرات.
- **معزّزات الهرمونات:** أغلبها غير فعّال، وبعضها قد يحتوي مواد محظورة أو غير مذكورة على الملصق.

ولمراجعة أي مكمّل بحياد، يمكنك الاستعانة بموقع examine.com، وللتحقق من تداخله مع أدويتك موقع drugs.com أو الصيدلي.

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ في المناسبات: لا تذهب جائعًا، وابدأ بالبروتين، وكُل ببطء.
- ✓ راجع قائمة أخطاء الحساب الشائعة مرة كل أسبوعين.
- ✓ لا تبدأ أي مكمّل قبل ضبط الأساسيات واستشارة الطبيب عند الحاجة.

الفصل الخامس عشر

15 هل يمكنني التمرّن أثناء الدورة الشهرية؟

كيف تؤثر الهرمونات على التمرين، ومتى يستدعي الأمر مراجعة الطبيبة.

ما هي الدورة الشهرية؟

هي التغيّرات الطبيعية المتكررة شهريًا في جسم المرأة. يُحسب أول يوم من نزول الدم بوصفه اليوم الأول من الدورة، وتنتهي الدورة مع بداية النزول التالي. ومتوسط طولها نحو 28 يومًا، والطبيعي لدى البالغات يتراوح غالبًا بين 21 و35 يومًا.

متلازمة ما قبل الدورة (PMS)

تلاحظ كثير من النساء أعراضًا جسدية ونفسية خلال الأيام السابقة للدورة، تختلف شدتها من امرأة لأخرى ومن شهر لآخر، وتخف عادة خلال أيام من بدء النزول. من أشهرها:

- صداع وتقلصات
- ألم أو حساسية في الثدي
- ألم في الظهر أو الورك
- احتباس سوائل وانتفاخ
- قلق وتوتر وصعوبة في التركيز
- حساسية في المزاج أو شعور بالحزن
- اضطراب في النوم
- تغيّر في الشهية

متى تراجعين الطبيبة؟

إذا كانت الأعراض شديدة لدرجة تعيق حياتك اليومية أو علاقاتك أو عملك، أو كان الألم شديدًا وغير معتاد، فراجعي الطبيبة؛ فهناك حالات تحتاج تقييمًا وعلاجًا.

الدورة والشهية

تتغيّر الشهية مع تقلّب الهرمونات، وتلاحظ كثير من النساء زيادة في الجوع أو الرغبة في أصناف معينة قبل الدورة أو في أيامها الأولى. وفي المقابل تعاني أخريات من الغثيان وقلّة الشهية.

إذا زاد جوعك فعلًا لا بأس بإضافة نحو 100–200 سعرة من طعام مغذٍّ في تلك الأيام. وإذا اشتهيتِ الحلو أو المالح، فأدخليه ضمن يومك بذكاء، مثل شوفان بالشوكولاتة والفاكهة، أو بان كيك بالبروتين.

إذا قلّت شهيتك لا تهملي الأكل؛ فقلّة السعرات تزيد الإرهاق. جرّبي الأطعمة الخفيفة السهلة، مثل الشوربات والزبادي والسموذي والفاكهة.

الهرمونات المتحكّمة في الدورة

نعم، يمكن التمرّن أثناء الدورة الشهرية، وقد يخفف النشاط الخفيف من التقلّصات لدى بعض النساء. ولفهم ما يحدث في الجسم، يتحكّم في الدورة الشهرية أربعة هرمونات أساسية، لكلٍّ منها دوره:

الهرمون المنبّه للجُريب (FSH) يُفرَز من الغدة النخامية، ووظيفته تحفيز الجُريبات في المبيض على النضج، لتنمو فيها البويضة.

الهرمون اللوتيني (LH) يُفرَز أيضًا من الغدة النخامية، وعندما يرتفع مستواه بشكل مفاجئ تحدث الإباضة (خروج البويضة من المبيض).

الإستروجين (Estrogen) يُفرَز أساسًا من المبيض، خصوصًا في النصف الأول من الدورة، ويساعد على بناء بطانة الرحم، ويدعم صحة العظام والعضلات والأوعية الدموية.

البروجستيرون (Progesterone) يفرزه الجسم الأصفر بعد الإباضة، ودوره تجهيز بطانة الرحم لاحتمال حدوث حمل. وإن لم يحدث حمل ينخفض مستواه، فتبدأ دورة شهرية جديدة.

مراحل الدورة وتأثيرها على التمرين

المرحلة الأولى: من بداية الحيض إلى الإباضة

يرتفع هرمون الإستروجين تدريجيًا، وتلاحظ كثير من النساء في هذه الفترة أن طاقتهن وأداءهن الرياضي أفضل، وقدرتهن على التحمّل أعلى. إن كان هدفك زيادة الأوزان أو تحطيم أرقامك الشخصية، فقد تكون هذه الفترة مناسبة لذلك.

المرحلة الثانية: من بعد الإباضة إلى بداية الدورة القادمة

بعد الإباضة يبدأ الإستروجين بالانخفاض تدريجيًا، بينما يرتفع البروجستيرون ويصل غالبًا إلى أعلى مستوياته قبل الدورة القادمة. وقد تشعر بعض النساء في هذه الفترة بخمول أو تعب أسرع أو انخفاض في الأداء، وقد تظهر أعراض ما قبل الدورة (PMS)، مثل الشعور بثقل الأوزان التي كانت سهلة.

ماذا تفعلين عندها؟

يمكن تقليل الأوزان قليلًا وزيادة التكرارات، أو تعديل شدة التمرين للحفاظ على المستوى المطلوب دون إرهاق مفرط.

ملاحظة مهمة

تشير الدراسات إلى أن الفروق في الأداء بين مراحل الدورة صغيرة في المتوسط وتختلف كثيرًا من امرأة لأخرى، ومن شهر لآخر. الأفضل أن تراقبي جسمك وتسجّلي ملاحظاتك حول طاقتك وأدائك في التمرين على مدار الشهر، وبهذه الطريقة تعرفين سبب تفاوت مستويات نشاطك من أسبوع لآخر.

أسباب انقطاع الدورة الشهرية المرتبطة بالتمرين والتغذية

قبل أن تقرئي

الأسباب المذكورة هنا تخص مجال التدريب والتغذية فقط، وهناك أسباب صحية أخرى تتطلب تدخلًا طبيًا (مثل الحمل أو تكيّس المبايض أو اضطرابات الغدة الدرقية). إذا انقطعت الدورة 3 أشهر أو أكثر، أو كان السبب غير ما هو مذكور، فيجب مراجعة الطبيبة المختصة.

السبب الأول: الطاقة

إما نقص في الطاقة الداخلة (التغذية)، أو نشاط عالٍ جدًا لا يستطيع الجسم تحمّله ولا يحصل على كفايته من السعرات. عندها يقلّل الجسم أولوية الوظائف الإنجابية ليحافظ على الأجهزة الحيوية، مثل الجهاز التنفسي والهضمي. ولذلك فإن العجز الحاد في السعرات له أضرار كثيرة، وهذه من بينها.

ومن المهم ألا تنخفض **الدهون الصحية** في الطعام عن النطاق الموصى به (نحو 20–35% من إجمالي السعرات اليومية)، وتجنّب الأنظمة منخفضة الدهون جدًا.

السبب الثاني: التوتر والضغوط

كثرة التوتر والضغوط وعدم التعامل معها يؤثران نفسيًا وجسديًا، فيرتفع هرمون الكورتيزول، وارتفاعه المستمر قد يُخلّ بالإشارات الهرمونية المنظّمة للدورة، ومنها الهرمون اللوتيني (LH) المهم جدًا لعملية الإباضة.

السبب الثالث: نسبة الدهون في الجسم

كلما انخفضت نسبة الدهون في الجسم كثيرًا زاد احتمال انقطاع الدورة، والسبب يرجع إلى انخفاض هرمون **اللبتين** الذي يُفرَز من الخلايا الدهنية ويؤدي دورًا مهمًا في تنظيم الدورة.

استعادة الدورة الشهرية

إذا عرفنا السبب، يمكن استعادة الدورة بإذن الله، وكلما طالت فترة الانقطاع طالت غالبًا فترة الاستعادة. ويتم ذلك تحت إشراف طبي.

السبب الأول: الطاقة

- أولًا: رفع السعرات إلى مستوى سعرات الثبات (المحافظة).
- ثانيًا: إذا كان الإجهاد في التمرين عاليًا وأغلب الجولات تصل إلى الفشل العضلي، يُقلَّل الحجم التدريبي ويُترك نحو 3 تكرارات قبل الفشل.

السبب الثاني: التوتر والضغوط

- الابتعاد عن مصادر التوتر قدر الإمكان، واستخدام طرق لتخفيفه مثل التدليك، والجاكوزي الدافئ، والمشي الخفيف، وممارسة هواية محبّبة ذات طابع هادئ.
- إن لم يُجدِ ذلك، فيُنصح بالتواصل مع مختص لتخفيف التوتر.

السبب الثالث: نسبة الدهون

إذا كانت نسبة الدهون في جسمك منخفضة جدًا (قريبة من الحد الأدنى الأساسي، أي نحو 10–13% لدى النساء)، فتحتاجين إلى رفع سعراتك إلى سعرات الثبات والاستمرار عليها.

صحيح أن مظهر عضلات البطن الواضحة دون أي دهون في البطن السفلي يجذب كثيرات، لكن الوصول إليه يتطلب عادةً عجزًا حادًا في السعرات، والوصول إليه بسرعة ودون انقطاع للدورة أمر صعب نسبيًا. وأوضح مثال على ذلك لاعبات كمال الأجسام في فترات المنافسة؛ إذ يعاني كثير منهن تقلبات المزاج وانخفاض الطاقة وانقطاع الدورة.

أهمية الدورة الشهرية

يعتقد بعض الناس أن أهمية الدورة الشهرية تقتصر على الإنجاب، وهذا جانب واحد فقط. فالدورة تعتمد على توازن الهرمونات في جسم المرأة، وأي خلل فيها قد ينعكس سلبًا على الصحة النفسية (مثل الاكتئاب)، وعلى الطاقة والنشاط اليومي، وقد يزيد خطر هشاشة العظام وأمراض القلب على المدى البعيد.

الموضوع أعمق من مجرد حيض شهري؛ إنه صحتك وحياتك ومستقبلك، **فلا تهملي صحتك أبدًا.** وإن لم تُجدِ الحلول السابقة، تواصلي معي لأتعرف على التفاصيل أكثر، أو أوجّهك إلى المختص.

نصائح أخت لأختها

كثير من السلوكيات التي نمارسها في حياتنا قد تؤثر سلبًا على الدورة وآلامها، وهذه بعض النصائح التي أتمنى أن تفيدك:

1. في الأيام الأولى من الدورة لا بأس بالأكل حتى مستوى احتياجك دون عجز في السعرات إذا احتجتِ إلى ذلك؛ فجسمك يحتاج إلى الطاقة، ومن المهم تلبية احتياجه.
2. تلاحظ بعض النساء أن تقليل الكافيين والمشروبات الغازية قبل الدورة بأيام يخفف الانتفاخ والانزعاج.
3. حافظي على دفء جسمك قبل الدورة وأثناءها، خصوصًا القدمين.
4. الكمادات الدافئة على البطن مفيدة لتخفيف الألم، وكذلك المشروبات الدافئة مثل شاي الأعشاب أو البابونج قد تساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر.

5. ابتعدي عمّا يوتّر أعصابك؛ فجسمك في حالة تقلّب هرموني قد يزيد شعورك بالتوتر والعصبية.
6. ركّزي على الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقّدة، وقلّلي من الوجبات السريعة.
7. من الطبيعي أن تنخفض الطاقة في أول يومين مع الخمول والألم، فالأفضل أن ترتاحي خلالهما إن احتجتِ. وإن لم يكن هناك ألم أو تعب، فيمكنك العودة لتمارينك كأي يوم آخر في الشهر.
8. قلّلي من رقائق البطاطس (الشيبس) وأمثالها من الوجبات الخفيفة العالية بالسعرات قليلة الفائدة.
9. بالنسبة للحلويات والشوكولاتة: لا مانع منها باعتدال ضمن سعراتك.

أسئلة شائعة عن صحة المرأة الرياضية

هل يمكن إبراز عضلات البطن دون مشاكل هرمونية؟

لدى كثير من النساء يتطلب ظهور عضلات البطن بوضوح نسبة دهون منخفضة قد تُخلّ بالهرمونات المنظمة للدورة. لكن الأجسام تختلف؛ فبعض النساء نحيفات بطبيعتهن، وبعضهن يخزّن الدهون في مناطق أخرى غير البطن، فتظهر عضلاته دون نسبة دهون متطرفة. المعيار هو صحتك: انتظام دورتك وطاقتك ونومك ومزاجك، لا ما تراه في وسائل التواصل.

هل في التمرين أثناء الدورة خطر؟

لا. التمرين آمن أثناء الدورة، وقد يخفف التقلصات لدى بعض النساء. استمعي لجسمك؛ إن احتجتِ للراحة يومًا أو يومين فارتاحي دون قلق، فنتيجة أشهر لا تضيع في أيام.

كيف أتابع تأثير الدورة على أدائي؟

استخدمي تطبيقًا لتتبع الدورة، وسجّلي ملاحظات قصيرة عن طاقتك وأدائك ونومك وشهيتك. وخلال أشهر قليلة ستتضح لكِ أنماطك الخاصة، فتخططين تمارينك ووزنك وتوقعاتك على أساسها.

تذكير لطيف

كوني متعاطفة مع نفسك؛ فهذه التقلبات خارجة عن إرادتك، وجلد الذات أو «التعويض» يضرّ أكثر مما ينفع. أضيفي تمارين تنفّس واسترخاء في الأسبوع السابق للدورة، ونامي جيدًا.

خلاصة الفصل: ماذا أطبّق الآن؟

- ✓ سجّلي طاقتك وأداءك وشهيتك خلال الشهر لتعرفي نمطك الخاص.
- ✓ في الأيام الصعبة: خفّفي الأوزان وزيدي التكرارات، أو ارتاحي.
- ✓ إذا انقطعت الدورة 3 أشهر أو أكثر، فراجعي الطبيبة.

الفصل السادس عشر

16 الأسئلة الشائعة

إجابات مختصرة عن أكثر الأسئلة تكرارًا حول التمرين والإصابات والتغذية ومتابعة التقدّم.

أسئلة عن التمرين

1 ما أفضل أنواع التمارين للمبتدئين؟

يستطيع المبتدئ البدء بأي تمرين يريده، لكن الأفضل في البداية استخدام الأجهزة حتى يتعلّم التكنيك الصحيح ويفهم مفهوم الفشل العضلي، ثم يتدرّج إلى الأوزان الحرّة.

2 كم مرة يجب ممارسة التمارين أسبوعيًا لتحقيق نتائج ملحوظة؟

تمارين المقاومة مرتين في الأسبوع على الأقل، بشرط تحقيق عدد الجولات المطلوبة أسبوعيًا بحسب مستواك، وغالبًا ما بين 10 و20 جولة لكل عضلة في الأسبوع.

3 هل يجب القيام بتمارين الإحماء قبل كل تمرين؟

نعم. وهناك نوعان من الإحماء كما ورد في فصل «نقاط مهمة»: يمكن الاستغناء عن الإحماء العام، لكن لا يُنصح أبدًا بتجاهل الإحماء الخاص.

4 ما الفرق بين التمارين الهوائية (الكارديو) وتمارين المقاومة؟

تمارين الكارديو هدفها تحسين اللياقة القلبية، وهي مفيدة جدًا لتحسين الوظائف الحيوية. أما تمارين المقاومة فهدفها الحفاظ على الكتلة العضلية أو زيادتها، وتحسين القوة، ودعم معدل الحرق. والأفضل الجمع بينهما.

5 كيف يمكن تجنّب الإصابات أثناء ممارسة التمارين الرياضية؟

من أهم العوامل التي تقلّل خطر الإصابة لا سمح الله: الإحماء، والزيادة التدريجية المعقولة في الأوزان، وعدد جولات مناسب لهدفك ومستواك، والاستشفاء الكافي، والأداء بتكنيك صحيح.

6 ما الفرق بين الراحة النشطة والراحة الكاملة؟

الراحة النشطة يوم لا تتمرّن فيه بالأوزان، لكن تمارس نشاطًا خفيفًا مثل المشي أو كارديو منخفض الشدة لتعزيز الاستشفاء. أما الراحة الكاملة فيوم بلا أي نشاط رياضي. وإذا لم تستطع ممارسة النشاط في يوم الراحة النشطة فلا بأس بتحويله إلى راحة كاملة.

7 ما نطاق نبضات القلب المناسب في تمارين الكارديو؟

للكارديو متوسط الشدة، يُنصح عادةً بأن تكون نبضات القلب بين 55% و75% تقريبًا من أقصى معدل لنبضات قلبك. ويمكن تقدير الحد الأقصى بشكل تقريبي بالمعادلة: 220 – العمر. (بعض الأدوية، مثل أدوية الضغط، تؤثر على النبض، فاستشر طبيبك).

8 هل يلزم تسجيل الأوزان والتكرارات؟

نعم، يُنصح بذلك بشدة؛ فتسجيل أوزانك وتكراراتك في كل تمرين يساعدك على التدرّج في رفع الأداء وحجم التمرين بشكل سليم ودون أن تعرّض نفسك للإصابة. يمكنك استخدام دفتر أو تطبيق لتسجيل التمارين على الجوال.

9 كيف أختار بديلًا لتمرين لا أستطيع أداءه؟

اختر تمرينًا يستهدف العضلة نفسها بنمط الحركة نفسه لكن بأداة مختلفة. مثلًا بديل Barbell Chest Press: Dumbbell Chest Press بالدمبل، أو Machine Chest Press بالجهاز، أو Band Chest Press بحبل المقاومة، أو تمرين الضغط بوزن الجسم (Push-up). ويمكنك البحث عن التشريح العضلي لأي تمرين بكتابة اسمه متبوعًا بكلمة Anatomy.

10 كيف أتعامل مع جدولي أثناء السفر أو الضغط في العمل أو الدراسة؟

لديك ثلاثة خيارات: **أولًا** تقليل عدد الجولات إلى النصف أو إلى جولتين فقط لكل تمرين، فيقل وقت التمرين. **ثانيًا** التمرين يومًا بعد يوم، فتؤدي أيام جدولك بالترتيب مع يوم راحة بين كل يومين. **ثالثًا** إن تعذّر التمرين تمامًا، فحافظ على حركتك طوال اليوم بالمشي، ثم عُد لجدولك بعد انتهاء الظرف من حيث توقفت، دون أن تقسو على نفسك.

11 متى أمارس تمارين البطن؟

في أي وقت يناسبك: قبل التمرين أو بعده أو في وقت منفصل. ويكفي أداؤها بشكل عام من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

أسئلة عن الألم والإصابات

12 كيف أفرّق بين ألم ما بعد التمرين وألم الإصابة؟

ألم ما بعد التمرين (DOMS) ألم عضلي عام غير حاد، يظهر غالبًا بعد 24 ساعة ويختفي خلال 48–72 ساعة، ويتحسّن مع الحركة الخفيفة. أما **ألم الإصابة** فحاد أو موضعي، وقد يصاحبه تورّم أو كدمات أو وخز أو خدر، أو فقدان لوظيفة العضو المصاب، مثل عدم القدرة على تحريك اليد أو ثني الظهر.

13 هل يلزم أن أشعر بألم بعد التمرين حتى يكون مفيدًا؟

لا، ليس بالضرورة. الألم ليس مقياسًا لجودة التمرين، ويقل عادةً كلما اعتاد جسمك على التمارين.

14 كيف أخفّف ألم العضلات بعد التمرين؟

من الطرق المفيدة: الحركة الخفيفة والمشي، وتدليك العضلات باليد أو بالأسطوانة المطاطية (Foam Roller)، وتمارين الإطالة الخفيفة لنحو 10 دقائق، والاستحمام بماء دافئ، إضافةً إلى النوم الجيد والتغذية المناسبة.

15 ماذا أفعل إذا تعرّضت لإصابة في النادي؟

أوقف التمرين فورًا. ضع كمادة باردة (ثلج ملفوف بقماش) على مكان الإصابة لمدة 10–20 دقيقة، مع ضغط خفيف ورفع العضو المصاب إلى مستوى القلب أو أعلى إن أمكن. وإذا كان الألم شديدًا أو استمر، أو ظهر تورّم واضح أو عدم قدرة على الحركة، فراجع الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي دون تأخير.

16 كيف أعود للتمرين بعد الإصابة أو الانقطاع؟

بعد التعافي وموافقة المختص، ابدأ بأوزان أخف وعدد جولات أقل من السابق، ثم ارفعها تدريجيًا خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع بحسب مدة الانقطاع واستجابة جسمك. وإذا عاد الألم، فتوقّف واستشر المختص.

أسئلة عن التغذية حول التمرين

17 متى آكل قبل التمرين؟

يُفضّل أن تكون آخر وجبة رئيسية قبل التمرين بنحو 2–4 ساعات حسب حجمها، أو وجبة خفيفة قبل التمرين بنحو 30–60 دقيقة. وإذا كنت تأكل قبل التمرين بساعة ولا تشعر بأي انزعاج في الجهاز الهضمي، فلا مشكلة.

18 هل يمكنني ممارسة الكارديو على الريق؟

بشكل عام لا إشكال في الكارديو منخفض الشدة على الريق للأشخاص الأصحاء. وإذا شعرت بدوخة أو ضعف، فتناول وجبة خفيفة قبله. والأهم لخسارة الدهون هو إجمالي السعرات على مدار اليوم، لا توقيت الكارديو.

19 كم أحتاج من الماء يوميًا؟

يحتاج معظم البالغين إلى نحو 2–2.5 لتر من الماء يوميًا من المشروبات والطعام معًا كنقطة بداية، وتزيد الحاجة مع الحر والتعرّق والتمرين. ولون البول الفاتح مؤشر عملي على الترطيب الجيد، وتُحسب أغلب السوائل التي تشربها ضمن هذه الكمية.

20 هل أحتاج إلى مكملات غذائية؟

ليست ضرورية لتحقيق النتائج؛ والأولوية دائمًا للغذاء المتوازن. وإن قررت استخدام مكمل، فاختر منتجات من شركات معروفة تحمل شهادات فحص من طرف ثالث مثل NSF Certified for Sport أو Informed Sport، واستشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدوية أو لديك حالة صحية أو في حال الحمل والرضاعة.

أسئلة عن متابعة التقدّم

21 كيف آخذ قياساتي بدقة؟

- القياس في اليوم نفسه من كل أسبوع وفي التوقيت نفسه، ويُفضّل صباحًا بعد دخول الحمّام وقبل الأكل.
- تجنّب النشاط البدني العنيف قبل القياس بنحو 12 ساعة، وتجنّب المدرّات مثل الكافيين قبله.
- استخدم شريط قياس مرنًا (شريط الخياطة) لمحيط الخصر والورك والفخذ والذراع.
- صوّر جسمك من الأمام والجنب والخلف في المكان نفسه، وبالإضاءة نفسها، ومن المسافة نفسها كل مرة.

22 هل أجهزة تحليل الجسم والموازين الذكية دقيقة؟

أجهزة تحليل نسبة الدهون والعضلات تتأثر بعوامل كثيرة، منها كمية السوائل في الجسم، ولها هامش خطأ قد يصل إلى نحو 5% أو أكثر. لذلك يُعتمد في تقييم التقدّم على مجموعة مؤشرات معًا: الصحة والطاقة، والقوة والأداء في التمرين، والشكل والصور، والقياسات بالشريط، ثم الوزن.

23 ماذا لو ثبت الوزن والقياسات لكن الشكل يتغيّر؟

في هذه الحالة تكون النتيجة إيجابية غالبًا، فقد تكون الكتلة العضلية زادت والدهون نقصت. أما إذا استمر الثبات في كل المؤشرات لأكثر من أسبوعين، فقد نحتاج إلى تعديل التغذية أو النشاط أو تحسين النوم وتقليل التوتر. تذكّر دائمًا أن الوزن مجرد رقم واحد من أرقام كثيرة.

أسئلة إضافية عن التمرين

24 لا أشعر بالعضلة المستهدفة أثناء التمرين؛ هل أخطأت؟

ليس بالضرورة. الإحساس بالعضلة مهارة تتطوّر مع الوقت، ولا يصلح مقياسًا وحيدًا للمبتدئ؛ فقد يبالغ في المدى الحركي أو يغيّر الأداء فقط ليشعر بالعضلة، فيضغط على المفاصل أو يشغّل عضلة أخرى. ركّز على الأداء الصحيح والمدى الحركي المناسب والجهد الكافي، وسيأتي الإحساس.

25 أريد «شد» جسمي دون بناء عضلات؛ هل هذا ممكن؟

«الشد» في حقيقته عضل يظهر مع نسبة دهون مناسبة. بناء قدر من العضل هو ما يمنح الجسم مظهرًا مشدودًا ومتناسقًا، ولا يعني ذلك الضخامة. وإذا وصلت إلى الشكل الذي تريده، يمكنك خفض الحجم التدريبي إلى مستوى المحافظة.

26 كم سعرة يجب أن أحرق في تمرين المقاومة؟

لا يُقاس نجاح تمرين المقاومة بالسعرات المحروقة، بل بمدى قرب جولاتك من الفشل وتطوّرك مع الوقت. وأرقام الساعات الذكية في هذا النوع من التمارين تقديرية جدًا، فلا تقيّم تمرينك بها.

27 هل يمكنني تكبير عضلة معينة أكثر من غيرها؟

نعم. البناء العضلي، بخلاف حرق الدهون، يحدث في العضلة التي تمرّنها. زد جولاتها الأسبوعية، واستهدفها بتمارين تجعلها تؤدي وظيفتها (راجع فصل العضلات ووظائفها).

28 هل يجب أن أثبّت أيام التمرين والراحة؟

لا. وزّع أيامك بحسب التزاماتك، مع الحرص على ألا تمرّن العضلة نفسها بجهد عالٍ يومين متتاليين إن أمكن.

29 ما أفضل وقت للتمرين؟

الوقت الذي تستطيع الالتزام به وتكون فيه مستعدًا. صباحًا أو مساءً، الأهم الانتظام.

30 لدي وزن زائد؛ هل أبدأ بالكارديو شهرًا ثم المقاومة؟

لا داعي للانتظار. ابدأ تمارين المقاومة من أول أسبوع بأوزان مناسبة لمستواك، مع زيادة الحركة اليومية تدريجيًا؛ فالمقاومة تحافظ على العضل أثناء خسارة الدهون وتحسّن القوة والحركة.

31 ما أفضل حذاء لتمارين المقاومة؟

الحذاء المسطّح الثابت، أو التمرين بالجوارب إن سمح النادي بذلك؛ لأنه يمنح ثباتًا أفضل. وأحذية الجري ذات النعل الإسفنجي العالي أقل ثباتًا في السكوات والديدلفت.

32 عمري أقل من 18 سنة؛ هل يمكنني ممارسة المقاومة؟

نعم. تؤكد الجهات المتخصصة أن تمارين المقاومة آمنة ومفيدة للأطفال والمراهقين، بشرط الإشراف والتركيز على الأداء الصحيح والتدرّج، لا على الأوزان القصوى.

33 جهتي اليسرى أضعف من اليمنى (أو العكس)؛ ماذا أفعل؟

هذا طبيعي إلى حدّ ما. أضف تمارين بيد أو ساق واحدة، وابدأ دائمًا بالجهة الأضعف، ثم أدِّ بالجهة الأقوى عدد التكرارات نفسه فقط.

34 متى أغيّر تماريني حتى لا «يتعوّد» جسمي؟

الجسم لا يتعوّد على اسم التمرين، بل على الحمل. التغيير العشوائي المتكرر يمنعك من إتقان التمارين ومن قياس تطوّرك. غيّر التمرين عندما يتوقف تقدّمك فيه رغم الالتزام، أو يسبب لك ألمًا، أو تملّ منه فعلًا.

أسئلة إضافية عن التغذية

35 كيف أرفع معدل الحرق؟

جيناتك عامل مهم، لكن يمكنك التأثير بثلاثة أمور: زيادة الكتلة العضلية بتمارين المقاومة، وزيادة الحركة اليومية، وتناول بروتين كافٍ لأن هضمه يستهلك طاقة أكبر.

36 هل يكفي حساب السعرات والبروتين فقط؟

نعم، هذه طريقة عملية ومرنة لكثير من الناس. فقط لا تبالغ في خفض الدهون أو الكربوهيدرات؛ فالأولى مهمة للهرمونات، والثانية مهمة للطاقة والأداء.

37 هل يمكنني بناء العضل وأنا في عجز سعرات؟

نعم، خصوصًا المبتدئ ومن لديه نسبة دهون أعلى أو يعود بعد انقطاع، بشرط بروتين كافٍ وتمرين جيد. لكن لكل مرحلة أولوية: الأولوية في العجز لخسارة الدهون، وفي الفائض للبناء، وفي الثبات لتغيير تركيبة الجسم ببطء.

38 تجاوزت سعراتي اليوم؛ ماذا أفعل؟

لا شيء خاص. لا تعوّض بالتجويع أو بكارديو مفرط. ارجع لنظامك في الوجبة التالية، وأكمل بروتينك، واستمع لإشارات الشبع. يوم واحد لا يغيّر النتيجة.

39 هل أحسب سعرات الخضار؟

احسب الخضار النشوية (البطاطس والذرة والبازلاء). أما الخضار غير النشوية فسعراتها قليلة، ويمكنك تجاهلها إلا إذا كنت تتابع الألياف أو تأكل منها كميات كبيرة جدًا، أو كانت مطبوخة بالزيت.

الفصل السابع عشر

17 أدوات التطبيق

أوراق عمل قابلة للطباعة: احسب احتياجك، خطّط أسبوعك، سجّل تمرينك، وتابع تقدّمك.

كيف تستخدم هذه الأوراق؟

اطبع الأوراق التالية، أو املأها على جهازك اللوحي. ابدأ بحساب احتياجك، ثم خطّط أسبوعك، وسجّل كل جلسة، وقِس تقدّمك أسبوعيًا. أربع أوراق بسيطة تكفي لتعرف ما الذي ينجح معك وما يحتاج تعديلًا.

ورقة 1 · حساب احتياجك من السعرات والمغذيات

الخطوة	طريقة الحساب	نتيجتك
الوزن (كغ)	قِسه صباحًا بعد دخول الحمّام	
سعرات الثبات التقديرية	من حاسبة السعرات في navcoaching.com	
الهدف	ثبات = كما هي · تنشيف = × 0.80–0.90 · بناء = × 1.05–1.10	
البروتين (غ)	الوزن × 1.6–2.2	
سعرات البروتين	غرامات البروتين × 4	
الدهون (غ)	(السعرات × 0.25–0.30) ÷ 9 — ولا تقل عن الوزن × 0.5	
سعرات الدهون	غرامات الدهون × 9	
الكربوهيدرات (غ)	(السعرات − سعرات البروتين − سعرات الدهون) ÷ 4	
الألياف (غ)	(السعرات ÷ 1000) × 14	

بعد أسبوعين أو ثلاثة

قارن متوسط وزنك الأسبوعي: كل 1 كغ تغيّر في الأسبوع ≈ 1,100 سعرة يوميًا. عدّل السعرات بحسب هدفك، ثم أعد التقييم بعد أسبوعين.

ورقة 2 · خطة أسبوعي

اليوم	نوع اليوم	التمارين أو الأنماط	هدف الخطوات
السبت			
الأحد			
الاثنين			
الثلاثاء			
الأربعاء			
الخميس			
الجمعة			

نوع اليوم: علوي، سفلي، جسم كامل، راحة نشطة، أو راحة كاملة. وتأكد أن كل عضلة تُمرَّن مرتين على الأقل.

ورقة 3 · سجل التمرين

اليوم: ..... التاريخ: ..... الطاقة (1–5): .....

التمرين	الجولة 1 وزن × تكرار	الجولة 2 وزن × تكرار	الجولة 3 وزن × تكرار	الجولة 4 وزن × تكرار	RIR

قارن بالجلسة السابقة: هل زاد تكرار أو وزن في تمرين واحد على الأقل؟ هذه هي الزيادة التدريجية.

ورقة 4 · متابعة التقدّم (12 أسبوعًا)

الأسبوع	متوسط الوزن	الخصر (سم)	الورك (سم)	صور	الالتزام %	ملاحظات
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

قِس الوزن 3–7 مرات أسبوعيًا وسجّل المتوسط. والقياسات والصور في اليوم نفسه كل أسبوع أو أسبوعين، وفي الظروف نفسها.

الفصل الثامن عشر

18 الخاتمة

الاستمرارية والإصرار هما المفتاح.

شكرًا لك

شكرًا لك من كل قلبي لوصولك إلى هنا. أتمنى لك الفائدة والتطبيق الصحيح لما ورد في هذا الكتيّب.

وفي ختام هذا الكتيّب، تذكّر أن بناء حياة صحية وقوية وتحقيق أهداف طويلة الأمد يتطلبان التزامًا ثابتًا بالممارسة. اجعل كل تمرين فرصة للنمو والتطوّر، واحرص على متابعة تقدّمك بانتظام. فالتمارين وحدها لا تكفي؛ إذ يؤدي الغذاء المتوازن والنوم الكافي دورًا أساسيًا في تعزيز الأداء الرياضي وتحقيق النتائج المرجوّة.

وأخيرًا، لا تتردد في استشارتي عند الحاجة؛ فالاستمرارية والإصرار هما المفتاح للوصول إلى أفضل نسخة من نفسك.

تحديثات مستمرة

بحمد الله تم الانتهاء من الكتيّب، وكل من يمتلك نسخة منه سيصله التحديث الجديد باستمرار بإذن الله.

أرجو منك مشاركتي تعليقاتك ونقدك البنّاء من أجل تحسين جودة المحتوى.

إن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمن نفسي والشيطان.

المدرّبة ساره

مصادر لتتعلّم أكثر

إن أحببت التعمّق، فهذه مصادر موثوقة (أغلبها بالإنجليزية) تعرض علم التمرين والتغذية بأمانة:

- **Jeff Nippard**: شرح تطبيقي للتمارين مبني على الأبحاث — youtube.com/@JeffNippard
- **Menno Henselmans**: مقالات علمية في البناء العضلي والتغذية — mennohenselmans.com
- **Stronger By Science**: مراجعات معمّقة للأبحاث — strongerbyscience.com
- **Examine**: مراجعات محايدة للمكملات والتغذية — examine.com

مراجع علمية مختارة

World Health Organization (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour.

Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass. J Sports Sci.

Morton RW et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength. Br J Sports Med.

Jäger R et al. (2017). ISSN Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr.

Kreider RB et al. (2017). ISSN position stand: safety and efficacy of creatine supplementation. J Int Soc Sports Nutr.

Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. J Int Soc Sports Nutr.

Bickel CS, Cross JM, Bamman MM (2011). Exercise dosing to retain resistance training adaptations in young and older adults. Med Sci Sports Exerc.

Mountjoy M et al. (2018). IOC consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S). Br J Sports Med.

McNulty KL et al. (2020). The effects of menstrual cycle phase on exercise performance in eumenorrheic women. Sports Med.

وسائل التواصل

يسعدني تواصلك معي لأي استفسار، أو للاشتراك في برامج التدريب والتغذية المخصّصة.

إنستغرام	@navvcoaching
واتساب	+966 59 916 2724
الموقع وحساب المتدرّب	navcoaching.com

Nav Coaching
Where Passion Meets Quality