

MATH60633 – TP2

David Ardia

Informations importantes

- Ce travail vaut 20% de la note finale.
- Ce travail doit être réalisé par équipe de 3-4 personnes ; remplissez le formulaire d'évaluation par les pairs.
- Envoyez moi un courriel à david.ardia@hec.ca dès que vous aurez constitué votre équipe.
- Ce travail ne peut pas être réalisé avec l'aide de ChatGPT.
- Je ne répondrai qu'aux questions posées sur le forum.
- Votre fichier Rmarkdown ou R notebook doit être déposé avant la date prévue à cet effet. Tout retard entraînera une pénalité de 5% par heure.
- Documentez clairement tout votre code R. Il doit être exécutable.
- Mettez tous vos fichiers dans un seul dossier .zip et nommez-le `nom1_nom2.zip`. Un seul fichier par équipe doit être soumis par équipe.
- Le nombre total de points est de 100.

Context

Vous travaillez en tant qu'analyste quantitatif pour une grande banque d'investissement. Vous et votre équipe êtes chargés de remettre en question les modèles utilisés par les traders et les gestionnaires de risques. Vous travaillez avec R et aimez la recherche reproductible. Tous vos fichiers sont écrits en Rmarkdown ou R notebook.

Vous pouvez regarder la vidéo d'introduction sur Rmarkdown pour vous aider à à construire correctement le fichier R.

Objectifs d'apprentissage

Contenu (rigueur scientifique, concepts, créativité, clarté) [10 points].

- Choisir les bons outils.
- Mettre en œuvre les étapes correctement.
- Proposer des solutions innovantes.
- Rapporter les résultats avec clarté.

Forme (codage, collaboration, présentation) [20 points]

- Construire un projet RStudio avec une structure de dossiers appropriée.
- Utiliser le fichier Rmarkdown/notebook pour reproduire vos résultats.
- Programmer en respectant les normes de codage les plus récentes.

Description

L'objectif est de mettre en oeuvre (une partie) du cadre de gestion des risques pour estimer le risque d'un portefeuille d'options d'achat européennes en tenant compte des facteurs de risque tels que le sous-jacent et la volatilité implicite.

Instructions

Données

1. Chargez la base de données *Market*. Identifiez le prix du S&P 500, l'indice VIX, la structure des taux d'intérêt (actuels et passés), et les options négociées (calls et puts).

Fixation du prix d'un portefeuille d'options [5 points]

1. Supposez le portefeuille suivant d'options d'achat européennes : 1x strike $K = 1600$ échéance 20 jours, 1x strike $K = 1650$ échéance 20 jours, 1x strike $K = 1750$ échéance 40 jours et 1x strike $K = 1800$ échéance 40 jours.
2. Trouvez le prix de ce portefeuille en fonction du dernier prix du sous-jacent et de la dernière volatilité implicite (prenez le VIX pour toutes les options). Utilisez la formule de Black-Scholes pour évaluer les options. Prenez la structure actuelle des taux d'intérêt et interpolez linéairement pour trouver les taux correspondants. Utilisez 360 jours/an pour la structure des taux et 250 jours/an pour la maturité des options.

Un facteur de risque et un modèle gaussien univarié [10 points]

1. Calculez les rendements logarithmiques quotidiens de l'action sous-jacente.
2. Supposez qu'ils sont normalement distribués de manière iid.
3. Générez 10 000 scénarios pour le prix sous-jacent à une semaine d'avance (cinq jours) en utilisant la distribution normale ajustée aux invariants passés.
4. Déterminez la distribution P&L du portefeuille d'options, en utilisant les valeurs sous-jacentes simulées. Supposez que la volatilité implicite reste la même. Prenez des taux interpolés pour la structure des taux.
5. Calculez la VaR95 et l'ES95.

Remarque. N'oubliez pas que vous avancez d'une semaine (cinq jours). L'échéance des options et de la structure des taux sont donc différents de ceux du portefeuille initial.

Deux facteurs de risque et modèle gaussien bivarié [15 points]

1. Calculez les rendements logarithmiques quotidiens de l'action sous-jacente.
2. Calculez les rendements logarithmiques quotidiens du VIX.
3. Supposons qu'ils sont normalement distribués de manière invariante.
4. Générez 10 000 scénarios pour le prix du sous-jacent à une semaine d'avance et la valeur du VIX à une semaine d'avance en utilisant la distribution normale ajustée aux facteurs de risque passés.
5. Déterminez la distribution des pertes et profits du portefeuille d'options, en utilisant les valeurs simulées. Prenez des taux interpolés pour la structure des taux.

Deux facteurs de risque et modèle copule-marginal (Student-t et copule gaussienne) [20 points]

1. Procédez comme précédemment, mais supposez maintenant que le premier invariant est généré à l'aide d'une distribution de Student-t avec $\nu = 10$ degrés de liberté et que le deuxième invariant est généré en utilisant une distribution de Student-t avec $\nu = 5$ degrés de liberté. Supposons que la copule normale pour fusionner les marginales. Recalculez le P&L et les mesures de risque.

Surface de volatilité [20 points]

1. Ajustez une surface de volatilité aux volatilités implicites observées sur le marché (options d'achat et de vente négociées). Minimisez la distance absolue entre les volatilités implicites du marché et les volatilités implicites du modèle. La surface paramétrique est donnée par :

$$\sigma(m, \tau) = \alpha_1 + \alpha_2(m - 1)^2 + \alpha_3(m - 1)^3 + \alpha_4\sqrt{\tau},$$

où $m = K/S$ est le moneyness et τ est le temps jusqu'à l'échéance de l'option en années.

2. Réévaluez le portefeuille avec le modèle paramétrique. Une fois que vous avez estimé la surface de volatilité, considérez $\tilde{\sigma}(m, \tau) = \sigma(m, \tau) - (\alpha_1 + \alpha_4) + \text{VIX}_T$, où VIX_T est le VIX au temps T . Utilisez cette méthode pour le pricing en T . Pour le pricing en $T+5$, considérez $\tilde{\sigma}(m, \tau) = \sigma(m, \tau) - (\alpha_1 + \alpha_4) + \text{VIX}_{T+5}$ où VIX_{T+5} est obtenu par simulation.