

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

RECOMMENDED International Nonproprietary Names: List 74

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9); Resolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy.

Lists of Proposed (1–109) and Recommended (1–70) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 15, 2013* (available in CD-ROM only).

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES: Liste 74

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [*Actes off. Org. mond. Santé*, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9); résolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie.

On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–109) et recommandées (1–70) dans la *Liste récapitulative No. 15, 2013* (disponible sur CD-ROM seulement).

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS: Lista 74

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [*Act. Of. Mund. Salud*, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9); Resolución EB115.R4 (EB115/2005/REC/1) EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia.

Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–109) y Recomendadas (1–70) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 15, 2013* (disponible sólo en CD-ROM).

Latin, English, French, Spanish:
Recommended INN

*Chemical name or description; Molecular formula;
Graphic formula*

DCI Recommandée

Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée

DCI Recomendada

*Nombre químico o descripción; Fórmula molecular;
Fórmula desarrollada*

abemaciclibum

abemaciclib

N-{5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)methyl]pyridin-2-yl}-5-fluoro-4-[4-fluoro-2-methyl-1-(propan-2-yl)-1*H*-benzimidazol-6-yl]pyrimidin-2-amine


abémaciclib

N-[5-[(4-éthylpipérazin-1-yl)méthyl]pyridin-2-yl]-5-fluoro-4-[4-fluoro-2-méthyl-1-(propan-2-yl)-1*H*-benzimidazol-6-yl]pyrimidin-2-amine

abemaciclib

N-[5-[(4-etilpiperazin-1-il)metil]piridin-2-il]-5-fluoro-4-[4-fluoro-2-metil-1-(propan-2-il)-1*H*-benzoimidazol-6-il]pirimidin-2-amina

$C_{27}H_{32}F_2N_8$



amiselimodum

amiselimod

2-amino-2-[2-[4-(heptyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]propane-1,3-diol


amiséli-mod

2-amino-2-[2-[4-(heptyloxy)-3-(trifluorométhyl)phényl]éthyl]propane-1,3-diol

amiselimod

2-amino-2-[2-[4-(heptiloxi)-3-(trifluorometil)fenil]etil]propano-1,3-diol

$C_{19}H_{30}F_3NO_3$



atezolizumabum #

atezolizumab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD274 (programmed death ligand 1, PDL1, PD-L1, B7 homolog 1, B7H1)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-448) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (86.70%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 N84.4>A (298) (232-341), CH3 (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-5*01 (87.90%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01(108'-214')]; dimer (227-227":230-230")-bisdisulfide

atézolizumab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD274 (ligand 1 de mort programmée, PDL1, PD-L1, homologue 1 de B7, B7H1)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-448) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (86.70%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (215) (119-216), charnière (217-231), CH2 N84.4>A (298) (232-341), CH3 (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-5*01 (87.90%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure

atezolizumab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD274 (ligando 1 de muerte programada, PDL1, PD-L1, homólogo 1 de B7, B7H1)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 (1-448) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (86.70%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (215) (119-216), bisagra (217-231), CH2 N84.4>A (298) (232-341), CH3 (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfuro com la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-5*01 (87.90%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLVESGGG LVPGGSLRL SCAASGFTFS DSWIHWVRQA PGKGLEWVAV 50
ISPYGGSTYY ADSVKGRTTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCARRH 100
WFGGFDYWGQ GTLVTVSSAS TKGFSVFELA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY 150
FPEPVVSWN SGALTSVHT FFAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTYI 200
CNVNHKFSNT KVDKKVEPKS CDKTHITCFPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD 250
TLMISRTPEV TCVVVDVSHS DEEVKFNWYV DGEVHNNAKT KREEQYAST 300
YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY 350
TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTFPVLD 400
SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK 448
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQDVS TAVAWYQKPK GKAPKLLIYS 50
ASFLYSGVPS RFGSGSGSDT FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YLYHPATFGQ 100
GTRVETKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLTIT LSKADYERHK VYACEVTHQG 200
LSSEPVTKSFN RGECC 214
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 145-201 262-322 368-426
22"-96" 145"-201" 262"-322" 368"-426"

Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194"
23"-88" 134"-194"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 221-214' 221"-214"

Inter-H-H (h 11, h 126) 227-227" 230-230"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4>A (298, 298')

No N-glycosylation sites/pas de sites de N-glycosylation/ Ningun posición de N-glicosilación

avoralstatum

avoralstat


3-{2-[(4-carbamimidoylphenyl)carbamoyl]-4-ethenyl-5-methoxyphenyl}-6-[(cyclopropylmethyl)carbamoyl]pyridine-2-carboxylic acid

avoralstat

acide 3-{2-[(4-carbamimidoylphenyl)carbamoyl]-4-éthényl-5-méthoxyphényl}-6-[(cyclopropylméthyl)carbamoyl]pyridine-2-carboxylique

avoralstat



ácido 3-{2-[(4-carbamimidóilfenil)carbamoil]-4-etenil-5-metoxifenil}-6-[(ciclopropilmetil)carbamoil]piridina-2-carboxílico

 $C_{28}H_{27}N_5O_5$
**axalimogenum filolislacum #**

axalimogene filolislac

A live attenuated recombinant strain of *Listeria monocytogenes* (*Lm*) bacterium bioengineered to secrete an antigen-adjuvant fusion (tLLO-E7) protein consisting of non-hemolytic listeriolysin O (truncated LLO, tLLO) fused to the human papilloma virus-16 (HPV-16) E7 protein, contained within the multi-copy plasmid pGG-55. The bacterial strain used, XFL-7, had been attenuated by excision of the essential transcription activator gene for virulence gene expression *prfA* (10403S Δ *prfA*) and complemented with a mutated, less active *prfA* to maintain *in vivo* retention. In plasmid pGG-55, the *Lm hly* promoter drives the expression of fusion protein tLLO-E7, an approximately 67-kDa protein. The tLLO fragment of the fusion gene codes for the first 440 amino acids of full-length listeriolysin and is genetically fused to the E7 gene using the restriction site *Xho*I. The plasmid pGG55 is retained in XFL-7 *in vivo* due to the expression of the mutated PrfA protein.

axalimogène filolisbac	souche bactérienne vivante atténuée de <i>Listeria monocytogenes</i> (Lm) recombinante sécrétant une protéine de fusion antigène-adjuvant (tLLO-E7) qui comprend une listériolysine O non-hémolytique (LLO tronquée, tLLO), fusionnée à la protéine E7 du papillomavirus humain de type 16 (HPV-16), contenue dans le plasmide à copies multiples pGC-55. La souche bactérienne utilisée, XFL-7, a été atténuée par excision du gène <i>prfA</i> essentiel à l'activation de la transcription des gènes de virulence (10403S Δ <i>prfA</i>) et complété par un gène <i>prfA</i> muté, moins actif, afin de maintenir une rétention <i>in vivo</i> . Dans le plasmide pGC-55, le promoteur <i>Lm hly</i> contrôle l'expression de la protéine de fusion tLLO-E7, une protéine d'approximativement 67 kDa. Le fragment tLLO du gène de fusion code les premiers 440 acides aminés de la listériolysine et est génétiquement fusionné au gène E7 en utilisant le site de restriction <i>XhoI</i> . Le plasmide pGG55 est retenu dans XFL-7 <i>in vivo</i> par l'expression de la protéine PrfA mutée.
axalimogén filolisbac	Cepa bacteriana viva atenuada de <i>Listeria monocytogenes</i> (Lm) recombinante secretando una proteína de fusión antígeno-adyuvante (tLLO-E7) que consiste en una listeriolisina O no-hemolítica (LLO truncada, tLLO), fusionada con la proteína E7 del papilomavirus humano de tipo 16 (HPV-16) contenida en el plásmido multicopia pGC-55. La cepa bacteriana utilizada, XFL-7, se ha atenuado por escisión del gen <i>prfA</i> esencial a la activación de la transcripción de los genes de virulencia (10403S Δ <i>prfA</i>) y completada por un gen <i>prfA</i> mutado, menos activo, con el fin de mantener la retención <i>in vivo</i> . En el plásmido pGC-55, el promotor <i>Lm hly</i> controla la expresión de la proteína de fusión tLLO-E7, una proteína de aproximadamente 67 kDa. El fragmento tLLO del gen de fusión codifica los primeros 440 aminoácidos de la listeriolisina y se fusiona genéticamente con el gen E7 utilizando el sitio de restricción <i>XhoI</i> . El plásmido pGG55 es retenido en XFL-7 <i>in vivo</i> por la expresión de la proteína PrfA mutada.
balixafortidum balixafortide	cyclo[L-alanyl-L-cysteinyl-L-seryl-L-alanyl-D-prolyl-(2S)-2,4-diaminobutanoyl-L-arginyl-L-tyrosyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-L-glutaminy-L-lysyl-D-prolyl-L-prolyl-L-tyrosyl-L-histidyl] (2-9)-disulfide
balixafortide	(2-9)-disulfure de cyclo[L-alanyl-L-cystéinyl-L-séryl-L-alanyl-D-prolyl-(2S)-2,4-diaminobutanoyl-L-arginyl-L-tyrosyl-L-cystéinyl-L-tyrosyl-L-glutaminy-L-lysyl-D-prolyl-L-prolyl-L-tyrosyl-L-histidyl]
balixafortida	(2-9)-disulfuro de ciclo[L-alanil-L-cisteinil-L-seril-L-alanil-D-prolil-(2S)-2,4-diaminobutanoil-L-arginil-L-tirosil-L-cisteinil-L-tirosil-L-glutaminil-L-lisil-D-prolil-L-prolil-L-tirosil-L-histidil]

**bovhyaluronidasum azoximerum #**

bovhyaluronidase azoximer

hyaluronidase-2 bovine (hyaluronoglucosaminidase-2, Hyal-2, EC 3.2.1.35) *Bos taurus* precursor protein linked to poly[[1-(carboxymethyl)piperazin-1-ium-1,4-diyl bromide]ethylene-co-[(piperazine-1,4-diyl 1-oxide)ethylene]] by an amido covalent bond

bovhyaluronidase azoximère

précurseur de la hyaluronidase-2 bovine (hyaluronoglucosaminidase-2, Hyal-2, EC 3.2.1.35) *Bos taurus* lié au poly[[bromure de 1-(carboxyméthyl)pipérazin-1-ium-1,4-diyl]éthylène-co-[(1-oxyde de pipérazin-1,4-diyl)éthylène]] par une liaison covalente amide

bovhialuronidasa azoxímero

precursor de la hialuronidasa-2 bovina (hialuronoglucosaminidasa-2, Hyal-2, EC 3.2.1.35) *Bos taurus* unido al poli[[bromuro de 1-(carboximetil)piperazin-1-io-1,4-diil]etileno-co-[(1-óxido de piperazin-1,4-diil)etileno]] por un enlace covalente amida


Hyal-2 *Bos taurus* seq. (H₂N-Enz) / Hyal-2 *Bos taurus* seq. (H₂N-Enz) / Hyal-2 *Bos taurus* seq. (H₂N-Enz)

MWTGLGPAVT LALVLVVAVA TELKPTAPPI FTGRPFVVAV DVPTQDCGPR 50
HKMPLDPKDM KAFDVQASPN EGFVNQNTI FYRDLGMYP HFNSVGRSVH 100
GGVPQNGSLW VHLEMLKGVH EHYIRTQEP AGLAVIDWEDW RPVWVRNWQD 150
KDVYRRLSRH LVAIRHPDWP PERVAKEAQY EFEFAARQFM LETLRFVKAF 200
RPRHLWGFYL FPDCCYNHDYV QNWETYTGR C PDVEVSRNDQ LAWLWAESTA 250
LFPSVYLEET LASSTHGRNF VSFRVQEARL VADVHHANHA LPVVVFTTRPT 300
YSRGLTGLSE MDLISTIGES AALGAAGVIL WGDAGFTTSN ETCRLKDYL 350
TRSLVPYVVN VSWAAQYCSW AQCHGHGRVC RRDPAHTFL HLSASSFLV 400
PSHAPDEPRL RPEGELSWAD RNHLQMHFRC QCYLWGWEQ CQWDRRAAG 450
GASGAWAGSH LTGLLAVAVL AFT 473

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
47-343 214-230 368-379 373-430 432-441

Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N)
Asn-77 Asn-106 Asn-340 Asn-360

Carrier & Hyal-2 (H₂N-Enz) / Transporteur & Hyal-2 (H₂N-Enz) / Transportador & Hyal-2 (H₂N-Enz)

**brolocizumabum #**

brolocizumab

immunoglobulin scFv, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, VEGF)], humanized monoclonal antibody single chain; scFv (1-252) [methionyl (1) -humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-5*01 (87.60%)-IGKJ2*01 E125>T (108), I126>V (109), K127>L (110) [6.3.12] (2-111) -21-mer (glycyl-tetrakis(tetraglycyl-seryl)) linker (112-132) -humanized VH (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (80.40%)- (IGHD)-IGHJ1*01 [9.7.13] (133-252)]

brolocizumab immunoglobuline scFv, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (facteur de croissance A de l'endothélium vasculaire, VEGF-A, VEGF)], anticorps monoclonal humanisé à chaîne unique;
scFv (1-252) [méthionyl (1) -V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-5*01 (87.60%)- IGKJ2*01 E125>T (108), I126>V (109), K127>L (110) [6.3.12] (2-111) -21-mer (glycyl-tétrakis(tétraglycyl-séryl)) linker (112-132) -VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (80.40%)-(IGHD)-IGHJ1*01 [9.7.13] (133-252)

brolocizumab inmuglobulina scFv, anti-[VEGFA de *Homo sapiens* (factor de crecimiento A del endotelio vascular, VEGF-A, VEGF)], anticuerpo monoclonal humanizado monocatenario;
scFv (1-252) [metionil (1) -V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-5*01 (87.60%)- IGKJ2*01E125>T (108), I126>V (109), K127>L (110) [6.3.12] (2-111) -21-mer (glicil-tetrakis(tetráglicil-seril)) conector (112-132) -VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (80.40%)-(IGHD)-IGHJ1*01 [9.7.13] (133-252)

```
MEIVMTQSPS  TLSASVGRDV  IITCQASEII  HSWLAWYQQK  PGKAPKLLIY  50
LASTLASGVP  SRFGSGSGGA  EFTLTISSLQ  PDDFATYYCQ  NVYLASTNGA  100
NFGQGTSLTV  LGGGGGSGGG  GSGGGSGGG  GSEVQLVESG  GGLVQPGGSL  150
RLSCTASGFS  LTDYYMTWV  RQAPGKLEW  VGFIDPDDPD  YYATWAKGRF  200
TISRDN SKNT  LYLQMNSLRA  EDTAVYYCAG  GDHNSGWGLD  IWGGTSLTV  250
SS  252
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-chain C23 C104 24-89 154-228

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
None


centanafadinum

centanafadine (1R,5S)-1-(naphthalen-2-yl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane

centanafadine (1R,5S)-1-(naphtalén-2-yl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane

centanafadina (1R,5S)-1-(naftalen-2-il)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane

C₁₅H₁₅N




crisaborolum

crisaborole 4-[(1-hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]benzonitrile

crisaborole 4-[(1-hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]benzonitrile

crisaborol 4-[(1-hidroxi-1,3-dihidro-2,1-benzoxaborol-5-il)oxil]benzonitrilo

C₁₄H₁₀BNO₃



dectrekumabum #
dectrekumab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL13 (interleukin 13, IL-13)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-33*01 (98.00%) -(IGHD)-IGHJ3*02) [8.8.13] (1-120) -IGHG1*03 (CH1 (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-216')-disulfide with kappa light chain (1'-216') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-11*01 (95.80%) -IGKJ2*01) [6.3.11] (1'-109') -IGKC*01 (110'-216')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide

dectrékumab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL13 (interleukine 13, IL-13)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-33*01 (98.00%) -(IGHD)-IGHJ3*02) [8.8.13] (1-120) -IGHG1*03 (CH1 (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-216')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-216') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-11*01 (95.80%) -IGKJ2*01) [6.3.11] (1'-109') -IGKC*01 (110'-216')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure

dectrekumab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[IL13 de *Homo sapiens* (interleukina 13, IL-13)], anticuerpo monoclonal de *Homo sapiens*;
cadena pesada gamma1 (1-450) [VH de *Homo sapiens* (IGHV3-33*01 (98.00%) -(IGHD)-IGHJ3*02) [8.8.13] (1-120) -IGHG1*03 (CH1 (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-216')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-216') [V-KAPPA de *Homo sapiens* (IGKV3-11*01 (95.80%) -IGKJ2*01) [6.3.11] (1'-109') -IGKC*01 (110'-216')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLVESGGG VVQPGKSLRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKLEWVAI 50
IWYDGSNKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARLW 100
FGDLDAFDIW GQGTMTVTSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAAIGCLVK 150
DYFPEPTVTS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
YICNVNHKPS NTKVDKRVFP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP 250
KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KARGQPREPQ 350
VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTFPV 400
LDSGDSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
EIVLTQSPAT LSLSPGERAI LSCRAGQSVS SYLVWYQQKP GQAPRLLIYD 50
ASNRATGIPA RPSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYVCQQ RSSWPPVYTF 100
GQGTKLEIKR TVAAPSFIFF PPSDEQLKSG TASVCLLNN FYPREKAVQW 150
KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSST LTLISKADYEK HKVYACEVTH 200
QGLSSPPTKS FNRGEC 216
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"

Intra-L (C23-C104) 23'-88" 136'-196"
23"-88" 136"-196"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 223-216' 223"-216"

Inter-H-H (h 11, h 14) 229-229" 232-232"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
300, 300'

Other post-translational modifications / Autres modifications post-traductionnelles / Otras modificaciones post-traduccionales

H CHS K2 C-terminal lysine clipping:
450, 450'

desfesoterodinium


desfesoterodine

2-[(1*R*)-3-[bis(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenol

desfésotérodine

2-[(1*R*)-3-[bis(propan-2-yl)amino]-1-phénylpropyl]-4-(hydroxyméthyl)phenol

desfesoterodina

2-[(1*R*)-3-[bis(propan-2-il)amino]-1-fenilpropil]-4-(hidroximetil)fenolC₂₂H₃₁NO₂**deutetrabenazinum**


deutetrabenazine

rac-(3*R*,11*bR*)-9,10-di[(²H₃)methoxy]-3-(2-methylpropyl)-1,3,4,6,7,11*b*-hexahydro-2*H*-pyrido[2,1-*a*]isoquinolin-2-one

deutétrabénazine

rac-(3*R*,11*bR*)-9,10-di[(²H₃)méthoxy]-3-(2-méthylpropyl)-1,3,4,6,7,11*b*-hexahydro-2*H*-pyrido[2,1-*a*]isoquinoléin-2-one

deutetrabenazina

rac-(3*R*,11*bR*)-3-(2-metilpropi)-9,10-di[(²H₃)metoxi]-1,3,4,6,7,11*b*-hexahidro-2*H*-pirido[2,1-*a*]isoquinolein-2-onaC₁₉H₂₁(²H₆)NO₃**durvalumabum #**

durvalumab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD274 (programmed death ligand 1, PDL1, PD-L1, B7 homolog 1, B7H1)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-451) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-7*01 (99.00%) - (IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.14] (1-121) - IGHG1*03 (CH1 (122-219), hinge (220-234), CH2 (235-344) L1.3>F (238), L1.2>E (239), P116>S (335), CH3 (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-215')-disulfide with kappa light chain (1'-215')] [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20*01 (96.90%) - IGKJ1*01) [7.3.9] (1'-108') - IGKC*01 (109'-215')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide

durvalumab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD274 (ligand 1 de mort programmée, PDL1, PD-L1, homologue 1 de B7, B7H1)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-451) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-7*01 (99.00%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.14] (1-121) -IGHG1*03 (CH1 (122-219), charnière (220-234), CH2 (235-344) L1.3>F (238), L1.2>E (239), P116>S (335), CH3 (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-215') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20*01 (96.90%) -IGKJ1*01) [7.3.9] (1'-108') -IGKC*01 (109'-215')]; dimère (230-230'':233-233'')-bisdisulfure

durvalumab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD274 (ligando 1 de muerte programada, PDL1, PD-L1, homólogo 1 de B7, B7H1)], anticuerpo monoclonal de *Homo sapiens*; cadena pesada gamma1 (1-451) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-7*01 (99.00%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.14] (1-121) -IGHG1*03 (CH1 (122-219), bisagra (220-234), CH2 (235-344) L1.3>F (238), L1.2>E (239), P116>S (335), CH3 (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-215') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20*01 (96.90%) -IGKJ1*01) [7.3.9] (1'-108') -IGKC*01 (109'-215')]; dímero (230-230'':233-233'')-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS RYWMSWVRQA PGKGLEWVAN 50
IKQDGSEKYY VDSVKGRTFI SRDANKNSLY LQMSLRAED TAVYYCAREG 100
GWFGELAFDY WQGGLTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV 150
KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ 200
TYICNVNHKP SNTKVDKRVK PKSCDKTHTC PPCPAPEFEG GPSVFLFPFK 250
PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300
NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPASIETKI SKAKGQPREP 350
QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPPP 400
VLDSGDGFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFCSS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG 450
K 451
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQVRV SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY 50
DASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSFPWTFG 100
QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK 150
VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYSLSTL TLISKADYEKH KVAACEVTHQ 200
GLSSPVTKSF NRGEK 215
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disul

Intra-H (C23-C104) 22-96 148-204 265-325 371-429
 22"-96" 148"-204" 265"-325" 371"-429"
 Intra-L (C23-C104) 23'-89' 135'-195'
 23'''-89''' 135'''-195'''
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 224-215' 224"-215"
 Inter-H-H (h 11, h 14) 230-230' 233-233"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
 301, 301"

elafibranor

elafibranor


2-(2,6-dimethyl-4-{3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-3-oxoprop-1-en-1-yl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid

élafibranor

acide 2-(2,6-diméthyl-4-{3-[4-(méthylsulfonyl)phényl]-3-oxoprop-1-én-1-yl}phénoxy)-2-méthylpropanoïque

elafibranor

ácido 2-(2,6-dimetil-4-[3-[4-(metilsulfanil)fenil]-3-oxoprop-1-en-1-il]fenoxi)-2-metilpropanoico

 $C_{22}H_{24}O_4S$ 

eleclazinum


eleclazine

4-[(pyrimidin-2-yl)methyl]-7-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3,4-dihydro-1,4-benzoxazepin-5(2*H*)-one

éléclazine

4-[(pyrimidin-2-yl)méthyl]-7-[4-(trifluorométhoxy)phényl]-3,4-dihydro-1,4-benzoxazépin-5(2*H*)-one

eleclazina

4-[(pirimidin-2-il)metil]-7-[4-(trifluorometoxi)fenil]-3,4-dihidro-1,4-benzoxazepin-5(2*H*)-ona $C_{21}H_{16}F_3N_3O_3$ 

elgemtumabum #

elgemtumab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ERBB3 (receptor tyrosine-protein kinase erbB-3, HER3)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (94.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.10] (1-117) -IGHG1*03 (CH1 (118-215), hinge (216-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-12*01 (94.70%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimer (226-226'':229-229'')-bisdisulfide

elgemtumab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ERBB3 (récepteur à activité tyrosine kinase erbB-3, HER3)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (94.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.10] (1-117) -IGHG1*03 (CH1 (118-215), charnière (216-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-12*01 (94.70%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimère (226-226'':229-229'')-bisdisulfure

elgemtumab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[ERBB3 de *Homo sapiens* (receptor tirosina-proteína kinasa erbB-3, HER3)], anticuerpo monoclonal de *Homo sapiens*; cadena pesada gamma1 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (94.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.10] (1-117) -IGHG1*03 (CH1 (118-215), bisagra (216-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-12*01 (94.70%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dímero (226-226":229-229")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLLESQGG LVQPGGSLRL SCASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA 50
 INSQKGSTYY ADSVKGRFTI SRDYSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARWG 100
 DEGFDIWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSRSTSGGTA ALGCLVKDYF 150
 PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC 200
 NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT 250
 LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY 300
 RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT 350
 LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPPVLD 400
 DGSFFLYSKL TVDKSRWQGG NVFSCSVMEH ALHNHYTQKS LSLSPGK 447

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS NWLAWYQQKP GKAPKLLIYG 50
 ASLQSGSPFS RPSGSGSTTD FTLTISSLQF EDFATYVQQ YSFPPTFGQ 100
 CTKELEKRTV AAPSVEIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY BREAKVONKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
 LSPFVTKSFN RGEC 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 144-200 261-321 367-425
 22"-96" 144"-200" 261"-321" 367"-425"
 Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'
 23'''-88''' 134'''-194'''
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 220-214' 220"-214"
 Inter-H-H (h 11, h 14) 226-226" 229-229"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4:
 297, 297"

Other post-translational modifications / Autres modifications post-traductionnelles / Otras modificaciones post-traduccionales
 H CHS K2 C-terminal lysine clipping:
 447, 447"

emeramidum
 emeramide

N^1, N^3 -bis(2-sulfanylethyl)benzene-1,3-dicarboxamide


éméramide

N^1, N^3 -bis(2-sulfanylethyl)benzène-1,3-dicarboxamide

emeramida

N^1, N^3 -bis(2-sulfaniletil)benceno-1,3-dicarboxamida

$C_{12}H_{16}N_2O_2S_2$





epetraborolum
 epetraborole

(3S)-3-(aminomethyl)-7-(3-hydroxypropoxy)-
 2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol

épétraborole

(3S)-3-(aminométhyl)-7-(3-hydroxypropoxy)-
 2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol

epetraborol	(3 <i>S</i>)-3-(aminometil)-7-(3-hidroxiropoxi)-2,1-benzoxaborol-1(3 <i>H</i>)-ol $C_{11}H_{16}BNO_4$ 
eprociclovirum eprociclovir	2-amino-9-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1,2-bis(hydroxymethyl)cyclopropyl]methyl]-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-one
éprociclovir	2-amino-9-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1,2-bis(hydroxyméthyl)cyclopropyl]méthyl]-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-one
eprociclovir	2-amino-9-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1,2-bis(hidroxitetil)ciclopropil]metil]-1,9-dihidro-6 <i>H</i> -purin-6-ona $C_{11}H_{15}N_5O_3$ 
eptacogum beta (activatum) # eptacog beta (activated)	recombinant DNA derived blood-coagulation factor VII (activated), extracted from transgenic rabbits' milk: blood-coagulation factor VII (EC 3.4.21.21, proconvertin, serum prothrombin conversion accelerator), human factor VII light chain (135-262)-disulfide with human factor VII heavy chain
eptacog bêta (activé)	facteur VII de la coagulation sanguine (activé) à partir d'ADN recombinant, extrait du lait de lapins transgéniques: facteur VII de la coagulation sanguine (EC3.4.21.21, proconvertine, accélérateur de conversion de la prothrombine sérique), (135-262) disulfure entre la chaîne légère et la chaîne lourde du facteur VII humain, glycoforme beta
eptacog beta (activado)	factor VII de la coagulación sanguínea (activado) a partir de ADN recombinante, extraído de leche de conejas transgénicas: factor VII de la coagulación sanguínea (EC 3.4.21.21, proconvertina, acelerador de conversión de la protrombina sérica), (135-262) disulfuro entre la cadena ligera y la cadena pesada del factor VII humano, glicoforma beta

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

ANAFLEELRP GSLERECKEE QCSFEEAREI FKDAERTKLF WISYSDGDQC 50
 ASSPCQNGGS CKDQLQSYIC FCLPAFEGERN CETHKDDQLI CVNENGCEQ 100
 YCSDHTGTKR SCRCHEGYSL LADGVSTPT VEYPCGKIPI LEKFNASKPQ 150
 GR 182


Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

IVGGKVCVP KGECPWQVLL LVNGAQLCGG TLINTIWVVS AAHCFDKIKN 200
 WRNLIAVLGE HDLSEHDGDE QSRRAQVII PSTYVPGTTN HDIALRLHQ 250
 PVVLTDHVVP LCLPERTFSE RTLAFVRFSL VSGWGQLLDR GATALELMVL 300
 NVPRLMTQDC LQQSRKVGDS PNITEYMFCA GYSDGSKDSC KGDSGGPHAT 350
 HYRGTWYLTG IVSWGQGCAT VGHFVYTRV SQYIEWLQKL MRSEPRPGVL 400
 LRAPFF 466

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

17-22 50-61 55-70 72-81 91-102 98-112
 114-127 135-262 159-164 178-194 310-329 340-368

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



Glycosylation sites (S, N) / Sites de glycosylation (S, N) / Posiciones de glicosilación (S, N)
 Ser-52 Ser-60 Asn-145 Asn-322

etelcalcetidium

etelcalcetide


N-acetyl-D-cysteinyl-D-alanyl-D-arginyl-D-arginyl-D-arginyl-D-alanyl-D-argininamide disulfide with L-cystein

ételcalcétide

disulfure entre le *N*-acétyl-D-cystéinyl-D-alanyl-D-arginyl-D-arginyl-D-arginyl-D-alanyl-D-argininamide et la L-cystéine

etelcalcetida

disulfuro entre el *N*-acetil-D-cisteinil-D-alanil-D-arginil-D-arginil-D-arginil-D-alanil-D-argininamida y la L-cisteina

**evinacumabum #**

evinacumab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* ANGPTL3 (angiopoietin-like 3)], human monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-453) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-43*02 (92.90%) -(IGHD)-IGHJ3*02) [8.8.19](1-126) -IGHG4*01 (CH1(127-224), hinge S10>P(234) (225-236), CH2 (237-346), CH3(347-451), CHS (452-453)) (127-453)], (140-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* (V-KAPPA (IGKV1-5*03 (98.90%) -IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214'))]; dimer (232-232":235-235")-bisdisulfide

évinacumab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* ANGPTL3 (angiopoïétine-like 3)], anticorps monoclonal humain; chaîne lourde gamma4 (1-453) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-43*02 (92.90%) -(IGHD)-IGHJ3*02) [8.8.19] (1-126) -IGHG4*01 (CH1 (127-224), charnière S10>P (234) (225-236), CH2 (237-346), CH3 (347-451), CHS (452-453)) (127-453)], (140-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* (V-KAPPA (IGKV1-5*03 (98.90%) -IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214'))]; dimère (232-232":235-235")-bisdisulfure

evinacumab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[ANGPTL3 (angiopoyetina-like 3) *de Homo sapiens*], anticuerpo monoclonal humano; cadena pesada gamma4 (1-453) [VH de *Homo sapiens* (IGHV3-43*02 (92.90%) -(IGHD)-IGHJ3*02) [8.8.19] (1-126) -IGHG4*01 (CH1 (127-224), bisagra S10>P (234) (225-236), CH2 (237-346), CH3 (347-451), CHS (452-453)) (127-453)], (140-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* (V-KAPPA (IGKV1-5*03 (98.90%) -IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214'))]; dímero (232-232":235-235")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLVESGGG VIQPGGSLRL SCAASGFTFD DYAMNWVRQG PGKGLEWVSA 50
 ISGDLGGSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNSLY LQMNLSRAED TAFYCAKDL 100
 RNTIFGVVIP DAFDIWQGT MVTSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA 150
 LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVTPSS 200
 SLGKTITYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYG PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP 250
 PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE 300
 QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR 350
 EPQVYTLPPS QEEMTKNQS LTCIVKGFYP SDIAVEWESN GPENNYKTT 400
 PFVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSMHEALHN HYTQKSLSL 450
 LGK 453

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIQMTQSPST LSASVGRDVT ITCRASQSTR SWLAWYQKPK GKAPKLLIYK 50
 ASSLESGVPS RFGSGSGSTE FTLTISLQPD DDFATYYCQQ YNSYSYTFGQ 100
 GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWVKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEK 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 153-209 267-327 373-431
 22"-96" 153"-209" 267"-327" 373"-431"
 Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'
 23'"-88'" 134'"-194'"
 Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 140-214' 140"-214"
 Inter-H-H (h 8, h 11) 232-232" 235-235"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4:
 303, 303"

flutafuranolum (¹⁸F)
 flutafuranol (¹⁸F)

2-{2-[¹⁸F]fluoro-6-(methylamino)pyridin-3-yl}-1-benzofuran-5-ol


flutafuranol (¹⁸F)

2-{2-[¹⁸F]fluoro-6-(méthylamino)pyridin-3-yl}-1-benzofuran-5-ol

flutafuranol (¹⁸F)


2-{2-[¹⁸F]fluoro-6-(metilamino)piridin-3-il}-1-benzofuran-5-ol

C₁₄H₁₁¹⁸FN₂O₂




follitropinum delta #
 follitropin delta

recombinant DNA derived heterodimer of human glycoprotein hormones alpha chain and follitropin subunit beta (FSH-beta) follicle-stimulating hormone, expressed in PER.C6 cells, glycoform delta

folitropine delta	hétérodimère constitué de la chaîne alpha des hormones glycoprotéiques et de la sous-unité bêta de la follitropine (HFS-bêta) humaines, hormone folliculostimulante, exprimée dans les cellules PER.C6 à partir d'ADN recombinant, forme glycosylée delta
folitropina delta	heterodímero constituido por la cadena alfa de las hormonas glicoproteicas y la subunidad beta de la follitropina (HFS-beta) humanas, hormona estimulante del folículo, expresada en células PER.C6 a partir de ADN recombinante, forma glicosilada delta
	alpha chain / chaîne alpha / cadena alfa APDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFRAYPTP LRSKKTMLVQ 50 KNVTSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT ACHCSTCYH KS 92 beta chain / chaîne bêta / cadena beta NSCELTNITI ALEKEECRFC ISINTTWCAG YCYTRDLVYK DPAPRKIQKT 50' CTFKELVYET VRVPGCAHHA DSLITYFPVAT QCHCGKCDSD STDCTVRGLG 100' PSYCSFGEMK E 111' Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro 7-31 10-60 28-82 32-84 59-87 3'-51' 17'-66' 20'-104' 28'-82' 32'-84' 87'-94' Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N) Asn-52 Asn-78 Asn-7' Asn-24'
gepotidacinum gepotidacin	(2 <i>R</i>)-2-[(4-[(3,4-dihydro-2 <i>H</i> -pyrano[2,3- <i>c</i>]pyridin-6-yl)methyl]amino)piperidin-1-yl)methyl]-1,2-dihydro-3 <i>H</i> ,8 <i>H</i> -2a,5,8a-triazaacenaphthylene-3,8-dione
gépotidacine	(2 <i>R</i>)-2-[(4-[(3,4-dihydro-2 <i>H</i> -pyrano[2,3- <i>c</i>]pyridin-6-yl)méthyl]amino)pipéridin-1-yl)méthyl]-1,2-dihydro-3 <i>H</i> ,8 <i>H</i> -2a,5,8a-triazaacénaphthylène-3,8-dione
gepotidacina	(2 <i>R</i>)-2-[(4-[(3,4-dihidro-2 <i>H</i> -pirano[2,3- <i>c</i>]piridin-6-il)metil]amino)piperidin-1-il)metil]-1,2-dihidro-3 <i>H</i> ,8 <i>H</i> -2a,5,8a-triazaacenaftileno-3,8-diona
	$C_{24}H_{28}N_6O_3$ 
gilteritinibum gilteritinib	6-ethyl-3-{3-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino}-5-[(oxan-4-yl)amino]pyrazine-2-carboxamide
giltéritinib	6-éthyl-3-{3-méthoxy-4-[4-(4-méthylpipérazin-1-yl)pipéridin-1-yl]anilino}-5-[(oxan-4-yl)amino]pyrazine-2-carboxamide

gilteritinib

6-etil-3-{4-[4-(4-metilpiperazin-1-il)piperidin-1-il]-3-metoxianilino}-5-[(oxan-4-il)amino]pirazina-2-carboxamida

 $C_{29}H_{44}N_8O_3$ 

indimilastum


indimilast

N-{*cis*-4-[1-(4'-[(3*R*,5*S*)-3,5-dimetilpiperazin-1-yl]metil)][1,1'-biphenil]-3-yl]-6-fluoro-2,4-dioxo-1,4-dihidropirido[2,3-*d*]pirimidin-3(2*H*)-yl]ciclohexil}-2-metil-1,3-tiazol-4-carboxamida

indimilast

N-{*cis*-4-[1-(4'-[(3*R*,5*S*)-3,5-diméthylpipérazin-1-yl]méthyl)][1,1'-biphényl]-3-yl]-6-fluoro-2,4-dioxo-1,4-dihidropirido[2,3-*d*]pyrimidin-3(2*H*)-yl]cyclohexyl}-2-méthyl-1,3-thiazol-4-carboxamida

indimilast

N-{*cis*-4-[1-(4'-[(3*R*,5*S*)-3,5-dimetilpiperazin-1-il]metil)][1,1'-bifenil]-3-il]-6-fluoro-2,4-dioxo-1,4-dihidropirido[2,3-*d*]pirimidin-3(2*H*)-il]ciclohexil}-2-metil-1,3-tiazol-4-carboxamida $C_{37}H_{40}FN_7O_3S$ 

indusatumabum #

indusatumab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* GUCY2C (guanylate cyclase 2C, guanylyl cyclase C, GCC, guanylate cyclase C, GC-C, heat-stable enterotoxin receptor, hSTAR, intestinal guanylate cyclase)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-34*01 (94.80%) -(IGHD)-IGHJ1*01) [8.7.13] (1-119)-IGHG1*01 (CH1 (120-217), hinge (218-232), CH2 (233-342), CH3 (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-15*01 (95.80%) -IGKJ1*01 K123>N (103) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimer (228-228''-231-231'')-bisdisulfide

indusatumab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* GUCY2C (guanylate cyclase 2C, guanylyl cyclase C, GCC, guanylate cyclase C, GC-C, récepteur d'entérotoxine résistante à la chaleur, hSTAR, guanylate cyclase intestinale)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-34*01 (94.80%) -(IGHD)-IGHJ1*01) [8.7.13] (1-119)-IGHG1*01 (CH1 (120-217), charnière (218-232), CH2 (233-342), CH3 (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa
(1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-15*01 (95.80%) -IGKJ1*01 K123>N (103) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure

indusatumab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[GUCY2C de *Homo sapiens* (guanilato ciclase 2C, guanilil ciclase C, GCC, guanilato ciclase C, GC-C, receptor de enterotoxina resistente al calor, hSTAR, guanilato ciclase intestinal)], anticuerpo monoclonal de *Homo sapiens*;
cadena pesada gamma1 (1-449) [VH de *Homo sapiens* (IGHV4-34*01 (94.80%) -(IGHD)-IGHJ1*01) [8.7.13] (1-119)-IGHG1*01 (CH1 (120-217), bisagra (218-232), CH2 (233-342), CH3 (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa
(1'-214') [V-KAPPA de *Homo sapiens* (IGKV3-15*01 (95.80%) -IGKJ1*01 K123>N (103) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLQQWAG	LLKPSETLSL	TCAVFGGSFY	GYYSWSIRQP	PGKGLEWIGE	50
INHRGNTNDN	PSLKSRTVIS	VDTSRKNQFAL	KLSSVTAADT	AVYYCARERG	100
YTYGNFDHWG	QGTLLVTVSSA	STKGPSVFPL	APSSKSTSGG	TAALGCLVKD	150
YFPEPVTVSW	NSGALTSGVH	TFFAVLQSSG	LYSLSSVTV	PSSSLGTQTY	200
ICNVNKKFSN	TKVDKKVEPK	SCDKTHTCPP	CPAPELLGGP	SVLPFPRPK	250
DTLMISRPE	VTQVVDVSH	EDPEVKFNWY	VDGVEVHNAK	TKPREEQYNS	300
TYRVVSVLTV	LHQDMLNGKE	YKCKVSNKAL	PAPIETKISK	AKGQPREPQV	350
YTLPPSRDEL	TKNQVSLTCL	VKGFPYPSDIA	VENESNQGP	NNYKTTTPVL	400
DSDGSFFLYS	KLTVDKSRWQ	QGNVFSCSVM	HEALHNHYTQ	KSLSLSPGK	449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

EIVMTQSPAT	LSVSPGERAT	LSCRASQSVS	RNLAWYQQKQ	GQAPRLLIYG	50
ASTRATGIPA	RFGSGSGSTE	FTLTIGSLQS	EDFAVYYCQ	YKTPRTFGQ	100
GTNVEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNIFY	PREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSLSTLT	LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	200
LSSPVTKSFN	RGEC				214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22"-95"	146"-202"	263"-323"	369"-427"
Intra-L (C23-C104)	23"-88"	146"-202"	263"-323"	369"-427"
	23"-88"	134"-194"		
	23"-88"	134"-194"		

Inter-H-L (h 5-CL 126)	222"-214"	222"-214"
------------------------	-----------	-----------

Inter-H-H (h 11, h 14)	228"-228"	231"-231"
------------------------	-----------	-----------

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
299, 299"

indusatumabum vedotinum

indusatumab vedotin

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* GUCY2C (guanylate cyclase 2C, guanylyl cyclase C, GCC, guanylate cyclase C, GC-C, heat-stable enterotoxin receptor, hSTAR, intestinal guanylate cyclase)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-34*01 (94.80%) -(IGHD)-IGHJ1*01) [8.7.13] (1-119)-IGHG1*01 (CH1 (120-217), hinge (218-232), CH2 (233-342), CH3 (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-15*01 (95.80%) -IGKJ1*01 K123>N (103) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimer (228-228":231-231")-bisdisulfide; conjugated, on an average of 3 to 4 cysteinyl, to monomethylauristatin E (MMAE), via a cleavable maleimidocaproyl-valyl-citrullinyl-*p*-aminobenzyloxycarbonyl (mc-val-cit-PABC) type linker
For the vedotin part, please refer to the document "INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others".

indusatumab védotine

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* GUCY2C (guanylate cyclase 2C, guanylyl cyclase C, GCC, guanylate cyclase C, GC-C, récepteur d'entérotoxine résistante à la chaleur, hSTAR, guanylate cyclase intestinale)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-34*01 (94.80%) -(IGHD)-IGHJ1*01) [8.7.13] (1-119)-IGHG1*01 (CH1 (120-217), charnière (218-232), CH2 (233-342), CH3 (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-15*01 (95.80%) -IGKJ1*01 K123>N (103) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimère (228-228'':231-231'')-bisdisulfure; conjugué, sur 3 à 4 cystéinyl en moyenne, au monométhylauristatine E (MMAE), via un linker clivable de type maléimidocaproyl-valyl-citrullinyl-*p*-aminobenzoyloxycarbonyl (mc-val-cit-PABC)
Pour la partie *védotine*, veuillez-vous référer au document "INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others".

indusatumab vedotina

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[GUCY2C de *Homo sapiens* (guailato ciclase 2C, guanilil ciclase C, GCC, guanilato ciclase C, GC-C, receptor de enterotoxina resistente al calor, hSTAR, guanilato ciclase intestinal)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1 (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-34*01 (94.80%) -(IGHD)-IGHJ1*01) [8.7.13] (1-119) -IGHG1*01 (CH1 (120-217), bisagra (218-232), CH2 (233-342), CH3 (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-15*01 (95.80%) -IGKJ1*01 K123>N (103) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dímero (228-228'':231-231'')-bisdisulfuro; conjugada, en una media de 3 a 4 cisteinil, con monometilauristatina E (MMAE), mediante un conector escindible de tipo maleimidocaproyl-valil-citrulinil-*p*-aminobenziloxycarbonil (mc-val-cit-PABC)
La fracción vedotina, pueden encontrarla en el documento "INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others".

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLQWAGG LLKPSSETLSL TCAVGGSSFS GYYWSWIRQP PGKGLEWIGE 50
INHRGNTNDN PSLKSRVTIS VDTSKNQFAL KLSSVTAADT AVYYCARERG 100
YTYGNDFHWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPAL APSSKSTSGG TAALGCLVKD 150
YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFFPAVLQSSG LYSLSSTVTV PSSSLGTQTY 200
ICNVNHKPSN TKVDKKVPEK SCDKTHCTCP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK 250
DTLMISRTP E VTCVVDVSH EDPEVKFNMY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS 300
TYRVVSVLTV LHQDNLNGKE YKCKVSNKAL PAPIETISK AKGQPREPQV 350
YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VRGFPYSDIA VEWESNGQPE NNYKTPFPVL 400
DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFCSVM HEALHNYHTQ KSLSLSPGK 449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSVS RNLAWYQQKPK GQAPRLLIYG 50
ASTRATGIPA RFGSGSGSTE FTLTIGSLQS EDFAVYYCQK YKTPWRTFGQ 100
GTNVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNFEY PREAKVQWVK 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYERHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-95 146-202 263-323 369-427

22"-95" 146"-202" 263"-323" 369"-427"

Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194"

23'''-88''' 134'''-194'''

Inter-H-L* (h 5-CL 126) 222-214' 222"-214'"

Inter-H-H* (h 11, h 14) 228-228" 231-231"

*Two or three of the inter-chain disulfide bridges are not present, an average of 3 to

4 cysteinyl being conjugated each via a thioether bond to a drug linker.

*Deux ou trois des ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas présents, 3 à 4 cystéinyl

en moyenne étant chacun conjugué via une liaison thioéther à un linker-principe actif.

*Faltan dos o tres puentes disulfuro inter-catenarios, una media de 3 a 4 cisteinil está

conjugada a conectores de principio activo.

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

299, 299"

infigratinibum

infigratinib


N'-(2,6-dichloro-3,5-dimethoxyphenyl)-*N*-(6-[4-(4-ethylpiperazin-1-yl)anilino]pyrimidin-4-yl)-*N*-methylurea

infigratinib

N'-(2,6-dichloro-3,5-diméthoxyphényl)-*N*-(6-[4-(4-éthylpipérazin-1-yl)anilino]pyrimidin-4-yl)-*N*-méthylurée

infigratinib

N'-(2,6-dicloro-3,5-dimetoxifenil)-*N*-(6-[4-(4-etilpiperazin-1-il)anilino]pirimidin-4-il)-*N*-metilurea

 $C_{26}H_{31}Cl_2N_7O_3$
**isatuximabum #**

isatuximab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD38 (ADP-ribosyl cyclase 1, cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, T10)], chimeric monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-450) [*Mus musculus* VH (IGHV1-7*01 (80.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-17*01 (89.50%) -IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide

isatuximab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD38 (ADP-ribosyl cyclase 1, ADP-ribose cyclique hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, T10)], anticorps monoclonal chimérique; chaîne lourde gamma1 (1-450) [*Mus musculus* VH (IGHV1-7*01 (80.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-17*01 (89.50%) -IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure

isatuximab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[CD38 de *Homo sapiens* (ADP-ribosil ciclaza 1, hidrolasa 1 de ADP-ribosa cíclica, cADPr hidrolasa 1, T10)], anticuerpo monoclonal quimérico; cadena pesada gamma1 (1-450) [*Mus musculus* VH (IGHV1-7*01 (80.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-17*01 (89.50%) -IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 QVQLVQSGAE VAKPGTSVKL SCKASGYTFT DYWMQWVKQR PGQGLEWIGT 50
 IYPGDGDTGY AQKFGKATL TADKSSKTVY MHLSSLASE SAVYYCARGD 100
 YYGNSLDYW GQGTSTVTSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
 DYFPEPTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVT VPSSSLGTQT 200
 YICNVNHPKS NTKVDKKVEP KSCDKHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP 250
 KDTLMISRTPEVTCVVVDV HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
 STYRVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ 350
 VYTLPPSRDE LTKNQVSLTLC LVKGFPSTDI AVEWESNGQP ENNYKTPPV 400
 LQSDGSEFLY SKLTVDKSRW QQGNVFCSCV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIVMTQSHLS MSTSLGDPVS ITCKASQDVSV TVVAVYQQKP QGSPRLIYS 50
 ASYRYIGVDP RFTGSGAGTD FTFTISSVQA EDLAVYYCQ HYSPPTFGG 100
 GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLNNFY PREAKVQWKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEC 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
 22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"
 Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
 23"-88" 134"-194"
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 223-214' 223"-214"
 Inter-H-H (h 11, h 14) 229-229" 232-232"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4:
 300, 300"

lanopepdenum

lanopepden


N-[*(2R)*-2-(cyclopentylmethyl)-3-(2-{5-fluoro-6-[(9*aS*)-hexahydropyrazino[2,1-*c*][1,4]oxazin-8(1*H*)-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}hydrazin-1-yl)-3-oxopropyl]-*N*-hydroxyformamide

lanopepdène

N-[*(2R)*-2-(cyclopentylméthyl)-3-(2-{5-fluoro-6-[(9*aS*)-hexahydropyrazino[2,1-*c*][1,4]oxazin-8(1*H*)-yl]-2-méthylpyrimidin-4-yl}hydrazin-1-yl)-3-oxopropyl]-*N*-hydroxyformamide

lanopepdén

N-[*(2R)*-2-(ciclopentilmetil)-3-(2-{5-fluoro-6-[(9*aS*)-hexahidropirazino[2,1-*c*][1,4]oxazin-8(1*H*)-il]-2-metilpirimidin-4-il}hidrazin-1-il)-3-oxopropil]-*N*-hidroxiformamida

C₂₂H₃₄FN₇O₄**lascefloxacinum**

lascefloxacin


7-[(3*S*,4*S*)-3-[(cyclopropylamino)methyl]-4-fluoropyrrolidin-1-yl]-6-fluoro-1-(2-fluoroethyl)-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid

lascefloxacin

acide 7-[(3*S*,4*S*)-3-[(cyclopropylamino)méthyl]-4-fluoropyrrolidin-1-yl]-6-fluoro-1-(2-fluoroéthyl)-8-méthoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

lascufloxacin

ácido 7-[(3*S*,4*S*)-3-[(ciclopropilamino)metil]-4-fluoropirrolidin-1-il]-6-fluoro-1-(2-fluoroetil)-8-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinoleína-3-carboxílico

C₂₁H₂₄F₃N₃O₄

lavamilastum

lavamilast


4-[(3,5-dichloropyridin-4-yl)amino]-7-metoxi-8-[[6-(morpholin-4-yl)hexil]oxy]quinolin-2(1*H*)-one

lavamilast

4-[(3,5-dichloropyridin-4-yl)amino]-7-méthoxy-8-[[6-(morpholin-4-yl)hexil]oxy]quinoléin-2(1*H*)-one

lavamilast

4-[(3,5-dicloropiridin-4-il)amino]-7-metoxi-8-[[6-(morfolin-4-il)hexil]oxi]quinolein-2(1*H*)-ona

C₂₅H₃₀Cl₂N₄O₄

lilotomabum #

lilotomab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD37(TSPAN26, tetraspanin-26)], *Mus musculus* monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-443) [*Mus musculus* VH (IGHV1S135*01 (96.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*01 (CH1 E84>Q (177), P95>T (193), R96>W (194) (120-216), hinge (217-229), CH2 (230-336), CH3 N84.2>D (395), N84.4>D (397) (337-441), CHS (442-443)) (120-443)], (221-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-25*01 (93.70%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimer (223-223":226-226":228-228")-trisdisulfide

lilotomab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD37 (TSPAN26, tétraspanine-26)], *Mus musculus* anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-443) [*Mus musculus* VH (IGHV1S135*01 (96.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*01 (CH1 E84>Q (177), P95>T (193), R96>W (194) (120-216), charnière (217-229), CH2 (230-336), CH3 N84.2>D (395), N84.4>D (397) (337-441), CHS (442-443)) (120-443)], (221-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-25*01 (93.70%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimère (223-223":226-226":228-228")-trisdisulfure

lilotomab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[CD37 de *Homo sapiens* (TSPAN26, tetraspanina-26)], anticuerpo monoclonal de *Mus musculus*;
cadena pesada gamma1 (1-443) [VH de *Mus musculus* (IGHV1S135*01 (96.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*01 (CH1 E84>Q (177), P95>T (193), R96>W (194) (120-216), bisagra (217-229), CH2 (230-336), CH3 N84.2>D (395), N84.4>D (397) (337-441), CHS (442-443)) (120-443)], (221-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-25*01 (93.70%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dímero (223-223":226-226":228-228")-trisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```

EIQLQQSGPE LVKPGASVKV SCASGYSTF DYNMYWVKQS HGKSLIEWIGY 50
IDPYNGDTTY NQKFKGKATL TVDKSSSTAF IHLNLSLSED SAVYYCARSP 100
YGHYAMDYWG QGTSVTVSSA KTTTPSVYPL APGSAQTNS MVTLGCLVKG 150
YFPEPVTVTW NSGSLSSGVH TFFAVLQSDL YTLSSSVTVF SSTWPSSETV 200
CNVAHPASST KVDKKIVPRD CGCKPCICTV PEVSSVFIFP PKFKDVLIT 250
LTPKVTGVVV DISKDDPEVQ FSWFVDDDEV HTAQIQPRE QFNSTFRSVS 300
ELPMBHQDWL NGKEFKCRVN SAAPFPIEK TISKTKGRPK APQVYTIIPF 350
KEQMAKDQVS LTCMITDFEP EDITVEMQWN GQPAENYKNT QPTMDTDGSY 400
FVYSKLNVQK SNWEAGNTFT CSVLHEGLHN HHTKSLSHS PGK 443

```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```

DIVMTQSHKL LSTSVGDRVS ITCKASQDVS TAVDWYQKQP GQSPKLLINW 50
ASTRHTGVDP RFTGSGSGTD YTLTISSMQA EDLALYCRQ HYSTPFTFGS 100
GTKLEIKRAD AAPTVSIFPP SSEQLTSGGA SVVCFLNNFY PKDINVKKI 150
DGSERQNGVL NSWTQDQSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTCEATHKT 200
STSPIVKSFN RNEC 214

```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

```

Intra-H (C23-C104) 22-96 146-201 257-317 363-421
                  22"-96" 146"-201" 257"-317" 363"-421"
Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
                  23"-88" 134"-194"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 221-214' 221"-214"
Inter-H-H (h 7, h 10, h 12) 223-223" 226-226" 228-228"

```

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
293, 293"

lokivetmabum

lokivetmab

immunoglobulin G2-kappa, anti-[*Canis lupus familiaris* IL31 (interleukin 31)], caninized monoclonal antibody;
gamma2 heavy chain (1-452) [caninized VH (*Canis lupus familiaris* IGHV-E2RCC8 (85.90%) -(IGHD)-IGHJ) [8.8.11] (1-118) -*Canis lupus familiaris* IGHG2*01 (CH1 (119-216), hinge (217-234), CH2 (235-344), CH3 (345-451), CHS (452)) (119-452)], (133-217')-disulfide with kappa light chain (1'-217') [caninized V-KAPPA (*Canis lupus familiaris* IGKV-F1PNY2 (56.00%) -IGKJ) [10.3.9] (1'-111') -*Canis lupus familiaris* IGKC*01 (112'-217')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide

lokivetmab

immunoglobuline G2-kappa, anti-[*Canis lupus familiaris* IL31 (interleukine 31)], anticorps monoclonal caninisé;
chaîne lourde gamma2 (1-452) [VH caninisé (*Canis lupus familiaris* IGHV-E2RCC8 (85.90%) -(IGHD)-IGHJ) [8.8.11] (1-118) -*Canis lupus familiaris* IGHG2*01 (CH1 (119-216), charnière (217-234), CH2 (235-344), CH3 (345-451), CHS (452)) (119-452)], (133-217')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-217') [V-KAPPA caninisé (*Canis lupus familiaris* IGKV-F1PNY2 (56.00%) -IGKJ) [10.3.9] (1'-111') -*Canis lupus familiaris* IGKC*01 (112'-217')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure

lokivetmab

inmunoglobulina G2-kappa, anti-[*Canis lupus familiaris* IL31 (interleukina 31)], anticuerpo monoclonal caninizado;
cadena pesada gamma2 (1-452) [VH caninizado (*Canis lupus familiaris* IGHV-E2RCC8 (85.90%) -(IGHD)-IGHJ) [8.8.11] (1-118) -*Canis lupus familiaris* IGHG2*01 (CH1 (119-216), bisagra (217-234), CH2 (235-344), CH3 (345-451), CHS (452)) (119-452)], (133-217')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-217') [V-KAPPA caninizado (*Canis lupus familiaris* IGKV-F1PNY2 (56.00%) -IGKJ) [10.3.9] (1'-111') -*Canis lupus familiaris* IGKC*01 (112'-217')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
EVQLVESGGD LVKPGGSLRL SCVASGFTFS NYGMSWVRQA PGKGLQWVAT 50
ISYGGSYTY PDNIKGRFTI SRDNKNLTLY LQMNSLRAD TAMYYCVRGY 100
GYDTMDYWGQ GTLVTVSSAS TTAPSVFPLA PSCGSTSGST VALACLVSGY 150
FPEPVTWSWN SGLTSGVHT PPSVLQSSGL YSLSMVTVP SSRWSEFTFT 200
CNVAHPASKT KVDKVPVKRE NGRVFRPPDC PKCPAPEMLG GPSVFIFPFK 250
PKDTLLIART PEVTCVVVDL DPEDPEVQIS WFDVGKQMQT AKTQPREEQF 300
NGTYRVVSVL PIGHQDWLKG KQFTCKVNNK ALPSPIERIT SKARGQAHPQ 350
SVTVLPESRE ELKSNITVSLT CLIKDFFPED IDVEWQSNQG QEPESKIRTT 400
PQQLDEGGSY FLYSKLSVDK SRWQKGDFTI CAVMHEALHN HYTQESLSHS 450
PG 452

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
EIVMTQSPAS LSLSQEEKVT ITCKASQSVS FAGTGLMHWY QQKPGQAPKL 50
LIYRASNLEA GVPSRFSGSG SGTDFSTIS SLEPEDVAVY YCQQSREYFW 100
TFGGQTKLEI KRNDQAPFVY LFQPSPDQLH TGSASVCLL NSFPKIDINV 150
KWKVDGVIGD TGIQESVTEQ DKDSTYSLSS TLTMSSTEYL SHELVSCEIT 200
HKSLFSLIK SPQRSEC 217

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 145-201 265-325 371-431
22"-96" 145"-201" 265"-325" 371"-431"

Intra-L (C23-C104) 23"-92" 138"-197"
23"-92" 138"-197"

Inter-H-L (CH1 11-CL 126) 133-217' 133"-217"

Inter-H-H (h 14, h 17) 230-230" 233-233"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

301, 301"

Other post-translational modifications / Autres modifications post-traductionnelles / Otras modificaciones post-traduccionales

Lacking H chain C-terminal lysine (CHS K2>del)

lutetium (¹⁷⁷Lu) lilotomabum satetraxetanum #lutetium (¹⁷⁷Lu) lilotomab satetraxetan

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD37 (TSPAN26, tetraspanin-26)], *Mus musculus* monoclonal antibody, lutetium (Lu 177) radiolabelled satetraxetan (DOTA derivative) conjugate;
gamma1 heavy chain (1-443) [*Mus musculus* VH (IGHV1S135*01 (96.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*01 (CH1 E84>Q (177), P95>T (193), R96>W (194) (120-216), hinge (217-229), CH2 (230-336), CH3 N84.2>D (395), N84.4>D (397) (337-441), CHS (442-443)) (120-443)], (221-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-25*01 (93.70%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimer (223-223":226-226":228-228")-trisdisulfide, an average of 1 to 2 amino groups (N⁶ of lysines) are substituted:
N-[rac-(4-[(2R)-1,4,7,10-tetrakis(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-2-yl]methyl)phenyl]carbamoithiyl] (¹⁷⁷Lu)lutetium(3+) chelate

lutécium (^{177}Lu) lilotomab satétraxétan

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD37 (TSPAN26, tétraspanine-26)], *Mus musculus* anticorps monoclonal; conjugué au satétraxétan (dérivé DOTA) radiomarqué au lutétium (Lu 177); chaîne lourde gamma1 (1-443) [*Mus musculus* VH (IGHV1S135*01 (96.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*01 (CH1 E84>Q (177), P95>T (193), R96>W (194) (120-216), charnière (217-229), CH2 (230-336), CH3 N84.2>D (395), N84.4>D (397) (337-441), CHS (442-443)) (120-443)], (221-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-25*01 (93.70%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimère (223-223":226-226":228-228")-trisdisulfure, une moyenne de 1 à 2 groupes amino (N^6 de lysines) sont substitués: *N*-[*rac*-(4-[[[(2*R*)-1,4,7,10-tétrakis(carboxyméthyl)-1,4,7,10-tétrazacyclododécane-2-yl]méthyl]phényl]carbamoithioyl] chélate de (^{177}Lu)lutétium(3+)

lutecio (^{177}Lu) lilotomab satetraxetán

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[CD37 de *Homo sapiens* (TSPAN26, tetraspanina-26)], anticuerpo monoclonal de *Mus musculus*, conjugada al satetraxetán (derivado DOTA) radiomarcado con lutecio (Lu 177); cadena pesada gamma1 (1-443) [VH de *Mus musculus* (IGHV1S135*01 (96.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*01 (CH1 E84>Q (177), P95>T (193), R96>W (194) (120-216), bisagra (217-229), CH2 (230-336), CH3 N84.2>D (395), N84.4>D (397) (337-441), CHS (442-443)) (120-443)], (221-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-25*01 (93.70%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dímero (223-223":226-226":228-228")-trisdisulfuro; pro termino medio, 1 a 2 grupos amino (N^6 de lisinas) están sustituidos: *N*-[*rac*-(4-[[[(2*R*)-1,4,7,10-tetrakis(carboximetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan-2-il]metil]fenil]carbamoitoil] quelato de (^{177}Lu)lutecio(3+)


Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EIQLQQSGPE LVKPGASVKV SCASGYSTF DYNMYWVKQS HGKSLEWIGY 50
 IDPFGDITTY NQKFKGKATL TVDKSSSTAF IHLNSLTSD SAVYYCARSP 100
 YGHVAMDYWG QGTSVTVSSA RTTPSPVYPL AFGSAAGTMS MYTLGCLVRG 150
 YFPEPVTVTW NSGSLSSGVH TFFAVLQSL YTLSSSVTVT STWPSETVT 200
 CNVAHPASST KVDKKIVFRD CGCKPCICTV PEVSSVIFP PKPKDVLIT 250
 LTPKVTCTVV DISKDDPEVQ FSWFVDDVEV HTAQTPREE QFNSTFRSV 300
 ELPIMHQDWL NGKEFKCRVN SAAFPAPIEK TISKTKGRPK APQVYTIPTP 350
 KEQMAKDKVS LTCMITDFFP EDITVEWQWN GQPAENYKNT QPIMTDGSGY 400
 FVYSKINVQK SNWEAGNTFT CSVLHEGLHN HHTKSLSHS PGK 443

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIVMTQSHKL LSTSVGDRVS ITCKASQDVS TAVDWYQKPK GQSPKLLINW 50
 ASTRHTGVDP RFTGSGGSDT YTLTSSMQA EDLALYCRQ HYSTPPTFGS 100
 GTKLEIKRAD AAPTIVSIFPP SSEQLTSGGA SVVCFLLNFF PKDINVKWKI 150
 DGSEKQNGVL NSWTQDQSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTCEATHKT 200
 STSPIVKSFN RNEC 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 146-201 257-317 363-421
 22"-96" 146"-201" 257"-317" 363"-421"
 Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'
 23'''-88''' 134'''-194'''
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 221-214' 221"-214"
 Inter-H-H (h 7, h 10, h 12) 223-223" 226-226" 228-228"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4:
 293, 293"

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



motolimodum


motolimod

2-amino-*N,N*-dipropyl-8-[4-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]-3*H*-1-benzazepine-4-carboxamide

motolimod

2-amino-*N,N*-dipropyl-8-[4-(pyrrolidine-1-carbonyl)phényl]-3*H*-1-benzazépine-4-carboxamide

motolimod

2-amino-*N,N*-dipropil-8-[4-(pirrolidina-1-carbonil)fenil]-3*H*-1-benzazepina-4-carboxamida $C_{28}H_{34}N_4O_2$ **necuparanibum**

necuparanib


low molecular mass heparan sulfate mimetic compound that is obtained by nitrous sodium depolymerization of heparin from porcine intestinal mucosa, sodium periodate glycol split oxidation of uronic acids elements and sodium borohydride reduction of aldehydes produced during oxidation; the majority of the components have a split uronic acid structure at the non-reducing end and a 2,5-anhydromannitol structure at the reducing end of their chain; the average molecular weight range is 5000 to 8000 Da; the degree of sulfatation is about 2 per disaccharidic unit

nécuparanib

dérivé de basse masse moléculaire à action mimétique du sulfate d'héparane, obtenu par dépolymérisation d'héparine de muqueuse intestinale de porc, catalysée par du nitrite de sodium, puis dégradation oxydative des glycols des unités uroniques par le périodate de sodium et réduction, par le borohydrure de sodium, des aldéhydes produits ; la majorité des composants ont, une structure éclatée d'acide uronique à leur extrémité non-réductrice et une structure 2,5-anhydromannitol à leur extrémité réductrice, une masse molaire comprise entre 4500 et 7200 daltons et un degré de sulfatation d'environ de 2 par unité disaccharide

necuparanib

derivado de baja masa molecular de acción mimética de la del sulfato de heparán, obtenido por despolimerización de heparina de mucosa intestinal de cerdo, catalizada por nitrito de sodio, seguida de degradación oxidativa, con peryodato de sodio, de los glicoles de las unidades urónicas y reducción, con borohidruro de sodio, de los aldehídos producidos; la mayoría de los componentes tienen, una estructura abierta de ácido urónico en su extremo no-reductor y una estructura 2,5-anhidromanitol en el reductor, el peso molecular medio está comprendido entre 4500 y 7200 daltons et el grado de sulfatación es aproximadamente de 2 por unidad de disacárido



neloniclinum

nelonicline


(3*R*,4*s*,5*S*)-4-[(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]-1-azaadamantane

nélonicline

(3*R*,4*s*,5*S*)-4-[(5-phényl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]-1-azaadamantane

neloniclina

(3*R*,4*s*,5*S*)-4-[(5-fenil-1,3,4-tiadiazol-2-il)oxi]-1-azaadamantano

C₁₇H₁₉N₃OS

nemolizumabum #

nemolizumab

immunoglobulin G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL31RA (interleukin 31 receptor subunit alpha)], humanized monoclonal antibody;
 gamma2 heavy chain (1-445) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV1-2*02 (83.70%) -(IGHD)-IGHJ5*01) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG2*01 (CH1 C10>S (135), R12>K (137), E16>G (141), S17>G (142) (122-219), hinge C4>S (223) (220-231), CH2 H30>Q (268) (232-340), CH3 R11>Q (355), Q98>E (419) (341-445)) (122-445)], (224-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (82.10%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dimer (227-227'':230-230'')-bisdisulfide

némolizumab

immunoglobuline G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL31RA (sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine 31)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma2 (1-445) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV1-2*02 (83.70%) -(IGHD)-IGHJ5*01) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG2*01 (CH1 C10>S (135), R12>K (137), E16>G (141), S17>G (142) (122-219), charnière C4>S (223) (220-231), CH2 H30>Q (268) (232-340), CH3 R11>Q (355), Q98>E (419) (341-445)) (122-445)], (224-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (82.10%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure

nemolizumab

inmunoglobulina G2-kappa, anti-[IL31RA de *Homo sapiens* (subunidad alfa del receptor de la interleukina 31)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma2 (1-445) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV1-2*02 (83.70%) -(IGHD)-IGHJ5*01) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG2*01 (CH1 C10>S (135), R12>K (137), E16>G (141), S17>G (142) (122-219), bisagra C4>S (223) (220-231), CH2 H30>Q (268) (232-340), CH3 R11>Q (355), Q98>E (419) (341-445)) (122-445)], (224-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (82.10%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT GYIMNWVRQA PGQGLEWMGL 50
INPYNGGTDY NPQFQDRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARDG 100
YDDGPTYLET WGQGTLLVTS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAAALGCLV 150
KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSV TVPSSNFGTQ 200
TYTCNVDHKP SNTKVDKTEV RKSCVECPFC PAPPVAGFSV LFFPFKEKDT 250
LMLSRTPEVT CVVVDVSQED FEVGFKNWVD GVEVHNAKTK PREEQNFSFT 300
RVVSVLTVVH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPA PIEKTIKTK GQPREPQVYT 350
LPSPQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPEMLDS 400
DGSFFLYSKL TVDKSRWQEG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSP 445
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
DIQMTQSPSS LSASVGRVIT ITCQASEDIY SFVAWYQQKP GKAPKLLIYN 50
AQTEAQGVPS RFSGSGSGTD FTLTISLQP EDFATYYCQH HYDSPLTFGG 100
GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEC 214
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 148-204 261-321 367-425
 22"-96" 148"-204" 261"-321" 367"-425"
 Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'
 23"'-88'" 134"'-194'"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 224-214' 224"-214"
 Inter-H-H (h 8, h 11) 227-227" 230-230"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
 297, 297"

Other post-translational modifications / Autres modifications post-traductionnelles / Otras modificaciones post-traduccionales

Lacking H chain C-terminal glycine and lysine (CHS G1>del, K2>del)

nusinersenum

nusinersen

all-P-ambo-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)guanosine

nusinersen


tout-P-ambo-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)guanosine

nusinersén

todo-P-ambo-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiouridilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiouridilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiouridilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiouridilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)guanosina

$C_{234}H_{340}N_{61}O_{128}P_{17}S_{17}$

[2'-O-(2-methoxyethyl)](3'-5')(P-thio)(mU-mC-A-mC-mU-mU-mC-A-mU-A-A-mU-G-mC-mU-G-G)

**onalespibum**

onalespib


[2,4-dihydroxy-5-(propan-2-yl)phenyl]{5-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1,3-dihydro-2*H*-isoindol-2-yl}methanone

onalespib

[2,4-dihydroxy-5-(propan-2-yl)phényl]{5-[(4-méthylpipérazin-1-yl)méthyl]-1,3-dihydro-2*H*-isoindol-2-yl}méthanone

onalespib

[2,4-dihidroxi-5-(propan-2-il)fenil]{5-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il}metanona

 $C_{24}H_{31}N_3O_3$
**ozanimodum**

ozanimod


5-(3-((1*S*)-1-[(2-hydroxyethyl)amino]-2,3-dihydro-1*H*-inden-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-[(propan-2-yl)oxy]benzonitrile

ozanimod

5-(3-((1*S*)-1-[(2-hydroxyéthyl)amino]-2,3-dihydro-1*H*-indén-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-[(propan-2-yl)oxy]benzonitrile

ozanimod

5-(3-((1*S*)-1-[(2-hidroxietyl)amino]-2,3-dihidro-1*H*-inden-4-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il)-2-[(propan-2-il)oxi]benzonitrilo

 $C_{23}H_{24}N_4O_3$


pegpleranibum

pegpleranib

5'-O-[(6-{N², N⁶-bis[α-carbonyl-ω-methoxypoly(oxyethane-1,2-diyl)]-DL-lysylamido}hexyl)oxy]hydroxyphosphoryl-2'-deoxycytidyl-(3'→5')-2'-deoxyadenyl-(3'→5')-2'-deoxyguanylyl-(3'→5')-2'-deoxyguanylyl-(3'→5')-2'-deoxycytidyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorouridyl-(3'→5')-2'-deoxyadenyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorocytidyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→17)-hydroxy[(17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecyl)oxy]phosphoryl-(1→5')-2'-deoxycytidyl-(3'→5')-2'-deoxyguanylyl-(3'→5')-thymidyl-(3'→5')-2'-deoxyadenyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→5')-2'-deoxyadenyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→5')-2'-deoxycytidyl-(3'→5')-2'-deoxyadenyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorouridyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorocytidyl-(3'→5')-2'-O-methyladenyl-(3'→17)-hydroxy[(17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecyl)oxy]phosphoryl-(1→5')-thymidyl-(3'→5')-2'-deoxyguanylyl-(3'→5')-2'-deoxyadenyl-(3'→5')-thymidyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorocytidyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorocytidyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorouridyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→3')-thymidine

pegpléranib

5'-O-[(6-{N², N⁶-bis[α-carbonyl-ω-méthoxypoly(oxyéthane-1,2-diyl)]-DL-lysylamido}hexyl)oxy]hydroxyphosphoryl-2'-déoxycytidyl-(3'→5')-2'-déoxyadényl-(3'→5')-2'-déoxyguanylyl-(3'→5')-2'-déoxyguanylyl-(3'→5')-2'-déoxycytidyl-(3'→5')-2'-déoxy-2'-fluorouridyl-(3'→5')-2'-déoxyadényl-(3'→5')-2'-déoxy-2'-fluorocytidyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→17)-hydroxy[(17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadécyl)oxy]phosphoryl-(1→5')-2'-déoxycytidyl-(3'→5')-2'-déoxyguanylyl-(3'→5')-thymidyl-(3'→5')-2'-déoxyadényl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-déoxyadényl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-déoxycytidyl-(3'→5')-2'-déoxyadényl-(3'→5')-2'-déoxy-2'-fluorouridyl-(3'→5')-2'-déoxy-2'-fluorocytidyl-(3'→5')-2'-O-méthyladényl-(3'→17)-hydroxy[(17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadécyl)oxy]phosphoryl-(1→5')-thymidyl-(3'→5')-2'-déoxyguanylyl-(3'→5')-2'-déoxyadényl-(3'→5')-thymidyl-(3'→5')-2'-déoxy-2'-fluorocytidyl-(3'→5')-2'-déoxy-2'-fluorocytidyl-(3'→5')-2'-déoxy-2'-fluorouridyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→3')-thymidine

pegpleranib


5'-O-[(6-{N², N⁶-bis[α-carbonil-ω-metoxipoli(oxietano-1,2-diil)]-DL-lisilamido}hexil)oxi]hidroxifosforil-2'-desoxicidilil-(3'→5')-2'-desoxiadenilil-(3'→5')-2'-desoxiguanilil-(3'→5')-2'-desoxiguanilil-(3'→5')-2'-desoxicidilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(3'→5')-2'-desoxiadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorocitidilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→17)-hidroxi[(17-hidroxi-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecil)oxi]fosforil-(1→5')-2'-desoxicidilil-(3'→5')-2'-desoxiguanilil-(3'→5')-timidilil-(3'→5')-2'-desoxiadenilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-desoxiadenilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-desoxicidilil-(3'→5')-2'-desoxiadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorocitidilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→17)-hidroxi[(17-hidroxi-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecil)oxi]fosforil-(1→5')-timidilil-(3'→5')-2'-desoxiguanilil-(3'→5')-2'-desoxiadenilil-(3'→5')-timidilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→3')-timidina

(3'-5')-R-dC-dA-dG-dC-dUfl-dA-dCfl-Gm3'-17Xp1-
5'dC-dG-dT-dA-Gm-dA-Gm-dC-dA-dUfl-dCfl-Am3'-
17Xp1-5'dT-dG-dA-dT-dCfl-dCfl-dUfl-Gm3'-3'dT
—Xp—

d (as prefix) = 2'-deoxy

fl (as suffix) = 2'-fluoro


m (as suffix) = 2'-O-methyl



$x + y = n$

R — =

rac



pexidartinibum

pexidartinib

5-[(5-chloro-1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-3-yl)methyl]-
N-[[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methyl]pyridin-2-amine


pexidartinib

5-[(5-chloro-1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-3-yl)méthyl]-
N-[[6-(trifluorométhyl)pyridin-3-yl]méthyl]pyridin-2-amine

pexidartinib

5-[(5-cloro-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-3-il) metil]-
N-[[6-(trifluorometil)piridin-3-il]metil]piridin-2-amina

$C_{20}H_{15}ClF_3N_5$



pinometostatum

pinometostat

9-[5-deoxy-5-[(*cis*-3-[2-(5-*tert*-butyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)ethyl]cyclobutyl)(propan-2-yl)amino]-
β-D-ribofuranosyl]-9*H*-purin-6-amine


pinométostat

9-[5-déoxy-5-[(*cis*-3-[2-(5-*tert*-butyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)éthyl]cyclobutyl)(propan-2-yl)amino]-
β-D-ribofuranosyl]-9*H*-purin-6-amine

pinometostat

9-[5-desoxi-5-[(*cis*-3-[2-(5-*terc*-butil-1*H*-benzoimidazol-2-il)etil]ciclobutil)(propan-2-il)amino]-β-D-ribofuranosil]-
9*H*-purin-6-amina

$C_{30}H_{42}N_8O_3$



radalbuvirum

radalbuvir


5-(3,3-dimethylbut-1-yn-1-yl)-3-((1*R*)-*N*-[(1*s*,4*s*)-4-hydroxy-4-(((3*S*)-oxolan-3-yl]oxy)methyl)cyclohexyl]-4-methylcyclohex-3-ene-1-carboxamido}thiophene-2-carboxylic acid

radalbuvir

acide 5-(3,3-diméthylbut-1-yn-1-yl)-3-((1*R*)-*N*-[(1*s*,4*s*)-4-hydroxy-4-(((3*S*)-oxolan-3-yl]oxy)méthyl)cyclohexyl]-4-méthylcyclohex-3-ène-1-carboxamido}thiophène-2-carboxylique

radalbuvir

ácido 5-(3,3-dimetilbut-1-in-1-il)-3-((1*R*)-*N*-[(1*s*,4*s*)-4-hidroxi-4-(((3*S*)-oxolan-3-il]oxi)metil)ciclohexil]-4-metilciclohex-3-eno-1-carboxamido}tiofeno-2-carboxílico

C₃₀H₄₁NO₆S**ralinepagum**

ralinepag


{{*trans*-4-(((4-chlorophenyl)(phenyl)carbamoyl]oxy)methyl)cyclohexyl]methoxy}acetic acid

ralinépag

acide {{*trans*-4-(((4-chlorophényl)(phényl)carbamoyl]oxy)méthyl)cyclohex-yl]methoxy}acétique

ralinepag

ácido {{*trans*-4-(((4-clorofenil)(fenil)carbamoiil]oxi)metil)ciclohexil]metoxi}acético

C₂₃H₂₆ClNO₅**relebactamum**

relebactam



(1*R*,2*S*,5*R*)-7-oxo-2-[(piperidin-4-yl)carbamoyl]-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-6-yl hydrogen sulfate

rélebactam

hydrogénosulfate de (1*R*,2*S*,5*R*)-7-oxo-2-[(pipéridin-4-yl)carbamoyl]-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-6-yle

relebactam

hidrógenosulfato de (1*R*,2*S*,5*R*)-7-oxo-2-[(piperidin-4-il)carbamoiil]-7-oxo-1,6-diazabíciclo[3.2.1]octan-6-ilo

**ridinilazolum**


ridinilazole

2,2'-di(pyridin-4-yl)-1*H*,1'*H*-5,5'-bi(benzimidazole)

ridinilazole

2,2'-di(pyridin-4-yl)-1*H*,1'*H*-5,5'-bi(benzimidazole)

ridinilazol

2,2'-di(piridin-4-il)-1*H*,1'*H*-5,5'-bi(benzoimidazol)**roneparstatum**

roneparstat

heparan sulfate mimetic compound that is obtained by *N*-des-sulfo and *N*-acetyl reactions on heparin from porcine intestinal mucosa, sodium periodate glycol split oxidation of uronic acids elements and sodium borohydride reduction of aldehydes produced during oxidation; the majority of the components have a glucuronic acid (coming from the heparin starting material) and glucosamine (formed via decomposition of the glucuronic acid) structure at the non-reducing end and iduronic acid 2-sulphate or glycol split structure at the reducing end of their chain; the average molecular weight range is 15000 to 25000 Da; the degree of glycol split is about 25% [m/(n+m)] and the degree of sulfatation is about 1.2 per disaccharidic unit


ronéparstat

dérivé à action mimétique du sulfate d'héparane, obtenu par des réactions conduisant à la *N*-acétyl-*N*-désulfohéparine de muqueuse intestinale de porc, puis dégradation oxydative des glycols des unités uroniques par le périodate de sodium et réduction, par le borohydrure de sodium, des aldéhydes produits ; la majorité des composants ont, une structure acide glucuronique (présente dans l'héparine de départ) et glucosamine (formé par décomposition de l'acide glucuronique) à leur extrémité non-réductrice et une structure dérivée de l'acide iduronique soit l'ester sulfurique soit sa forme acyclique à leur extrémité réductrice, une masse molaire comprise entre 15000 et 25000 daltons, la proportion d'acide uronique ouvert [m/(n+m)] est d'environ 25% et un degré de sulfatation d'environ de 1.2 par unité disaccharide

sapanisertib

3-(2-amino-1,3-benzoxazol-5-yl)-1-(propan-2-yl)-
1*H*-pyrazolo[3,4-*d*]pyrimidin-4-amine

sapanisertib

3-(2-amino-1,3-benzoxazol-5-il)-1-(propan-2-il)-
1*H*-pirazolo[3,4-*d*]pirimidin-4-amina $C_{15}H_{15}N_7O$ **seletalisibum**


seletalisib

3-(8-chloro-3-((1*R*)-1-[(pyrido[3,2-*d*]pyrimidin-4-yl)amino]-
2,2,2-trifluoroethyl)quinolin-2-yl)pyridine *N*-oxide

sélétálisib

N-oxyde de 3-(8-chloro-3-((1*R*)-1-[(pyrido[3,2-*d*]pyrimidin-
4-yl)amino]-2,2,2-trifluoroéthyl)quinoléin-2-yl)pyridine

seletalisib

N-óxido de 3-(8-cloro-3-((1*R*)-1-[(pirido[3,2-*d*]pirimidin-
4-il)amino]-2,2,2-trifluoroetil)quinolein-2-il)piridina $C_{23}H_{14}ClF_3N_6O$ **setmelanotidum**


setmelanotide

*N*²-acetyl-L-arginyl-L-cysteinyl-D-alanyl-L-histidyl-
D-phenylalanyl-L-arginyl-L-tryptophyl-L-cysteinamide, cyclic
(2-8)-disulfide

setmélanotide

(2-8)-disulfure cyclique du *N*²-acétyl-L-arginyl-L-cystéinyl-
D-alanyl-L-histidyl-D-phénylalanil-L-arginyl-L-tryptophyl-
L-cystéinamide

setmelanotida

(2-8)-disulfuro cíclico del *N*²-acetil-L-arginil-L-cisteinil-
D-alanil-L-histidil-D-fenilalanil-L-arginil-L-triptofil-
L-cisteinamida $C_{49}H_{68}N_{18}O_9S_2$ 

solcitinibum

solcitinib


N-{5-[4-(3,3-dimethylazetidine-1-carbonyl)phenyl][1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pyridin-2-yl}cyclopropanecarboxamide

solcitinib

N-{5-[4-(3,3-diméthylazétidine-1-carbonyl)phényl][1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pyridin-2-yl}cyclopropanecarboxamide

solcitinib

N-{5-[4-(3,3-dimetilazetidina-1-carbonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il}ciclopropanocarboxamida

C₂₂H₂₃N₅O₂**somapacitanum #**

somapacitan

[101-{S-[(8S,22S,27S)-8-carbamoyl-22,27-dicarboxy-2,10,19,24,29,38,42,42,44-nonaaxo-59-(1*H*-tetrazol-5-yl)-12,15,31,34-tetraoxa-42-λ⁶-thia-3,9,18,23,28,37,43-heptaazonapentacontyl]-L-cysteine}]human somatropin

somapacitan

[101-{S-[(8S,22S,27S)-8-carbamoyl-22,27-dicarboxy-2,10,19,24,29,38,42,42,44-nonaaxo-59-(1*H*-tétrazol-5-yl)-12,15,31,34-tétraoxa-42-λ⁶-thia-3,9,18,23,28,37,43-heptaazonapentacontyl]-L-cystéine}]somatropine humaine

somapacitán

[101-{S-[(8S,22S,27S)-8-carbamoiil-22,27-dicarboxi-2,10,19,24,29,38,42,42,44-nonaaxo-59-(1*H*-tetrazol-5-il)-12,15,31,34-tetraoxa-42-λ⁶-tia-3,9,18,23,28,37,43-heptaazonapentacontil]-L-cisteina}]somatropina humana

Sequence / Séquence / Secuencia


```

FFTIPLSRLEF DNAMLAHRL HQLAFDTYQE FEEAYIPKEQ KYSFLQNPQT 50
SLCFSES IPT PSNREETQQK SNLELLRISL LLIQSWLEPV QFLRSVFANS 100
CVYGASDSNV YDLLKDLLEG IQTLMGRLSD GSPRTGQIFK QTSKFDPTNS 150
HNDALLKNY GLLYCFRKDM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG F 191

```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
53-165 182-189

Modified residue / Résidu modifié / Resto modificado



somavaratanum #

somavaratan

rDNA derived human somatropin (growth hormone of 191 residues) fusion protein with a hydrophilic amino acid sequence* (913 residues) at the *N*-terminus and another** (146 residues) at the *C*-terminus, produced in *Escherichia coli*.

*starting with alanine plus 76 dodecapeptides:

EPAGSPTSTEEG (AE₃G₂P₂S₂T₂), three different sequences of AG₃P₂S₄T₂ and 72 of 4 different sequences of AE₂G₂P₂S₃T₂

** starting with glycylglycine plus 12 dodecapeptides of 4 different sequences of AE₂G₂P₂S₃T₂

somavaratan

Protéine de fusion entre la somatropine humaine (facteur de croissance de 191 résidus) et deux protéines hydrophiles, l'une*, de 913 résidus, sur son acide aminé *N*-terminal, et l'autre**, de 146 résidus, sur son acide aminé *C*-terminal, obtenue par la technique de l'ADN recombinant à partir de culture d'*Escherichia coli*.

*constituée d'alanine suivie de 76 dodécapeptides, EPAGSPTSTEEG (AE₃G₂P₂S₂T₂) puis trois différentes séquences de AG₃P₂S₄T₂ et 72 de 4 différentes séquences de AE₂G₂P₂S₃T₂

**constituée de glycylglycine suivie de 12 dodécapeptides de 4 différentes séquences de AE₂G₂P₂S₃T₂

somavaratán

proteína de fusión entre la somatropina humana (factor de crecimiento 191 restos) y dos proteínas hidrófilas, una*, de 913 restos, en el extremo *N*-terminal, y otra**, de 146 restos, en el extremo *C*-terminal, obtenida por técnicas de ADN recombinante en cultivos d'*Escherichia coli*.

*constituída por alanina seguida de 76 dodecapéptidos, EPAGSPTSTEEG (AE₃G₂P₂S₂T₂) tres secuencias diferentes de AG₃P₂S₄T₂ y 72 de 4 secuencias diferentes de AE₂G₂P₂S₃T₂

**constituída por glicilglicina seguida de 12 dodecapéptidos de 4 secuencias diferentes de AE₂G₂P₂S₃T₂

Sequence / Sequence / Secuencia
 AEPAGSPTST EEGTPGSGTA SSSPGSSTPS GATGSPGASP GTSSTGSPGS 50
 PAGSPTSTEE GTSESATPES GPGTSTEPSE GSAPGSPAGS PTSTEEGTST 100
 EPSEGSAPGT STEPSEGSAP GTSESATPES GPGSEPATSG SETPGSEPAT 150
 SGSETPGSPA GSPTSTEEGT SESATPESGP GTSTEPSEGS APGTSTEPSE 200
 GSAPGSPAGS PTSTEEGTST EPSEGSAPGT STEPSEGSAP GTSESATPES 250
 GPGTSTEPSE GSAPGSPAGS TPSESGPSESEP ATSGSETPGT STEPSEGSAP 300
 GTSTEPSEGS APGTSESATP ESGPGTSESA TPSESGSPA GSPTSTEEGT 350
 SESATPESGP GSEPATSGSE TPGTSESATP ESGPGTSTEP SEGSAPGTST 400
 EPSEGSAPGT STEPSEGSAP GTSTEPSEGS APGTSTEPSE GSAPGTSTEP 450
 SEGSAPGSPA GSPTSTEEGT STEPSEGSAP GTSESATPES GPGSEPATSG 500
 SETPGTSESA TPSESGPSESEP ATSGSETPGT SESATPESGP GTSTEPSEGS 550
 APGTSESATP ESGPGSPAGS PTSTEEGSPA GSPTSTEEGS PAGSPTSTEE 600
 GTSESATPES GPGTSTEPSE GSAPGTSESA TPSESGPSESEP ATSGSETPGT 650
 SESATPESGP GSEPATSGSE TPGTSESATP ESGPGTSTEP SEGSAPGSPA 700
 GSPTSTEEGT SESATPESGP GSEPATSGSE TPGTSESATP ESGPGSPAGS 750
 PTSTEEGSPA GSPTSTEEGT STEPSEGSAP GTSESATPES GPGTSESATP 800
 ESGPGTSESA TPSESGPSESEP ATSGSETPGS EPATSGSETP GSPAGSPTST 850
 EEGTSTEPSE GSAPGTSTEP SEGSAPGSESEP ATSGSETPGT SESATPESGP 900
 GTSTEPSEGS APGFTTIPLS RLFDNAMLRA HRLHQLAFDT YQEFEEAYIP 950
 KEQKYSFLQN PQTSLCFSSES IPTFSNREET QQKSNLELLR ISLLLIQSWL 1000
 EPVQFLRSVF ANSLVYGASD SNVYDLRLKD EEGIQTLMGR LEDGSPRTGQ 1050
 IFKQTYSKFD TNSHNDALL KNYGLLYCFR KMDKVVETFL RIVQCRSVEG 1100
 SCFGPGTSES ATPESGPGTS TEPSEGSAPG TSTEPSEGSA PGTSESATPE 1150
 SGPGTSTEPS EGSAFTSTTE PSEGSAPGTS ESATPESGPG TSTEPSEGSA 1200
 FGTTSTPSEG SAPGTSTEPS EGSAFGSPAG SPTSTEEGTS TEPSEGSAPG 1250

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 966-1078 1095-1102

spanlecortemlocelum

spanlecortemlocel

Consists of human expanded CD34+ haematopoietic stem cells that have been isolated from umbilical cord blood and cultured *in vitro* in media supplemented with THPO (thrombopoietin), KITLG (KIT ligand, stem cell factor, SCF), IL6 (interleukin 6), FLT3LG (fms-related tyrosine kinase 3 (FLT3) ligand), and an antagonist of AHR (aryl hydrocarbon receptor); typically contains >10% of cells expressing CD34

spanlécortemlocel

cellules souches hématopoïétiques humaines exprimant CD34+ isolées du sang de cordon ombilical et mises en culture *in vitro* en milieu enrichi en THPO (thrombopoïétine), KITLG (ligand de KIT, facteur de cellules souches, SCF), IL6 (interleukine 6), FLT3LG (ligand de tyrosine kinase 3 fms-like (FLT3)) et un antagoniste d'AHR (récepteur des hydrocarbures aromatiques); typiquement, contient >10% de cellules exprimant CD34

espanlecortemlocel

células madre hematopoyéticas humanas que expresan CD34+ aisladas de sangre de cordón umbilical y cultivadas *in vitro* en un medio enriquecido en THPO (trombopoyetina), KITLG (ligante de KIT, factor de células madre, SCF), IL6 (interleukina 6), FLT3LG (ligando de tirosina kinasa 3 fms-like (FLT3)) y un antagonista de AHR (receptor de hidrocarburos arílicos); normalmente, contiene >10% de células que expresan CD34

spebrutinibum

spebrutinib


N-[3-({5-fluoro-2-[4-(2-methoxyethoxy)anilino]pyrimidin-4-yl}amino)phenyl]prop-2-enamide

spébrutinib

N-[3-({5-fluoro-2-[4-(2-méthoxyéthoxy)anilino]pyrimidin-4-yl}amino)phényl]prop-2-énamide

espebrutinib

N-[3-({5-fluoro-2-[4-(2-metoxietoxi)anilino]pirimidin-4-il}amino)fenil]prop-2-enamida

$$\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{FN}_5\text{O}_3$$
**susoctocogum alfa #**

susoctocog alfa

recombinant DNA derived B-domain deleted porcine blood-coagulation factor VIII analogue, produced in BHK21 cells: des-(753-1418)-blood-coagulation factor VIII (procoagulant component) *Sus scrofa*, glycosylated

susoctocog alfa

analogue du facteur de coagulation VIII porcine dont le domaine B a été supprimé, produit dans des cellules BHK21, à partir d'ADN recombinant:
dès-(753-1418)-facteur VIII de coagulation (composant procoagulant) de *Sus scrofa* (porc), glycosylé

susoctocog alfa


análogo del factor de coagulación VIII porcino del cual se ha suprimido el dominio B, producido en células BHK21, a partir de ADN recombinante:
des-(753-1418)-factor VIII de coagulación (componente procoagulante) de *Sus scrofa* (cerdo) glicosilado

Sequence / Séquence / Secuencia

AIRRYVLGAV	ELSWDYRQSE	LLRELHVDTR	FPATAPGALP	LGPSVLYKKT	50
VFVEFTDQLF	SVARPRPPWM	GLLGPTIQAE	VDYTVVVTLK	NMAEHVPSLH	100
AVGVSVFKSS	EGAEDYDHTS	QREKEDDKVL	PGKSQTYVWQ	VLKENGPTAS	150
DPPCLTYSYL	SHVDLVKDLN	SGLIGALLVC	REGSLTRERT	QNLHEFVLLF	200
AVFDECKSWH	SARNDSWTRA	MDPAPARAQP	AMHTVNGVYN	RSLPGLIGCH	250
KKSVYWHVIG	MGTSPVHSI	FLEGHTFLVR	HHRQASLEIS	PLTFLTAQTF	300
LMDLGQFLLF	CHISSHHHGG	MEAHVVRVSC	AEEPQLRKA	DEEDYDDNL	350
YDSMDVVRLL	DGDDVSPFIQ	IRSVAKHKPK	TWVHYISAE	EDWDYAPAVP	400
SPSDRSYKSL	YNSGPPQRIQ	RKYKKARFVA	YTDVTFKTRK	AIPYESGILG	450
PLLYGEVGD	LLIIFKNKAS	RPYNIYPHGI	TDVSAHPGR	LLKGWKHLKD	500
MPILPGETFK	YKWTVTVEDG	PTKSDPRCLT	RYYSSSINLE	KDLASGLIGP	550
LLICYKESVD	QRGNQMMSDK	RNVILFSVFD	ENQSWYLAEN	IQRFLNPDG	600
LQPDPEFQA	SNIMHSINGY	VFDSLQLSVC	LHEVAYWYIL	SVGAQTDFLS	650
VFFSGYTFKH	KMVYEDTLTL	FPFSGETVFM	SMENPGLWVL	GCHNSDLRNR	700
GMTALLKVYS	CDRDIGDYD	NTYEDIPGFL	LSGKNVIEPR	SFAQNSRPPS	750
ASAPKPPVLR	RHQRDISLPT	FQPEEDKMDY	DDIFSTETKG	EDFDIYGEDE	800
NQDPRSFQKR	TRHYFIAAVE	QLWDYGMSES	PRALNRRAQN	GEVPRFKKVV	850
FREFADGSFT	QPSYRGELNK	HLGLLGPYIR	AEVEDNIMVT	FKNQASRPYS	900
FYSSSLISYP	DQEQGAEPRH	NFVQPNETRT	YFWKQVHMA	PTDEFDFCKA	950
WAYFSDVDLE	KDVHSGGLIGP	LLICRANTLN	AAHGQVTVQ	EFALFFTFID	1000
ETKSWYFTEN	VERNCRAPCH	LQMEDPTLKE	NYRFHAINGY	VMDTLPLGLV	1050
AQNQRIRWYL	LSMGSNENIH	SIHFSGHVFS	VRKKEEYKMA	VYNLYPGVFE	1100
TVEMLPSKVG	IWRIECLIGE	HLQAGMSTTF	LVYSKECQAP	LGMAAGRIIRD	1150
FQITASGQYG	QWAPKLARLH	YSGSINAWST	KDPHSWIKVD	LLAPMIIHGI	1200
MTQGARQKFS	SLYISQFIIM	YSLDGRNWQS	YRQNSTGTLM	VFFGNVDASG	1250
IKHNIFNPPI	VARYIRLHPT	HYSIRSTLRM	ELMGCDLNSC	SMPLMGMQNA	1300
ISDSQITASS	HLSNI FATWS	PSQARLHLQG	RTNAWRPRVS	SAEEWLQVDL	1350
QKTVKVTGIT	TQGVKSLLS	MYVKEFLVSS	SQDGRRTWLF	LQDGHTKVFQ	1400
GNQDSSTPVV	NALDPPLFTR	YLRHPTSWA	QHIALRLLEVL	GCEAQDLY	1448

Disulfide bridges location / Positions des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
154-180 249-330 528-554 630-711 948-974 1015-1019 1137-1285 1290-1442

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



Glycosylation sites (N,S,T) / Sites de glycosylation (N,S,T) / Posiciones de glicosilación (N,S,T)

Ser-44 Asn-214 Asn-240 Ser-353 Asn-582
Ser-741 Ser-752 Thr-770 Asn-926 Asn-1234

tazemetostat
tazemetostat



N-[(4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl]-
5-[ethyl(oxan-4-yl)amino]-4-methyl-4'-[(morpholin-
4-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-3-carboxamide

tazémétostat

N-[(4,6-diméthyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)méthyl]-
5-[éthyl(oxan-4-yl)amino]-4-méthyl-4'-[(morpholin-
4-yl)méthyl][1,1'-biphényl]-3-carboxamide

tazemetostat

N-[(4,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)metil]-
5-[etil(oxan-4-il)amino]-4-metil-4'-[(morfolin-4-il)metil][1,1'-
bifenil]-3-carboxamida

**temsavirum**

temsavir



1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)-2-[4-methoxy-7-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl]ethane-1,2-dione

temsavir

1-(4-benzoylpipérazin-1-yl)-2-[4-méthoxy-7-(3-méthyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl]éthane-1,2-dione

temsavir

1-(4-benzoilpiperazin-1-il)-2-[4-metoxi-7-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-4-metoxi-1H-pirrollo[2,3-c]piridin-3-il]etano-1,2-diona

**tesidolumabum #**

tesidolumab

immunoglobulin G1-lambda2, anti-[*Homo sapiens* C5 (complement C5)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-446) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (96.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.9] (1-116) -IGHG1*03 (CH1 (117-214), hinge (215-229), CH2 (230-339) L1.3>A (233), L1.2>A (234), CH3 (340-444), CHS (445-446) (117-446)], (219-213')-disulfide with lambda2 light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-9*01 (88.20%) -IGLJ2*01) [6.3.11] (1'-108') -IGLC2*01 (109'-214')]; dimer (225-225":228-228")-bisdisulfide

tésidolumab

immunoglobuline G1-lambda2, anti-[*Homo sapiens* C5 (complément C5)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-446) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (96.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.9] (1-116) -IGHG1*03 (CH1 (117-214), charnière (215-229), CH2 (230-339) L1.3>A (233), L1.2>A (234), CH3 (340-444), CHS (445-446) (117-446)], (219-213')-disulfure avec la chaîne légère lambda2 (1'-214') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-9*01 (88.20%) -IGLJ2*01) [6.3.11] (1'-108') -IGLC2*01 (109'-214')]; dimère (225-225":228-228")-bisdisulfure

tesidolumab

inmunoglobulina G1-lambda2, anti-[C5 (complemento C5) de *Homo sapiens*], anticuerpo monoclonal de *Homo sapiens*;
cadena pesada gamma1 (1-446) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (96.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.9] (1-116) -IGHG1*03 (CH1 (117-214), bisagra (215-229), CH2 (230-339) L1.3>A (233), L1.2>A (234), CH3 (340-444), CHS (445-446) (117-446)], (219-213')-disulfuro con la cadena ligera lambda2 (1'-214') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-9*01 (88.20%) -IGLJ2*01) [6.3.11] (1'-108') -IGLC2*01 (109'-214')]; dímero (225-225":228-228")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGG 50
IGPFFGTANY AQKFQGRVTI TADESTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARDT 100
PYFDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP 150
EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVPSG SLGTQTYICN 200
VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD KTHTCPPCPA PEAAGGPSVF LFPPKPKDTL 250
MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR 300
VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL 350
PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTFPVLDSD 400
GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK 446
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
SYELTQPLSV SVALGQTARI TCSGDSIPNY YVYVYQKPG QAPVLVIYDD 50
SNRPSGIPER FSGSNSGNTA TLTISRAQAG DEADYICQSF DSSLNAEVFG 100
GGTKLTVLQG PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVCLISD FYPGAFTVAW 150
KADSSPVKAG VETTTPSKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSCQVTHE 200
GSTVEKTAP TECS 214
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

```
Intra-H (C23-C104) 22-96 143-199 260-320 366-424
                  22"-96" 143"-199" 260"-320" 366"-424"
Intra-L (C23-C104) 22"-87" 136"-195"
                  22"-87" 136"-195"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 219-213' 219"-213"
Inter-H-H (h 11, h 14) 225-225" 228-228"
```

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
296, 296"

toreforantum

toreforant


5-(4,6-dimethyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)-4-methyl-*N*-[3-(1-methylpiperidin-4-yl)propyl]pyrimidin-2-amine

toréforant

5-(4,6-diméthyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)-4-méthyl-*N*-[3-(1-méthylpipéridin-4-yl)propyl]pyrimidin-2-amine

toreforant

5-(4,6-dimetil-1*H*-benzoimidazol-2-il)-4-metil-*N*-[3-(1-metilpiperidin-4-il)propil]pirimidin-2-amina

C₂₃H₃₂N₆

trofinetidum

trofinetide


glycyl-2-methyl-L-prolyl-L-glutamic acid

trofinétide

acide glycyl-2-méthyl-L-prolyl-L-glutamique

trofinetida

ácido glicil-2-metil-L-prolil-L-glutámico

 $C_{13}H_{21}N_3O_6$ **vandortuzumabum vedotinum #**

vandortuzumab vedotin

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* STEAP1 (six-transmembrane epithelial antigen of the prostate 1, PRSS24, STEAP)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-454) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV3-48*03 (80.80%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [9.7.17] (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (221) (125-222), hinge (223-237), CH2 (238-347), CH3 (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-220')-disulfide with kappa light chain (1'-220') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (81.20%) -IGKJ1*01) [12.3.9] (1'-113') -*Homo sapiens* IGKC*01 (114'-220')]; dimer (233-233":236-236")-bisdisulfide; conjugated, on an average of 3 to 4 cysteinyl, to monomethylauristatin E (MMAE), via a cleavable maleimidocaproyl-valyl-citrullinyl-*p*-aminobenzyloxycarbonyl (mc-val-cit-PABC) type linker For the *vedotin* part, please refer to the document "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*"*.

vandortuzumab védotine

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* STEAP1 (antigène épithélial 1 à six-transmembrane de la prostate, PRSS24, STEAP)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1(1-454) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-48*03 (80.80%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [9.7.17] (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (221) (125-222), charnière (223-237), CH2 (238-347), CH3 (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-220')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-220') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (81.20%) -IGKJ1*01) [12.3.9] (1'-113') -*Homo sapiens* IGKC*01 (114'-220')]; dimère (233-233":236-236")-bisdisulfure; conjugué, sur 3 à 4 cystéinyl en moyenne, au monométhylauristatine E (MMAE), via un linker clivable de type maléimidocaproyl-valyl-citrullinyl-*p*-aminobenzyloxycarbonyl (mc-val-cit-PABC) Pour la partie *védotine*, veuillez-vous référer au document "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*"*.

vandortuzumab vedotina

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[STEAP1 de *Homo sapiens* (antígeno epitelial 1 seis-transmembrana de la próstata, PRSS24, STEAP)], anticuerpo monoclonal humanizado;

cadena pesada gamma1 (1-454) [VH humanizada (*Homo sapiens* IGHV3-48*03 (80.80%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [9.7.17] (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (221) (125-222), bisagra (223-237), CH2 (238-347), CH3 (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-220')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-220') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (81.20%) -IGKJ1*01) [12.3.9] (1'-113') -*Homo sapiens* IGKC*01 (114'-220')]; dímero (233-233":236-236")-bisdisulfuro;

conjugado, en 3 – 4 restos cisteinil por término medio, con monometilauristatina E (MMAE), mediante una secuencia de conexión escindible de tipo maleimidocaproil-valil-citrulinil-*p*-aminobenciloxicarbonil (mc-val-cit-PABC)

La fracción vedotina pueden encontrarla en el documento "INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others".

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVQLVESGGG	LVQPGGSLRL	SCAVSGYSIT	SDYAWNWRQV	APGKGLEWVG	50
YISNNGSTSY	NPSLKSRTTI	SRDTSKNTLY	LQMNSLRAED	TAVIYCARER	100
NYDYDDYYA	MDYVQQTIVL	TVSSASTKGP	SVFLAPPSK	STSGGTAALG	150
CLVKDYFPEP	VTYSWNSGAL	TSGVHTFPAV	LQSSGLYSLS	SVTVFPSSSL	200
GTQTYICNVN	HKPSNTKVDK	KVEPKSCDKT	HTCPCCPAPE	LLGGPSVPELF	250
PPKPKDTLMI	SRTPEVTCVV	VDVSHEDPEV	KFNWYVDGVE	VHNAKTKPRE	300
EQYNSTYRVV	SVLTVLHQDW	LNGKEYKCKV	SNKALPAPIE	KTISKAKGQP	350
REPQVYTLFP	SREEMTKNQV	SLTCLVKGFY	PSDIAVEWES	NGQPENNYKT	400
TPPVLDSDGS	FFLYSKLTVD	KSRWQQGNVF	SCSVMHEALH	NHYTKQSLSL	450
SPGK					454

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS	LSASVGRDVT	ITCKSSQSL	YRSNOKNYLA	WYQQKPGKAP	50
RLTIWASTRA	ESGVPSRFG	SGSGTDFTLT	ISSLQPEDFA	TYQCQYNYN	100
PRTFGGGTKV	EIKRTVAAPS	VFIPPPSDEQ	LKSGTASVVC	LLANFYPREA	150
KVQWKVDNAL	QSGNSQESVT	EQDSKDSYTS	LSSITLTLKA	DYERHKVYAC	200
EVTHQGLSSP	VTSKFNRGEC				220

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22-96	151-207	268-328	374-432
	22"-96"	151"-207"	268"-328"	374"-432"

Intra-L (C23-C104) 23'-94' 140"-200"

Inter-H-L* (h 5-CL 126) 227-220' 227"-220"

Inter-H-H* (h 11, h 14) 233-233" 236-236"

*Two or three of the inter-chain disulfide bridges are not present, an average of 3 to 4 cysteinyl being conjugated each via a thioether bond to a drug linker.

*Deux ou trois des ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas présents, 3 à 4 cystéinyl en moyenne étant chacun conjugué via une liaison thioéther à un linker-principe actif.

*Faltan dos o tres puentes disulfuro inter-catenarios, una media de 3 a 4 cisteinil está conjugada a conectores de principio activo.

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
304, 304

verosudilum

verosudil



rac-(2*R*)-2-(dimethylamino)-*N*-(1-oxo-1,2-dihydroisoquinolin-6-yl)-2-(thiophen-3-yl)acetamide

vérosudil

rac-(2*R*)-2-(diméthylamino)-*N*-(1-oxo-1,2-dihydroisoquinoléin-6-yl)-2-(thiophén-3-yl)acétamide

verosudil

rac-(2*R*)-2-(dimetilamino)-*N*-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolein-6-il)-2-(tiofen-3-il)acetamida

**verubecestatum**

verubecestat


N-{3-[(5*R*)-3-amino-2,5-dimethyl-1,1-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1λ⁶,2,4-thiadiazin-5-yl]-4-fluorophenyl}-5-fluoropyridine-2-carboxamide

vérubécestat

N-{3-[(5*R*)-3-amino-2,5-diméthyl-1,1-dioxo-1,2,5,6-tétrahydro-1λ⁶,2,4-thiadiazin-5-yl]-4-fluorophényl}-5-fluoropyridine-2-carboxamide

verubecestat

N-{3-[(5*R*)-3-amino-2,5-dimetil-1,1-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1λ⁶,2,4-tiadiazin-5-il]-4-fluorofenil}-5-fluoropiridina-2-carboxamida
 $\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{F}_2\text{N}_3\text{O}_3\text{S}$

**vosoritidum**

vosoritide

A modified recombinant human C-type natriuretic peptide (CNP) consisting of 39 amino acids comprised of the 37 C-terminal amino acids of the human CNP sequence plus the addition of 2 amino acids (Pro-Gly) on the *N*-terminus, produced in *Escherichia coli*:
 L-prolylglycyl-(human C-type natriuretic peptide-(17-53)-peptide (CNP-37)), cyclic-(23-39)-disulfide

vosoritide

peptide natriurétique de type C humain modifié consistant en une séquence de 39 acides aminés comprenant les 37 acides aminés C-terminaux du peptide humain CNP plus deux acides aminés (Pro-Gly) *N*-terminaux, produit par *Escherichia coli*:
 L-prolylglycyl-(peptide natriurétique de type C humain-(17-53)-peptide (CNP-37)), (23-39)-disulfure cyclique

vosoritida

péptido natriurético de tipo C humano modificado consistente en una secuencia de 39 aminoácidos que comprende los 37 aminoácidos C-terminales del péptido humano CNP más dos aminoácidos (Pro-Gly) *N*-terminales, producido por *Escherichia coli*:
 L-proilglicil-(péptido natriurético de tipo C humano-(17-53)-péptido (CNP-37)), (23-39)-disulfuro cíclico



Sequence / Séquence / Secuencia

PGQEHFNARK YKGANKKGLS KGCFGLKLDL IGSMSSGLGC 39

Disulfide bridge location / Position du pont disulfure / Posición del puente disulfuro
23-39**zuretinoli acetat**


zuretinol acetate

(2*E*,4*E*,6*Z*,8*E*)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl acetate

acétate de zurétinol

acétate de (2*E*,4*E*,6*Z*,8*E*)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohex-1-én-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraén-1-yle

acetato de zuretinol

acetato de (2*E*,4*E*,6*Z*,8*E*)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohex-1-en-1-il)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ilo# Electronic structure available on Mednet: <http://mednet.who.int/># Structure électronique disponible sur Mednet: <http://mednet.who.int/># Estructura electrónica disponible en Mednet: <http://mednet.who.int/>* <http://www.who.int/medicines/services/inn/publication/en/>

**AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES
MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES**

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 29

Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 29

Denominaciones Comunes Internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 29

(WHO Drug Information, Vol. 3, No. 3, 1989)

p. 7 natrii pentosani polysulfas

pentosan polysulfate sodium

replace the chemical name, the molecular formula by the following ones and insert the following structure

pentosane polysulfate sodique

remplacer le nom chimique, la formule moléculaire par les suivants et insérer la structure suivante

pentosano polisulfato de sodio


sustitúyase el nombre químico, la fórmula molecular por los siguientes y insértese la estructura siguiente

a mixture of the sodium salts of linear polymers of (1→4)-β-D-xylopyranan usually sulfated at the 2-and 3-positions and occasionally (approximately 1 in every 10 residues) substituted at the 2-position with a (4-O-methyl-2,3-di-O-sulfo-α-D-glucopyranosyluronic acid) group; the average molecular weight lies between 4000 and 6000 with a total molecular weight range of 1000 to 40000

un mélange de sels de sodium de polymères linéaires de (1→4)-β-D-xylopyranane habituellement sulfatés en positions 2 et 3 et parfois (approximativement 1 résidu sur 10) substitué en position 2 avec un groupe acide 4-O-méthyl-2,3-di-O-sulfo-α-D-glucopyranosyluronique; le poids moléculaire moyen est compris entre 4000 et 6000 avec un poids moléculaire total compris entre 1000 et 40000

una mezcla de sales sódicas de polímeros lineales de (1→4)-β-D-xilopiranoano generalmente sulfatados en posiciones 2 y 3 y ocasionalmente (aproximadamente 1 resto cada 10) sustituido en posición 2 por un grupo ácido 4-O-metil-2,3-di-O-sulfo-α-D-glucopiranosilurónico; el peso molecular medio está comprendido entre 4000 y 6000 con un peso molecular total comprendido entre 1000 y 40000

$(C_5H_6Na_2O_{10}S_2)_n (C_7H_8Na_2O_9S)_0.1n (Na_2O_7S_2)$, average $n = \text{ca } 11 \text{ to } 16$



Procedure and Guiding Principles / Procédure et Directives / Procedimientos y principios generales

The text of the *Procedures for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* and *General Principles for Guidance in Devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* will be reproduced in proposed INN lists only.

Les textes de la *Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques* et des *Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux substances pharmaceutiques* seront publiés seulement dans les listes des DCI proposées.

El texto de los *Procedimientos de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas* y de los *Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas* aparece solamente en las listas de DCI propuestas.