

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

RECOMMENDED International Nonproprietary Names: List 81

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9); Resolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy. Lists of Proposed (1–117) and Recommended (1–78) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 17, 2017* (available in CD-ROM only).

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES: Liste 81

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [*Actes off. Org. mond. Santé*, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9); résolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie. On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–117) et recommandées (1–78) dans la *Liste récapitulative No. 17, 2017* (disponible sur CD-ROM seulement).

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS: Lista 81

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [*Act. Of. Mund. Salud*, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9); Resolución EB115.R4 (EB115/2005/REC/1) EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia. Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–117) y Recomendadas (1–78) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 17, 2017* (disponible sólo en CD-ROM).

Latin, English, French, Spanish:
Recommended INN

Chemical name or description; Molecular formula; Graphic formula

DCI Recommandée

Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée

DCI Recomendada

Nombre químico o descripción; Fórmula molecular; Fórmula desarrollada

abelacimabum #
abelacimab

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* F11 (coagulation factor XI, FXI, plasma thromboplastin antecedent, PTA)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.15] (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (219) (123-220), hinge (221-235), CH2 D27>A (270), P114>A (334) (236-345), CH3 E12 (361), M14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-215')-disulfide with lambda light chain (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-44*01 (93.5%) -IGLJ2*01 (100%)) [8.3.11] (1'-110') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (111'-216'')]; dimer (231-231'':234-234'')-bisdisulfide

abélacimab

immunoglobuline G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* F11 (facteur de coagulation XI, FXI, antécédent de la thromboplastine plasmatique, PTA)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.15] (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (219) (123-220), charnière (221-235), CH2 D27>A (270), P114>A (334) (236-345), CH3 E12 (361), M14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-215')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-44*01 (93.5%) -IGLJ2*01 (100%)) [8.3.11] (1'-110') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (111'-216'')]; dimère (231-231'':234-234'')-bisdisulfure

abelacimab

inmunoglobulina G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* F11 (factor de coagulación XI, FXI, antecedente de la tromboplastina plasmática, PTA)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.15] (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (219) (123-220), bisagra (221-235), CH2 D27>A (270), P114>A (334) (236-345), CH3 E12 (361), M14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-215')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-44*01 (93.5%) -IGLJ2*01 (100%)) [8.3.11] (1'-110') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (111'-216'')]; dímero (231-231'':234-234'')-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada						
QVQLLES	GGG	LVQPGGSLRL	SCAASGFTFS	TAAMSWVRQA	PGKGLEWVSG	50
ISGSGS	STYY	ADSVKGRFTI	SRDMSKNTLY	LQMNSLRAED	TAVYYCAREL	100
SYLYSGYYFD		YWGQGT	LVTV	SSASTKGPSV	FPLAPSSKST	SGGTAALGCL 150
VKDYFPPEPVT		VSWNSGALTS	GVHTFPAVLQ	SSGLYSLSSV	VTVPSSSLGT	200
QTYICNVNHHK		PSNTKYDKRV	EPKSCDKTHT	CPPCPAPELL	GGPSVFLFPP	250
KPKDTLMISR		TPEVTCVVVA	VSHEDPEVKF	NWYVDGVEVH	NAKTKPREEQ	300
YNSTYRVSV		LTVLHQDWLN	GKEYCKVSN	KALAAPIEKT	ISKAKGQPRE	350
PQVYTLPPSR		EEMTKNQVSL	TCLVKGFPYS	DIAVEWESNG	QPENNYKTTT	400
PVLDSDSGSFF		LYSKLTVDKS	RWQGNVFCFS	SVMHEALHNH	YTQKSLSLSP	450
GK						452
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera						
QSVLTQPPSA		SGTPGQRTVI	SCGSSSSNIG	SNDVSWYQQL	PGTAPKLLIY	50
KNYNRPSGV		DRFSGSKSGT	SASLAISGLQ	SEDEADYYCS	AWDQRQFDV	100
FGGGTKLTVL		GQPKAAPSVT	LFPPSSEELQ	ANKATLVCLI	SDFYPGAVTV	150
AWKADSSPVK		AGVETTTPSK	QSNNKYAASS	YLSLTPEQWK	SHRSYSQCVT	200
HEGSTVEKTV		APTECS				216
Post-translational modifications						
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro						
Intra-H (C23-C104)	22-96	149-205	266-326	372-430		
	22"-96"	149"-205"	266"-326"	372"-430"		
Intra-L (C23-C104)	22'-89'	138'-197'				
	22""-89""	138""-197""				
Inter-H-L (h 5-CL 126)	225-215'	225"-215"				
Inter-H-H (h 11, h 14)	231-231"	234-234"				
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación						
H CH2 N84.4:						
302, 302"						
fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados						
N-terminal glutamine cyclization to pyroglutamate (pE, 5-oxoproline)						
H VH Q1: 1, 1"						
L VL Q1: 1, 1"						
C-terminal lysine clipping						
H CHS K2: 452, 452"						

abivertinibum

abivertinib



N-[3-({[2-[3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)anilino]-7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-yl]oxy)phenyl]prop-2-enamide

abivertinib

N-[3-({[2-[3-fluoro-4-(4-méthylpipérazin-1-yl)anilino]-7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-yl]oxy)phényl]prop-2-énamide

abivertinib

N-[3-({[2-[3-fluoro-4-(4-metilpiperazin-1-il)anilino]-7*H*-pirrolo[2,3-*d*]pirimidin-4-il]oxi)fenil]prop-2-enamida



adriforantum


adriforant

N-(cyclopropylmethyl)-6-[(3*R*)-3-(methylamino)pyrrolidin-1-yl]pyrimidine-2,4-diamine

adriforant

N-(cyclopropylméthyl)-6-[(3*R*)-3-(méthylamino)pyrrolidin-1-yl]pyrimidine-2,4-diamine

adriforant

N-(ciclopropilmetil)-6-[(3*R*)-3-(metilamino)pirrolidin-1-il]pirimidina-2,4-diamina $C_{13}H_{22}N_6$ **alteminostat**


alteminostat

N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-4-methyl-*N*-[4-(1-methyl-1*H*-indazol-6-yl)phenyl]piperazine-1-carboxamide

altéminostat

N-[7-(hidroxi-amino)-7-oxoheptil]-4-méthyl-*N*-[4-(1-méthyl-1*H*-indazol-6-yl)phényl]pipérazine-1-carboxamide

alteminostat

N-[7-(hidroxi-amino)-7-oxoheptil]-4-metil-*N*-[4-(1-metil-1*H*-indazol-6-il)fenil]piperazina-1-carboxamida $C_{27}H_{36}N_6O_3$ **amelparibum**


amelparib

10-ethoxy-8-[(morpholin-4-yl)methyl]-2,3,4,6-tetrahydrobenzo[*h*][1,6]naphthyridin-5(1*H*)-one

amelparib

10-éthoxy-8-[(morpholin-4-yl)méthyl]-2,3,4,6-tétrahydrobenzo[*h*][1,6]naphtyridin-5(1*H*)-one

amelparib

10-etoxi-8-[(morfolin-4-il)metil]-2,3,4,6-tetrahydrobenzo[*h*][1,6]naftiridin-5(1*H*)-ona $C_{19}H_{25}N_3O_3$ 

amlivirsenum

amlivirsén

all-P-ambo-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-P-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidine 5'-(1-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-13,13-bis{[3-({6-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino}-3-oxopropoxy)methyl]-8,15,19-trioxo-11-oxa-7,14,20-triazahexacosan-26-yl hydrogen phosphate)

amlivirsén

5'-(hydrogénophosphate de 1-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-13,13-bis{[3-({6-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino}-3-oxopropoxy)méthyl]-8,15,19-trioxo-11-oxa-7,14,20-triazahexacosan-26-yle) de *tout-P-ambo-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-5-méthyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthylcytidine*

amlivirsén

5'-(hidrogenofosfato de 1-[(2-acetamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]-13,13-bis{[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]hexil)amino}-3-oxopropoxi]metil]-8,15,19-trioxo-11-oxa-7,14,20-triazahexacosan-26-ilo) de *todo-P-ambo-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiouridilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metilcitidina*

C₂₉₆H₄₂₈N₉₆O₁₄₄P₂₀S₁₉

R1-moeG=moeCm=moeA=moeG=moeA=dG=dG=dT=dG=dA=
dA=dG=dCm=dG=dA=moeA=moeG=moeUm=moeG=moeCm

Legend:


d as prefix = 2'-deoxy

m as suffix = 5-methyl

moe as prefix =

2'-O-(2-methoxyethyl)

= is for



amprelozetinum

amprelozetine


ampréloxétine

amprelozetina

4-{2-[(2,4,6-trifluorophenoxy)methyl]phenyl}piperidine

4-{2-[(2,4,6-trifluorophénoxy)méthyl]phényl}pipéridine

4-{2-[(2,4,6-trifluorofenoxi)metil]fenil}piperidina

C₁₈H₁₈F₃NO

asalhydromorphonum

asalhydromorphone


asalhydromorphone

asalhidromorfona

17-methyl-4,5α-epoxy-6,7-didehydromorphinan-3,6-diyl bis[2-(acetyloxy)benzoate]

bis[2-(acétyloxy)benzoate] de 17-méthyl-4,5α-époxy-6,7-didéshydromorphinane-3,6-diyle

bis[2-(acetiloxi)benzoato] de 17-metil-4,5α-epoxi-6,7-dideshidromorfinano-3,6-diilo

C₃₅H₃₁NO₉

aticaprantum


aticaprant

4-(4-[[[(2*S*)-2-(3,5-dimethylphenyl)pyrrolidin-1-yl]methyl]phenoxy]-3-fluorobenzamide

aticaprant

4-(4-[[[(2*S*)-2-(3,5-diméthylphényl)pyrrolidin-1-yl]méthyl]phénoxy]-3-fluorobenzamide

aticaprant

4-(4-[[[(2*S*)-2-(3,5-dimetilfenil)pirrolidin-1-il]metil]fenoksi)-3-fluorobenzamida $C_{26}H_{27}FN_2O_2$ **avasopasemum manganum**


avasopasem manganese

(PBPY-7-11-2344'3')-dichlorido[(1¹*S*,1²*S*,7¹*S*,7²*S*)-2,6,8,11-tetraaza-4(2,6)-pyridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacycloundecaphane-κ⁵*N*²,*N*⁴,*N*⁶,*N*⁸,*N*¹¹]*manganese*

avasopasem manganèse

(PBPY-7-11-2344'3')-dichlorido[(1¹*S*,1²*S*,7¹*S*,7²*S*)-2,6,8,11-tetraaza-4(2,6)-pyridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacycloundécaphane-κ⁵*N*²,*N*⁴,*N*⁶,*N*⁸,*N*¹¹]*manganese*

avasopasem manganeso

(PBPY-7-11-2344'3')-diclorido[(1¹*S*,1²*S*,7¹*S*,7²*S*)-2,6,8,11-tetraaza-4(2,6)-piridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacicloundecafano-κ⁵*N*²,*N*⁴,*N*⁶,*N*⁸,*N*¹¹]*manganese* $C_{21}H_{35}Cl_2MnN_5$ **avoplaceum**

avoplaceum

human culture expanded allogenic adherent mesenchymal-like stromal cells for cell-based therapy. Cells are of fetal origin and derived from isolated placentae of healthy donors following a cesarean section. Cells express cell surface markers CD29, CD73, and CD105 and exhibit immunomodulatory, and pro-angiogenic and muscle regeneration effects.

avoplace

cellules stromales semblables au mésenchyme, humaines, allogéniques, adhérentes, en culture d'expansion, pour thérapie cellulaire. Les cellules sont d'origine fœtale et dérivent du placenta isolé de donneuses en bonne santé, à la suite d'une césarienne. Les cellules expriment les marqueurs de surface CD29, CD73 et CD105 et montrent des effets immunomodulateurs, pro-angiogéniques et de régénération musculaire.

avoplace

células similares a mesenquimales, estromales, alogénicas, humanas, expandidas en cultivo para terapia celular. Las células son de origen fetal y derivadas de placentas aisladas de donantes sanas tras una cesárea. Las células expresan los marcadores de superficie CD29, CD73 y CD105, y poseen efectos inmunomoduladores, pro-angiogénicos y de regeneración muscular.

azelapragum

azelaprag


(2*S*,3*R*)-*N*-[4-(2,6-dimethoxyphenyl)-5-(5-methylpyridin-3-yl)-4*H*-1,2,4-triazol-3-yl]-3-(5-methylpyrimidin-2-yl)butane-2-sulfonamide

azélaprag

(2*S*,3*R*)-*N*-[4-(2,6-diméthoxyphényl)-5-(5-méthylpyridin-3-yl)-4*H*-1,2,4-triazol-3-yl]-3-(5-méthylpyrimidin-2-yl)butane-2-sulfonamide

azelaprag

(2*S*,3*R*)-*N*-[4-(2,6-dimetoxifenil)-5-(5-metilpiridin-3-il)-4*H*-1,2,4-triazol-3-il]-3-(5-metilpirimidin-2-il)butano-2-sulfonamida

C₂₅H₂₉N₇O₄S**bamadutidum**

bamadutide

L-histidyl-D-seryl-L-glutaminyglycyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-seryl-L-lysyl-L-glutaminy-L-*N*⁶-(*N*-hexadecanoyl-L-γ-glutamyl)-L-lysyl-L-α-glutamyl-L-seryl-L-lysyl-L-alanyl-L-alanyl-L-glutaminy-L-α-aspartyl-L-phenylalanyl-L-isoleucyl-L-α-glutamyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-lysyl-L-alanylglycylglycyl-L-prolyl-L-seryl-L-serylglycyl-L-alanyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-L-serinamide

bamadutide

L-histidyl-D-séryl-L-glutaminylglycyl-L-thréonyl-L-phénylalanil-L-thréonyl-L-séryl-L- α -aspartyl-L-leucyl-L-séryl-L-lysyl-L-glutaminyL-*N*⁶-(*N*-hexadécanoil-L- γ -glutamyl)-L-lysyl-L- α -glutamyl-L-séryl-L-lysyl-L-alanyl-L-alanyl-L-glutaminyL-L- α -aspartyl-L-phénylalanil-L-isoleucyl-L- α -glutamyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-lysyl-L-alanylglycylglycyl-L-prolyl-L-séryl-L-sérylglycyl-L-alanyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-L-sérinamide

bamadutida


L-histidil-D-seril-L-glutaminilglicil-L-treonil-L-fenilalanil-L-treonil-L-seril-L- α -aspartil-L-leucil-L-seril-L-lisil-L-glutaminiL-*N*⁶-(*N*-hexadecanoil-L- γ -glutamyl)-L-lisil-L- α -glutamyl-L-seril-L-lisil-L-alanil-L-alanil-L-glutaminil-L- α -aspartil-L-fenilalanil-L-isoleucil-L- α -glutamyl-L-triptofil-L-leucil-L-lisil-L-alanilglicilglicil-L-prolil-L-seril-L-serilglicil-L-alanil-L-prolil-L-prolil-L-prolil-L-serinamida

C₂₀₀H₃₁₃N₅₁O₆₃

Sequence / Séquence / Secuencia

HSQGTFTSDL SKQKESKAAQ DFIEWLKAGG PSSGAPPPS 39

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



bempegaldesleukinum #
bempegaldesleukin


human interleukin-2 variant (Ala¹ removed, C¹²⁵>S) produced in *Escherichia coli*, in which an average of 6 lysine residues are *N*⁶ substituted with [(2,7-bis[[methylpoly(oxyethylene)]carbamoyl]-9*H*-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl

bempegaldesleukine

variant de l'interleukine 2 humaine (Ala1 supprimée, C¹²⁵>S), produit par *Escherichia coli*, dans lequel environ 6 lysines sont *N*⁶ substituées par le radical [(2,7-bis[[méthylpoly(oxyéthylène)]carbamoyl]-9*H*-fluorén-9-yl)méthoxy]carbonyle

bempegaldesleukina

variante de la interleukina 2 humana (Ala1 suprimida, C¹²⁵>S), producida por *Escherichia coli*, en la que una media de 6 lisinas son *N*⁶ sustituidas por el radical [(2,7-bis[[metilpoli(oxietileno)]carbamoiil]-9*H*-fluoren-9-il)metoxi]carbonilo




Sequence (132 residues) / Séquence (132 résidus) / Secuencia (132 restos)

PTSSSTKKT QLQLEHLLLD LQMILNGINN YKNPKLTRML TFKFYMPKKA 50
 TELKHLQCLE EELKPLEEVL NLAQSKNFHL RPRDLISNIN VIVLELK6SE 100
 TTFMCEYADE TATIVEFLNR WITFSQSIIS TLT 133

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro 58-105

Pegylated residues / Résidus pegylés / Restos pegilados

**bevifimodum #**

bevifimod

staphylococcal protein A (SpA), purified from *Staphylococcus aureus* strain A676 culture medium

bévifimod

protéine A staphylococcique (SpA), purifiée à partir de milieu de culture de la souche A676 de *Staphylococcus aureus*

bevifimod

proteína A estafilocócica (SpA), purificada a partir del medio de cultivo de la cepa A676 de *Staphylococcus aureus*

Sequence / Séquence / Secuencia

AQHDEAQQNA FYQVLNMPNL NADQRNGFIQ SLKDDPSQSA NVLGEAQKLN 50
 DSQAPKADAQ QNNFNKDQSS AFYEILNMPN LNEAQRNGFI QSLKDDPSQS 100
 TNVLGEAKKL NESQAPKADN NFNKEQQNAF YEILNMPNLN EEQRNGFIQS 150
 LKDDPSQSAN LLSEAKKLNE SQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLNEE 200
 QRNGFIQSLK DDPQSANLL AEAKKLNDAA APKADNKFNK EQQNAFYEIL 250
 HLPNLTEQOR NGFIQSLKDD PSVSKEILAE AKKLNDAAQAP KEEDNNKPGK 300
 EDNNKPGKED NNNKPGKEDNN KPGKEDGNKP GKEDNNKPGK EDGNKPGKED 350
 NKKPGKEDGN KPGKEDGNKP GKEDGNGVHV VKPGDVTNDI AKANGTTADK 400
 IAADNKLADK NMIKPGQEGS VAK 423

bintrafuspum alfa #

bintrafusp alfa

immunoglobulin G1-lambda, anti-[human programmed cell death 1 ligand 1 (PD-L1, programmed death ligand 1, PDCD1 ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274)], human monoclonal antibody, fused at the C-terminus of both heavy chains via a peptidyl linker (450-471), to a fragment of the mature human extracellular domain of human TGF-beta receptor type-2 (TGFR-2, TGFBR2, transforming growth factor-beta receptor type II)TGFB type II receptor (472-607), dimer, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa; gamma1 heavy chain fused to TGFR-2 (1-607) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 -(IGHD) -IGHJ4*01) [CDRKabatH1: SYIMM (31-35); CDRKabatH2: SIYPSGGITFYADTVKG (50-66); CDRKabatH3: IKLGTVTTVDY (99-109)] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03, (CH1 (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-449, K450del)) (121-449)], (223-215')-disulfide with lambda light chain (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-14*01 - IGLJ1*01) [CDRKabatL1: TGTSSDVGGYNYVS (23-36); CDRKabatL2: DVSNRPS (52-58); CDRKabatL3: SSYTSSSTRV (91-100)] (1'-110') - IGLC1*02 (111'-216')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa

bintrafusp alfa

immunoglobuline G1-lambda, anti-[ligand 1 de la protéine 1 de mort cellulaire programmée humain (PD-L1, ligand 1 de mort programmée, ligand 1 PDCD1, homologue 1 de B7, B7-H1, CD274)], anticorps monoclonal humain, fusionnée à l'extrémité C-terminale des deux chaînes lourdes via un linker peptidique (450-471), à un fragment du domaine extracellulaire du récepteur de type-2 du TGF- β humain (TGFR-2, TGFBR2, récepteur de type-2 du facteur de croissance transformant- β) (472-607), dimère, produit dans des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa; chaîne lourde gamma1 fusionnée au TGFR-2 (1-607) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01)-(IGHD)-(IGHJ4*01) [CDRKabatH1: SYIMM (31-35); CDRKabatH2: SIYPSGGITFYADTVKG (50-66); CDRKabatH3: IKLGTVTVDY (99-109)] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03, CH1 (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-449, K450del)) (121-449)], (223-215')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-14*01)-(IGLJ1*01) [CDRKabatL1: TGTSSDVGGYNYVS (23-36); CDRKabatL2: DVSNRPS (52-58); CDRKabatL3: SSYTSSSTRV (91-100)] (1'-110')-(IGLC1*02 (111'-216'))]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa

bintrafusp alfa

immunoglobulina G1-lambda, anti-[ligando 1 de la proteína 1 de muerte celular programada humana (PD-L1, ligando 1 de muerte programada, ligando 1 PDCD1, homólogo 1 de B7, B7-H1, CD274)], anticuerpo monoclonal humano, fusionado en el extremo C-terminal de las diez cadenas pesadas mediante un conector peptídico (451-471), a un fragmento del dominio mature human extracelular del receptor tipo-2 del TGF- β humano (TGFR-2, TGFBR2, receptor tipo-2 del factor de crecimiento transformante- β) TGF β type II receptor (472-607), dímero, producido en las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicofoma alfa; cadena pesada gamma1 fusionada al TGFR-2 (1-607) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01)-(IGHD)-(IGHJ4*01) [CDRKabatH1: SYIMM (31-35); CDRKabatH2: SIYPSGGITFYADTVKG (50-66); CDRKabatH3: IKLGTVTVDY (99-109)] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03, CH1 (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-449, K450del)) (121-449)], (223-215')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-14*01)-(IGLJ1*01) [CDRKabatL1: TGTSSDVGGYNYVS (23-36); CDRKabatL2: DVSNRPS (52-58); CDRKabatL3: SSYTSSSTRV (91-100)] (1'-110')-(IGLC1*02 (111'-216'))]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicofoma alfa

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada	
EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYIMMWVRQA PGKGLEWVSS	50
IYPSGGITFY ADTVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYVCARIK	100
LGTVTTVDYW GQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK	150
DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT	200
YICNVNHHKPS NTKVDKRVEP KSCDKHTHCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP	250
KDTLMISRTP EVTCVVDVDS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN	300
STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ	350
VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPDSI AVEVESNGQP ENNYKTPPV	400
LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSQSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGA	450
GGGGSGGGGS GGGGSGGGGS GIPPHVQKSV NNDMIVTDNN GAVKFPQCLK	500
FCDVRFSTCD NQKSCSMNCS ITSICEKPQE VCVAVVRKND ENITLETVCH	550
DPKLPYHDFI LEDAASPKCI MKEKKKPGET FFMCSGSSDE CNDNIIFSEE	600
YNTSNPD	607
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera	
QSALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG GYNYVSWYQQ HPGKAPKLMI	50
YDVSNRPSGV SNRFSGSKSG NTASLTISGL QAEDEADYYC SSYTSSSTRV	100
FGTGKTVTL GQPKANPTVT LFPPSPSEELQ ANKATLVCLII SDFYPGAVTV	150
AWKADGSPVK AGVETTKPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT	200
HEGSTVEKTV APTECS	216
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro	
Intra-H: 22-96 147-203 264-324 370-428	
22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"	
Intra-H (TGFR-2) 499-532 502-519 509-515 525-549 569-584 586-591	
499"-532" 502"-519" 509"-515" 525"-549" 569"-584" 586"-591"	
Intra-L: 22'-90' 138'-197'	
22"-90"" 138"-197""	
Inter-H-L: 223-215' 223"-215"	
Inter-H-H: 229-229' 232-232"	
Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N)	
H CH2: Asn-300	
TGFR-2: Asn-518, Asn-542, Asn-602	

birtamimabum #
birtamimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* serum amyloid A (AA) and immunoglobulin amyloid light chain (AL)], monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain (1-449) [VH (*Mus musculus*IGHV10-1*02 (89.8%)/*Homo sapiens*IGHV3-72*01 (84.0%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ4*01 (92.9%)) [8.10.10] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), hinge (218-232), CH2 (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CH5 (448-449)) (120-449)], (222-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-110*01 (91.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-30*02 (87.0%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (91.7%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3A45.1 (158), V101 (196)(113'-219')]; dimer (228-228":231-231")-bisdisulfide

birtamimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* amyloïde A sérique (AA) et chaîne légère amyloïde (AL) d'immunoglobuline)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-449) [VH (*Mus musculus*IGHV10-1*02 (89.8%)/*Homo sapiens*IGHV3-72*01 (84.0%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ4*01 (92.9%)) [8.10.10] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), charnière (218-232), CH2 (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CH5 (448-449)) (120-449)], (222-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-110*01 (91.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-30*02 (87.0%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (91.7%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3A45.1 (158), V101 (196)(113'-219')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure

birtamimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* amiloide A sérica (AA) y cadena ligera amiloide (AL) de inmunoglobulina]], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-449) [VH (*Mus musculus*IGHV10-1*02 (89.8%)/*Homo sapiens*IGHV3-72*01 (84.0%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ4*01 (92.9%)) [8.10.10] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), bisagra (218-232), CH2 (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CH5 (448-449)) (120-449)], (222-219') -disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-110*01 (91.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-30*02 (87.0%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (91.7%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3A45.1 (158), V101 (196)(113'-219')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVQLVESGGG	LVQPGGSLRL	SCAASGFTFN	TYAMYWIRQA	PGKGLEWVAR	50
IRSKSNYYAI	YYADSVKDRF	TISRDDSKNS	LYLQMSLKT	EDTAVYYCAR	100
PYSDSFAYWG	QGTLTVSSA	STKGPSVFLP	APSSKSTSGG	TAALGCLVKD	150
YFPEPVTVSW	NSGALTSGVH	TFPAVLQSSG	LYSLSSVVT	PSSSLGTQTY	200
ICNVNHKPSN	TKVDKRVPEK	SCDKTHTCPP	CPAPELLGGP	SVFLFPPKPK	250
DTLMSRTPE	VTGVVVDVSH	EDPEVKFNWY	VDGVEVHNAK	TKPREEQYNS	300
TYRVVSVLTV	LHQDWLNGKE	YKCKVSNKAL	PAPIEKTISK	AKGQPREPQV	350
YTLPPSREEM	TKNQVSLTCL	VKGFPYSDIA	VEWESNGQPE	NNYKTTPPVL	400
DSGGSFFLYS	KLTVDKSRWQ	QGNVFSCSVM	HEALHNHYTQ	KSLSLSPGK	449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DVVMTQSPLS	LPVTPGEPAS	ISCRSSQSLV	HSTGNTYLHW	YLQKPGQSPQ	50
LLIYKVSNR	SGVPDRFSGS	GSGETDFTLKI	SRVEAEDVGV	YYCSQSTHVP	100
FTFGGKVE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVVL	LNNFYPREAK	150
VQWKNALQ	SGNSQESVTE	QDSKDYSTSL	SSTLTLSKAD	YEKHKVYACE	200
VTHQGLSPV	TKSFNRGEC				219

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22"-98" 146"-202" 263"-323" 369"-427"

22"-98" 146"-202" 263"-323" 369"-427"

Intra-L (C23-C104) 23"-93" 139"-199"

23"-93" 139"-199"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 222"-219' 222"-219"

Inter-H-H (h 11, h 14) 228-228" 231-231"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

299, 299"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

brilaroxazinum

brilaroxazine


6-{4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}-2*H*-1,4-benzoxazin-3(4*H*)-one

brilaroxazine

6-{4-[4-(2,3-dichlorophényl)pipérazin-1-yl]butoxy}-2*H*-1,4-benzoxazin-3(4*H*)-one

brilaroxazina

6-{4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi}-2*H*-1,4-benzoxazin-3(4*H*)-ona

C₂₂H₂₅Cl₂N₃O₃

budigalimabum #

budigalimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-448) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (76.5%) -(IGHD) -IGHJ6*03 (90.9%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-28*01 or IGKV2-29*02 (85.0%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (227-227":230-230")-bisdisulfide

budigalimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-448) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (76.5%) -(IGHD) -IGHJ6*03 (90.9%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (215) (119-216), charnière (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-28*01 or IGKV2-29*02 (85.0%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure

budigalimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-448) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (76.5%) -(IGHD) -IGHJ6*03 (90.9%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (215) (119-216), bisagra (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-28*01 or IGKV2-29*02 (85.0%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EIQLVQSGAE	VKKPGSSVKV	SCKASGYTFT	HYGMNWRQA
VNTYTGEPTY	ADDFKGLRTF	TLDTSTSTAY	MELSSLRSED
EGLGFGDWGQ	GTTVTYVSAS	TKGPSVFPLA	PSSKSTSGGT
FPEPVTWSWN	SGALTSGVHT	FPAVLQSSGL	YSLSSVVTVP
CNVNHKPSNT	KVDKVEPKS	CDKHTCPCPC	PAPEAAGGPS
TLMSIRTPEV	TCVVVDVSHE	DPEVKFNWYV	DGVEVHNAKT
YRVVSVLTVL	HQDWNLNGKEY	KCKVSNKALP	APIEKTISKA
TLPPSREEMT	KNQVSLTCLV	KGFYPSDIAV	EWESNGQPEN
SDGSFFLYSK	LTVDKSRWQQ	GNVFCSCVMH	EALHNHYTQK
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DVVMTQSPLS	LPVTPGEPAS	ISCRSSQSIIV	HSFGDTYLEW
LLIYKVSNRF	SGVPDRFSGS	GSGETFTLKI	SRVEAEDVGV
VTFGQGTKLE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVCL
VQWIKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKDYSTYSL	SSTLTLSKAD
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC		
Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	145-201	262-322
	22"-96"	145"-201"	262"-322"
Intra-L (C23-C104)	23"-93"	139"-199"	
	23"-93"	139"-199"	
Inter-H-L (h 5-CL 126)	221-219"	221"-219"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	227-227"	230-230"	
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación			
H CH2 N84.4:			
298, 298"			
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados			

camsirubicinum
camsirubicin



(8*R*,10*S*)-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy- α -L-*lyxo*-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyethyl)-12-imino-1-methoxy-7,9,10,12-tetrahydrotetracen-5(8*H*)-one

camsirubicine

(8*R*,10*S*)-10-[(3-amino-2,3,6-tridésoxy- α -L-*lyxo*-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyéthyl)-12-imino-1-méthoxy-7,9,10,12-tétrahydrotétracén-5(8*H*)-one

camsirubicina

(8*R*,10*S*)-10-[(3-amino-2,3,6-tridesoxi- α -L-*lixo*-hexopiranosil)oxi]-6,8,11-trihidroxi-8-(2-hidroxietil)-12-imino-1-metoxi-7,9,10,12-tetrahidrotetracen-5(8*H*)-ona



cemiplimabum #
cemiplimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-444) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (86.7%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (118-215), hinge S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS (443-444)) (118-444)], (131-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ3*01 (75.0%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (223-223":226-226")-bisdisulfide

cémiplimab
immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma4 (1-444) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (118-215), charnière S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS (443-444)) (118-444)], (131-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ3*01 (75.0%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (223-223'':226-226'')-bisdisulfure

cemiplimab
inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma4 (1-444) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (118-215), bisagra S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS (443-444)) (118-444)], (131-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ3*01 (75.0%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (223-223'':226-226'')-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
EVQLLESGGV LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NFGMTWVWQA PGKGLEWVSG 50
ISGGGRDTYF ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLKGED TAVYCYVKWG 100
NIYFDYWGQG TLAVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF 150
PEPVTWVSNW GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLGSSVTVPS SSLGKTKYTC 200
NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PFCPPCPAPE FLGGPSVLEF PPKPKDTLMI 250
SRTPETCVV VDVQSDEDEV QFNWYVDGVE VHNKTKPERE EQFNSTYRVV 300
SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP 350
SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TTPVLDSDGS 400
FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLGK 444

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIQMTQSPSS LSASVGSIT ITCRASLSIN TFLNWIYQQK GKAPNLLIYA 50
ASSLHGGSVP RFGSGSGSDT FTLTIRTLQP EDFATYYCQQ SSNTPTFGP 100
GTVDVDFRRT AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKG 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYKHKH VYACEVTHQG 200
LSPSVTKSFN RGEK 214



Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 144-200 258-318 364-422
22'-96" 144"-200" 258"-318" 364"-422"
Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194'
23'''-88''' 134'''-194'''
Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 131-214' 131"-214"
Inter-H-H (h 8, h 11) 223-223" 226-226"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
294, 294"
C-terminal lysine clipping:
H CHS K2: 444, 444"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

cenupatidium
cenupatide
 N^2 -acetyl-L-arginyl-2-methylalanyl-L-arginyl- α -methyl-L-phenylalaninamide

cénupatide
 N^2 -acétyl-L-arginyl-2-méthylalanyl-L-arginyl- α -méthyl-L-phénylalaninamide

cenupatida
 N^2 -acetil-L-arginil-2-metilalanil-L-arginil- α -metil-L-fenilalaninamida

**ceralasertibum**

ceralasertib



(*R*)-imino(methyl)(1-{6-[(3*R*)-3-methylmorpholin-4-yl]-2-(1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-4-yl)pyrimidin-4-yl}cyclopropyl)-λ⁶-sulfanone

céralasertib

(*R*)-imino(méthyl)(1-{6-[(3*R*)-3-méthylmorpholin-4-yl]-2-(1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-4-yl)pyrimidin-4-yl}cyclopropyl)-λ⁶-sulfanone

ceralasertib

(*R*)-imino(metil)(1-{6-[(3*R*)-3-metilmorfolin-4-il]-2-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-4-il)pirimidin-4-il}ciclopropil)-λ⁶-sulfanona

**cimlanodum**

cimlanod


N-hydroxy-5-methylfuran-2-sulfonamide

cimlanod

N-hydroxy-5-méthylfurane-2-sulfonamide

cimlanod

N-hidroxi-5-metilfurano-2-sulfonamida

**cintirorgonum**

cintirorgon


3-[(2*S*)-6-[3-(difluoromethoxy)-5-fluorophenyl]-4-[3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl]-3,4-dihydro-2*H*-1,4-benzoxazin-2-yl]-2,2-dimethylpropanoic acid

cintirorgon

acide 3-[(2*S*)-6-[3-(difluorométhoxy)-5-fluorophényl]-4-[3-(trifluorométhyl)ben-zène-1-sulfonyl]-3,4-dihydro-2*H*-1,4-benzoxazin-2-yl]-2,2-diméthylpropanoïque

cintirorgón

ácido 3-[(2*S*)-6-[3-(difluorometoxi)-5-fluorofenil]-4-[3-(trifluorometil)ben-ceno-1-sulfonyl]-3,4-dihidro-2*H*-1,4-benzoxazin-2-il]-2,2-dimetilpropanoico

C₂₇H₂₃F₆NO₆S

coblopasvirum

coblopasvir


methyl {(2*S*)-1-[(2*S*)-2-(4-{4-[7-(2-[(2*S*)-1-[(2*S*)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoyl]pyrrolidin-2-yl]-1*H*-imidazol-4-yl)-2*H*-1,3-benzodioxol-4-yl]phenyl)-1*H*-imidazol-2-yl]pyrrolidin-1-yl]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl}carbamate

coblopasvir

{(2*S*)-1-[(2*S*)-2-(4-{4-[7-(2-[(2*S*)-1-[(2*S*)-2-[(méthoxycarbonyl)amino]-3-méthylbutanoyl]pyrrolidin-2-yl]-1*H*-imidazol-4-yl)-2*H*-1,3-benzodioxol-4-yl]phényl)-1*H*-imidazol-2-yl]pyrrolidin-1-yl]-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl}carbamate de méthyle

coblopasvir

{(2*S*)-1-[(2*S*)-2-(4-{4-[7-(2-[(2*S*)-1-[(2*S*)-2-[(metoxycarbonil)amino]-3-metilbutanoil]pirrolidin-2-il]-1*H*-imidazol-4-il)-2*H*-1,3-benzodioxol-4-il]fenil)-1*H*-imidazol-2-il]pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo

C₄₁H₅₀N₈O₈

cotadutidum

cotadutide

L-histidyl-L-seryl-L-glutaminylglycyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-α-aspartyl-L-*N*-(*N*-hexadecanoyl-L-γ-glutamyl)-L-lysyl-L-seryl-L-α-glutamyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-α-aspartyl-L-seryl-L-α-glutamyl-L-arginyl-L-alanyl-L-arginyl-L-α-aspartyl-L-phenylalanyl-L-valyl-L-alanyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-α-glutamyl-L-alanylglycylglycine

cotadutide L-histidyl-L-séryl-L-glutaminyglycyl-L-thréonyl-L-phénylalanil-L-thréonyl-L-séryl-L- α -aspartyl-L-*N*⁶-(*N*-hexadécanoyl-L- γ -glutamyl)-L-lysyl-L-séryl-L- α -glutamyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L- α -aspartyl-L-séryl-L- α -glutamyl-L-arginyl-L-alanyl-L-arginyl-L- α -aspartyl-L-phénylalanil-L-valyl-L-alanyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L- α -glutamyl-L-alanylglycylglycine


cotadutida L-histidil-L-seril-L-glutaminilglicil-L-treonil-L-fenilalanil-L-treonil-L-seril-L- α -aspartil-L-*N*⁶-(*N*-hexadécanoil-L- γ -glutamil)-L-lisil-L-seril-L- α -glutamil-L-tirosil-L-leucil-L- α -aspartil-L-seril-L- α -glutamil-L-arginil-L-alanil-L-arginil-L- α -aspartil-L-fenilalanil-L-valil-L-alanil-L-triptofil-L-leucil-L- α -glutamil-L-alanilglicilglicina

C₁₆₇H₂₅₂N₄₂O₅₅

Sequence / Séquence / Secuencia

HSQGTFTSDK SEYLDSEERAR DFVAWLEAGG 30

Modified residue / Résidu modifié / Resto modificado



crovalimabum #
crovalimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* C5 (complement 5)], monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain (1-451) [VH (*Vicugna pacos*IGHV3S1*01 (70.4%)/*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (69.4%) -(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)) [9.8.15] (1-123) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (220) (124-221), hinge (222-236), CH2 L1.2>R (241), G1.1>R (242), S3>K (245), A110>G (333), A115>S (336), P116>S (337) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), M107>L (434), N114>A (440), Q118>R (444), S120>E (446) (347-451), CHS G1>del, K2>del) (124-451)], (226-217')-disulfide with kappa light chain (1'-217') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-13*02 or IGKV1D-13*01 (94.3%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.12] (1'-110') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (156), V101 (194) (111'-217')]; dimer (232-232":235-235")-bisdisulfide

crovalimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* C5 (complément 5)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-451) [VH (*Vicugna pacos*IGHV3S1*01 (70.4%)/*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (69.4%) -(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)) [9.8.15] (1-123) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (220) (124-221), charnière (222-236), CH2 L1.2>R (241), G1.1>R (242), S3>K (245), A110>G (333), A115>S (336), P116>S (337) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), M107>L (434), N114>A (440), Q118>R (444), S120>E (446) (347-451), CHS G1>del, K2>del) (124-451)], (226-217')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-217') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-13*02 or IGKV1D-13*01 (94.3%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.12] (1'-110') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (156), V101 (194) (111'-217')]; dimère (232-232":235-235")-bisdisulfure

crovalimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* C5 (complemento 5)], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-451) [VH (*Vicugna pacos* IGHV3S1*01 (70.4%)/*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (69.4%) -(IGHD)-*Homo sapiens* IGHJ4*01 (100%)] [9.8.15] (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (220) (124-221), bisagra (222-236), CH2 L1.2>R (241), G1.1>R (242), S3>K (245), A110>G (333), A115>S (336), P116>S (337) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), M107>L (434), N114>A (440), Q118>R (444), S120>E (446) (347-451), CHS G1>del, K2>del) (124-451)], (226-217')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-217') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-13*02 or IGKV1D-13*01 (94.3%) -IGKJ4*01 (100%)] [6.3.12] (1'-110') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (156), V101 (194) (111'-217''); dímero (232-232":235-235")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTVH SSSYYMAWVRQ APGKGLEWVG 50
AIFTGSGAEY KAEWAKGRVT ISKDTSKNQV VLTMTNMDPV DTATYYCASD 100
AGYDYPHTAM HYWGQGLTVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC 150
LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLS VVTVPSSSLG 200
TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL RRGPKVFLFP 250
PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNNYVDGVEV HNAKTKPREE 300
QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYCKCKV NKGLPSSIEK TISKAKGQPR 350
EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT 400
PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVLHEALHA HYTRKELSL 450
P 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SSLAWYQQKP GKAPKLLIYG 50
ASETESGVPS RFSGSQSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQN TKVGS SYGNT 100
FGGGTKVEIK RTVAAPSVFI FPPSDEQLKS GTASVVCLLN NFYPREAKVQ 150
WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYLSLS TLTLSKADYE KHKVYACEVT 200
HQGLSSPVTK SFNRGEC 217

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-97 150-206 267-327 373-431
22"-97" 150"-206" 267"-327" 373"-431"
Intra-L (C23-C104) 23'-88' 137'-197'
23'"-88'" 137'"-197'"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 226-217' 226"-217"
Inter-H-H (h 11, h 14) 232-232" 235-235"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
303, 303"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

danicopanum
danicopan



(2*S*,4*R*)-1-[[3-acetyl-5-(2-methylpyrimidin-5-yl)-1*H*-indazol-1-yl]acetyl]-*N*-(6-bromopyridin-2-yl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide

danicopan

(2*S*,4*R*)-1-[[3-acétyl-5-(2-méthylpyrimidin-5-yl)-1*H*-indazol-1-yl]acétyl]-*N*-(6-bromopyridin-2-yl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide

danicopán

(2*S*,4*R*)-1-[[3-acetil-5-(2-metilpirimidin-5-il)-1*H*-indazol-1-il]acetil]-*N*-(6-bromopiridin-2-il)-4-fluoropirrolidina-2-carboxamida

**dersimelagonum**

dersimelagon



1-[2-[(3*S*,4*R*)-1-[(3*R*,4*R*)-1-cyclopentyl-3-fluoro-4-(4-methoxyphenyl)pyrrolidine-3-carbonyl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-3-yl]-5-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid

dersimélagon

acide 1-[2-[(3*S*,4*R*)-1-[(3*R*,4*R*)-1-cyclopentyl-3-fluoro-4-(4-méthoxyphényl)pyrrolidine-3-carbonyl]-4-(méthoxyméthyl)pyrrolidin-3-yl]-5-(trifluorométhyl)phényl]pipéridine-4-carboxylique

dersimelagón

ácido 1-[2-[(3*S*,4*R*)-1-[(3*R*,4*R*)-1-ciclopentil-3-fluoro-4-(4-metoxifenil)pirrolidina-3-carbonil]-4-(metoximetil)pirrolidin-3-il]-5-(trifluorometil)fenil]piperidina-4-carboxílico

**dilanubicelum**

dilanubichel

Allogeneic umbilical cord CD34⁺ enriched blood cells. The drug substance consists of the total progeny generated from culture of enriched CD34⁺ umbilical cord blood cells that have been cultured *ex vivo* in the presence of immobilised engineered Notch ligand Delta1^{ext}-IgG (DXI) and recombinant cytokines. Cell phenotype distribution: CD3, CD7, CD14, CD15, CD16+CD56+ (both stained together), CD34, CD41, CD45RA, CD56, and CD90. Cells are intended to enhance reconstitution in hematopoietic stem cell transplantation patients with high risk of iatrogenic conditioning-related prolonged pancytopenia.

dilanubichel

cellules du sang de cordon ombilical, allogéniques, enrichies en CD34⁺. Le principe actif consiste en la totalité de la descendance générée par la culture des cellules de sang de cordon ombilical enrichies en CD34⁺ mises en culture *ex vivo* en présence de ligand Notch Delta1^{ext}-IgG (DXI) immobile et de cytokines recombinantes. Distribution du phénotype cellulaire: CD3, CD7, CD14, CD15, CD16+CD56+ (les deux teintés ensemble), CD34, CD41, CD45RA, CD56, et CD90. Les cellules sont destinées à accroître la récupération après une transplantation de cellules souches hématopoïétiques, des patients avec un fort risque de pancytopenie prolongée lié à la condition iatrogénique.

dilanubicel

Células de sangre de cordón umbilical, alogénicas, enriquecidas en CD34+. El principio activo consta del total de la progenie generada en el cultivo de células de sangre de cordón umbilical enriquecidas en CD34+ que se han cultivado *ex vivo* en presencia del ligando ingenierizado de Notch Delta1^{ext-IgG} (DXI) inmovilizado y de citoquinas recombinantes. Distribución del fenotipo celular: CD3, CD7, CD14, CD15, CD16+CD56+ (ambos teñidos juntos), CD34, CD41, CD45RA, CD56 y CD90. Las células se pretenden usar para potenciar la reconstitución en pacientes sometidos a trasplante de células troncales hematopoyéticas con alto riesgo de pancitopenia prolongada, relacionada con el acondicionamiento iatrogénico.

dilpacimabum

dilpacimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* DLL4 (delta-like 4)] and anti-[*Homo sapiens* VEGFA (vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, VEGF)], dual-variable domain humanized monoclonal antibody, bispecific; dual-variable gamma1 heavy chain (1-577) [humanized VH anti-DLL4 (*Homo sapiens*IGHV3-48*01 (89.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.11] (1-118) -6-mer linker (119-124) -humanized VH anti-VEGFA (*Homo sapiens*IGHV3-23*03 or IGHV3-30*02 (76.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.16] (125-247) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (344) (248-345), hinge (346-360), CH2 L1.3>A (364), L1.2>A (365) (361-470), CH3 E12 (486), M14 (488) (471-575), CHS (576-577)) (248-577)], (350-334')-disulfide with dual-variable kappa light chain (1'-334') [humanized V-KAPPA anti-DLL4 (*Homo sapiens*IGKV1D-13*01 (88.3%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -13-mer linker (108-120) -humanized V-KAPPA anti-VEGFA (*Homo sapiens*IGKV1-16*01 (88.4%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (121-227) -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (273), V101 (311)(228'-334')]; dimer (356-356":359-359")-bisdisulfide

dilpacimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* DLL4 (delta-like 4)] et anti-[*Homo sapiens* VEGFA (facteur de croissance A de l'endothélium vasculaire, VEGF-A, VEGF)], anticorps monoclonal humanisé double-variable domaine, bispécifique; chaîne lourde gamma1 avec double-variable (1-577) [VH humanisé anti-DLL4 (*Homo sapiens*IGHV3-48*01 (89.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.11] (1-118) -6-mer linker (119-124) -VH humanisé anti-VEGFA (*Homo sapiens*IGHV3-23*03 ou IGHV3-30*02 (76.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.16] (125-247) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (344) (248-345), charnière (346-360), CH2 L1.3>A (364), L1.2>A (365) (361-470), CH3 E12 (486), M14 (488) (471-575), CHS (576-577)) (248-577)], (350-334')-disulfure à la chaîne légère kappa avec double-variable (1'-334') [V-KAPPA humanisé anti-DLL4 (*Homo sapiens*IGKV1D-13*01 (88.3%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -13-mer linker (108-120) -V-KAPPA humanisé anti-VEGFA (*Homo sapiens*IGKV1-16*01 (88.4%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (121-227) -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (273), V101 (311) (228'-334')]; dimère (356-356":359-359")-bisdisulfure

dilpacimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* DLL4 (delta-like 4)] y anti-[*Homo sapiens* VEGFA (factor de crecimiento A del endotelio vascular, VEGF-A, VEGF)], anticuerpo monoclonal humanizado doble-variable dominio, biespecifico; cadena pesada gamma1 con doble-variable (1-577) [VH humanizado anti-DLL4 (*Homo sapiens*IGHV3-48*01 (89.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.11] (1-118) -6-mer espaciador (119-124) -VH humanizado anti-VEGFA (*Homo sapiens* IGHV3-23*03 orIGHV3-30*02 (76.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.16] (125-247) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (344) (248-345), bisagra (346-360), CH2 L1.3>A (364), L1.2>A (365) (361-470), CH3 E12 (486), M14 (488) (471-575), CHS (576-577)) (248-577)], (350-334')-disulfuro con la cadena ligera kappa con doble-variable (1'-334') [V-KAPPA humanizado anti-DLL4 (*Homo sapiens*IGKV1D-13*01 (88.3%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -13-mer espaciador (108-120) -V-KAPPA humanizado anti-VEGFA (*Homo sapiens*IGKV1-16*01 (88.4%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (121-227) -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (273), V101 (311) (228'-334')]; dímero (356-356":359-359")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EVQLVESGGG	LVQPGGSLRL	SCAASGFTFS	NFPMWVRQA PGKLEWVAT 50
ISSSDGTTY	RDSVKGRFTI	SRDNAKNSLY	LQMNSLRAED TAVYYCARGY 100
YNSPFAYWGQ	GLTVLTVSSAS	TKGPEVQLVE	SGGGLVQPGG SLRLSCAASG 150
YFTFTNYGMN	VRQAPGKGLE	WVGWINTYTG	EPTYAADFKR RFTFSLDTSK 200
STAYLQMNSL	RAEDTAVYYC	AKYPHYVGS	HWYFDVWGQG TLTVVSSAST 250
KGPSVFPLAP	SSKSTSGGTA	ALGCLVKDYF	PEPVTVSWNS GALTSGVHTF 300
PAVLQSSGLY	SLSSVVTVPS	SSLGTQTYIC	NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC 350
DKHTHCPPCP	APEAAGGPSV	FLFPPKPKDT	LMISRTPEVT CVVVDVSHED 400
PEVKFNWYVD	GVEVHNAKTK	PREEQYNSTY	RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK 450
CKVSNKALPA	PIEKTISKAK	GQPREPQVYT	LPPSREEMTK NQVSLTCLVK 500
GFYPDSIAVE	WESNGQPENN	YKTTTPVLDS	DGSFFFLYSKL TVDKSRWQQG 550
NVFSQSVME	ALHNHYTQKS	LSLSPGK	577

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DIQMTQSPSS	LSASVGDRTV	ITCRASEDIY	SNLAWYQQKP GKAPKLLIYD 50
TNNLADGVPS	RFSGSGSGTD	FTLTISSLQP	EDFATYYCQQ YNNYPPTFGQ 100
GTKLEIKRTV	AAPSVFIFPP	DIQMTQSPSS	LSASVGDRTV ITCSAQDIS 150
NYLNNYQQKP	GKAPKVLITY	TSSLHSGVPS	RFSGSGSGTD FTLTISSLQP 200
EDFATYYCQ	YSTVPWTFQG	GTKVEIKRTV	AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA 250
SVVCLLNNFY	PREAKVQWKV	DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD STYSLSSLT 300
LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	LSSPVTKSFN	RGEC 334

Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	146-220	274-330 391-451 497-555
	22"-96"	146"-220"	274"-330" 391"-451" 497"-555"
Intra-L (C23-C104)	23"-88"	143"-208"	254"-314"
	23"-88"	143"-208"	254"-314"
Inter-H-L (h 5-CL 126)	350-334'	350"-334"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	356-356"	359-359"	

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
427, 427"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

dostarlimabum #
dostarlimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], humanized monoclonal antibody;

dostarlimab

gamma4 heavy chain (1-443) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV3-23*01 (93.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.9] (1-116) - *Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (117-214), hinge S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-9*01 (85.3%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (222-222':225-225'')-bisdisulfide

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], anticorps monoclonal humanisé;
chaîne lourde gamma4 (1-443) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV3-23*01 (93.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.9] (1-116) - *Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (117-214), charnière S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens*IGKV1-9*01 (85.3%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (222-222':225-225'')-bisdisulfure

dostarlimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], anticuerpo monoclonal humanizado;
cadena pesada gamma4 (1-443) [VH humanizado (*Homo sapiens*IGHV3-23*01 (93.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.9] (1-116) - *Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (117-214), bisagra S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens*IGKV1-9*01 (85.3%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (222-222':225-225'')-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLLESGGG LVQPQGSRLRL SCAASGFTFS SYDMSWVRQA PGKLEWVST 50
ISGGGSITYTY QDSVKGRTFI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCASPY 100
YAMDIWGQGT TVTVSSASTK GSFVFFLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYPF 150
EPVTYSWNSG ALTSQVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGRTKTYTCN 200
VDHKPSNTKV DKRVESKYG PCCPCPAPEF LGGPSVFLFF PKFKDTLMIS 250
RTPVETCVVV DVSQEDFEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPRBE QFNSTYRVVS 300
VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVITLPPS 350
QEEMTKNQVS LTCLVKGFPY SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVILSDGSF 400
FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSMVHEALHN HYTKSLSLSL LGR 443
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
DIQLTQSPSF LSAIVGDRVT ITCKASQDVG TAVAWYQQKPK GKAPKLLIYW 50
ASTLHTGVPS RFGSGSGSTE FTLTISLQPE EDFATYYCQH YSSYPWTFQG 100
GKLEIKRTV AAPSVFIFFP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQMKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGECC 214
```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22°-96° 143°-199° 257°-317° 363°-421°
22°-96° 143°-199° 257°-317° 363°-421°

Intra-L (C23-C104) 23°-88° 134°-194°
23°-88° 134°-194°

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 130-214° 130°-214°
Inter-H-H (h 8, h 11) 222-222° 225-225°

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

HCH2 N84.4:

293, 293°

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires

complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping:

HCHS K2:

443, 443°

durlobactamum


durlobactam

(1*R*,2*S*,5*R*)-2-carbamoyl-3-methyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-en-6-yl hydrogen sulfate

durlobactam

hydrogénosulfate de (1*R*,2*S*,5*R*)-2-carbamoyl-3-méthyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-én-6-yle

durlobactam

hidrogenosulfato de (1*R*,2*S*,5*R*)-2-carbamoil-3-metil-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-en-6-ileC₈H₁₁N₃O₆S**eftozanerminum alfa #**

eftozanermin alfa

Gln¹-human single-chain tumor necrosis factor ligand superfamily member 10 (TNFSF10, tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand, TRAIL) receptor binding domain fragment, repeat of three identical chains (2-161, 171-330, 340-499) fused together via glycosylated linkers (162-170 connecting chain I to chain II and 331-339 connecting chain II to chain III), fused via linker (500-511) to an Fc fragment of human immunoglobulin G1 (512-740) [*Homo sapiens*IGHG1*03 (CH2 (524-633 (Asn⁵⁹⁰>Ser)), CH3 (634-738),CHS (739-740))], dimer, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa

eftozanermine alfa

Gln¹-chaîne unique du membre 10 de la superfamille des ligands du facteur de nécrose tumorale humaine (TNFSF10, ligand inducteur d'apoptose apparenté au TNF, TRAIL) fragment du domaine se liant au récepteur, répétition de trois chaînes identiques, (2-161, 171-330, 340-499) fusionnées via des linkers glycosylés (162-170 liant la chaîne I à la chaîne II et 331-339 liant la chaîne II à la chaîne III), fusionné via un linker (500-511) au fragment Fc de l'immunoglobuline G1 humaine (512-740) [*Homo sapiens*IGHG1*03 (CH2 (524-633 (Asn⁵⁹⁰>Ser)), CH3 (634-738),CHS (739-740))], dimère, produit par des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa

eftozanermina alfa

Gln¹-cadena única del miembro 10 de la superfamilia de los ligandos del factor de necrosis tumoral humano (TNFSF10, ligando inductor de la apoptosis relacionado con el TNF, TRAIL) fragmento del dominio que se une al receptor, repetición de tres cadenas idénticas, (2-161, 171-330, 340-499) fusionadas mediante los conectores glicosilados (162-170 que une la cadena I a la cadena II y 331-339 que une la cadena II a la cadena III), fusionado mediante un enlace (500-511) al fragmento Fc de la inmunoglobulina G1 humana (512-740) [*Homo sapiens*IGHG1*03 (CH2 (524-633 (Asn⁵⁹⁰>Ser)), CH3 (634-738),CHS (739-740))], dímero, producido en las células ováricas de hamster chinos (CHO), glicoforma alfa

Monomer / monomère / monómero			
QRVAAHITGT	RGRSNTLSSP	NSKNEKALGR	KINSWESSRS
50	GHSFLSNLHL		
RNGELVIEHK	GFYIYSQTY	FRFQEEIKEN	TKNDKQMVQY
100	IYKYTSYPDP		
ILLMKSARN	CWSKDAEYGL	YSIYQGIGFE	LKENDRIFVS
150	VTNEHLIDMD		
HEASFFGAFL	VGGSGSGNGS	RVAAHITGTR	GRSNTLSSPN
200	SKNEKALGRK		
INSWESSRSG	HSFLSNLHLR	NGELVIEHKG	FYIYSQTYF
250	RFQEEIKENT		
KNDKQMVQYI	YKYTSYPDPI	LLMKSARNSC	WSKDAEYGLY
300	SIYQGIGIFEL		
KENDRIFVS	TNEHLIDMDH	EASFFGAFLV	GGSGSGNGSR
350	VAAHITGTRG		
RSNTLSSPNS	KNEKALGRKI	NSWESSRSGH	SFLSNLHLRN
400	GELVIEHKEGF		
YYIYSQTYFR	FQEEIKENTK	NDKQMVQYIY	KYTSYPDPIL
450	LMKSARNSCW		
SKDAEYGLYS	IYQGIGIFELK	ENDRIFVSVT	NEHLIDMDHE
500	ASFFGAFLVG		
CPGSSSSSSS	GSCDKTHTCP	PCPAPELLGG	PSVFLFPKP
550	KDTLMISRT		
EVTCTVVVDVS	HEDPEVKFNW	YVDGVEVHNA	KTKPREEQYS
600	STYRVVSVLT		
VLHQDWLNGK	EYKCKVSNKA	LPAPIEKTIS	KARGQPREPQ
650	VYTLPPSREE		
MTKNQVSLTC	LVKGFYPSDI	AVEWESNGQP	ENNYKTPPV
700	LDSDGSSFFLY		
SKLTVDKSRW	QQGNVFSCSV	MHEALHNHYT	QKSLSLSPGK
740			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-chain	111-280	554-614	660-718
	111-280'	554'-614'	660'-718'
Inter-chain	513-513'	519-519'	522-522'
Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N)			
Asn-168	Asn-337		

eladocagenum exuparvovecum #
eladocagene exuparvovec

a recombinant non-replicating adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) vector comprising a dopa decarboxylase (DDC, AADC) variant 2 cDNA transcript, which encodes human aromatic-L-amino-acid decarboxylase isoform 1, under the control of the cytomegalovirus (CMV) intermediate-early (IE) promoter and SV40 poly A transcription terminator.

éladocagène exuparvovec

vecteur viral adéno-associé de sérotype 2 (AAV2) non-répliquant recombinant contenant une transcription ADNc du variant 2 de la dopa décarboxylase (DDC, AADC) codant pour l'isoforme 1 de l'acide L-aminé aromatique décarboxylase humaine, sous le contrôle d'un promoteur intermédiaire précoce de cytomegalovirus (CMV) et une séquence poly-A de SV40 de terminaison de la transcription

eladocagén exuparvovec

Un vector de virus adenoasociado recombinante no replicativo de serotipo 2 (AAV2) que consta de un transcrito cDNA de la variante 2 de la dopa descarboxilasa, que codifica para la isoforma 1 de la L-aminoácido aromático descarboxilasa humana, bajo el control del promotor intermedio temprano del citomegalovirus y un terminador de la transcripción poli A de SV40.

elopultidum
elopultide

L-isoleucyl-L-prolyl-L-seryl-L-seryl-L-prolyl-L-valyl-L-histidyl-L-leucyl-L-lysyl-L-arginyl-L-leucyl-L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-leucylglycyl-L-alanyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucylglycyl-L-leucine

élopultide

L-isoleucyl-L-prolyl-L-séryl-L-séryl-L-prolyl-L-valyl-L-histidyl-L-leucyl-L-lysyl-L-arginyl-L-leucyl-L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-leucylglycyl-L-alanyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucylglycyl-L-leucine

elopultida

L-isoleucil-L-prolil-L-seril-L-seril-L-prolil-L-valil-L-histidil-L-leucil-L-lisil-L-arginil-L-leucil-L-lisil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-isoleucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-isoleucil-L-leucilglycyl-L-alanil-L-leucil-L-leucil-L-leucilglycil-L-leucina

$C_{178}H_{320}N_{40}O_{36}$

IPSSPVLKLR LKLLLLLLLLL ILLILGALL LGL

33

eluforsenum

eluforsen

alt-P-ambo-[1-33]tritiaconta-2'-*O*-methyl-[1-32]dotriaconta-*P*-thio-AUCAUAGGAA ACACCAAAGA UGAUAAAAUUU UUU;
alt-P-ambo-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyluridine

éluforsen

tout-P-ambo-[1-33]tritiaconta-2'-*O*-méthyl-[1-32]dotriaconta-*P*-thio-AUCAUAGGAA ACACCAAAGA UGAUAAAAUUU UUU;
tout-P-ambo-2'-*O*-méthyl-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thioguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thioguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyluridine

ensifentrinum

ensifentrine


N-(2-[(2*E*)-9,10-dimethoxy-4-oxo-2-[(2,4,6-trimethylphenyl)imino]-6,7-dihydro-2*H*-pyrimido[6,1-*a*]isoquinolin-3(4*H*)-yl]ethyl)urea

ensifentrine

N-(2-[(2*E*)-9,10-diméthoxy-4-oxo-2-[(2,4,6-triméthylphényl)imino]-6,7-dihydro-2*H*-pyrimido[6,1-*a*]isoquinoléin-3(4*H*)-yl]éthyl)urée

ensifentrina

N-(2-[(2*E*)-9,10-dimetoxi-4-oxo-2-[(2,4,6-trimetilfenil)imino]-6,7-dihidro-2*H*-pirimido[6,1-*a*]isoquinolein-3(4*H*)-il]etil)urea

C₂₆H₃₁N₅O₄**exicorilantum**

exicorilant


[(4*aR*,8*aS*)-1-(4-fluorophenyl)-6-(2-methyl-2*H*-1,2,3-triazole-4-sulfonyl)-1,4,5,6,7,8,8*a*,9-octahydro-4*aH*-pyrazolo[3,4-*g*]isoquinolin-4*a*-yl][4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methanone

exicorilant

[(4*aR*,8*aS*)-1-(4-fluorophényl)-6-(2-méthyl-2*H*-1,2,3-triazole-4-sulfonyl)-1,4,5,6,7,8,8*a*,9-octahydro-4*aH*-pyrazolo[3,4-*g*]isoquinoléin-4*a*-yl][4-(trifluorométhyl)pyridin-2-yl]méthanone

exicorilant

[(4*aR*,8*aS*)-1-(4-fluorofenil)-6-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-sulfonyl)-1,4,5,6,7,8,8*a*,9-octahidro-4*aH*-pirazolo[3,4-*g*]isoquinolein-4*a*-il][4-(trifluorometil)piridin-2-il]metanona

C₂₆H₂₃F₄N₇O₃S

fosgemcitabinum palabenamidum


fosgemcitabine palabenamide

benzyl *N*-[(*P*^β*S*)-2'-deoxy-2',2'-difluoro-*O*^β-phenyl-5'-cytidyl]-L-alaninate

fosgemcitabine palabénamide

N-[(*P*^β*S*)-2'-désoxy-2',2'-difluoro-*O*^β-phényl-5'-cytidyl]-L-alaninate de benzyle

fosgemcitabina palabenamida

N-[(*P*^β*S*)-2'-desoxi-2',2'-difluoro-*O*^β-fenil-5'-citidilil]-L-alaninato de benciloC₂₅H₂₇F₂N₄O₈P**fosifloxuridinum nafalbenamidum**


fosifloxuridine nafalbenamide

benzyl *N*-[*P*-ambo-2'-deoxy-5-fluoro-*O*^β-(naphthalen-1-yl)-5'-uridy]-L-alaninate

fosifloxuridine nafalbénamide

N-[*P*-ambo-2'-désoxy-5-fluoro-*O*^β-(naphtalén-1-yl)-5'-uridy]-L-alaninate de benzyle

fosifloxuridina nafalbenamida

N-[*P*-ambo-2'-desoxi-5-fluoro-*O*^β-(naftalen-1-il)-5'-uridilil]-L-alaninato de benciloC₂₉H₂₉FN₃O₉P**foslinanibum**

foslinanib



2-(3-fluorophenyl)-6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-5-yl dihydrogen phosphate

foslinanib

dihydrogénophosphate de 2-(3-fluorophényl)-6-méthoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoléin-5-yle

foslinanib

dihidrogenofosfato de 2-(3-fluorofenil)-6-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolein-5-ilo



fosmanogepixum
fosmanogepix



[1²-amino-6-oxa-1(3),7(2)-dipyridina-2(5,3)-
[1,2]oxazola-4(1,4)-benzenaheptaphan-1¹-ium-1¹-
yl]methyl hydrogen phosphate

fosmanogépix

hydrogénophosphate de [1²-amino-6-oxa-1(3),7(2)-
dipyridina-2(5,3)-[1,2]oxazola-4(1,4)-
benzénaheptaphan-1¹-ium-1¹-yl]méthyle

fosmanogepix

hidrogenofosfato de [1²-amino-6-oxa-1(3),7(2)-
dipiridina-2(5,3)-[1,2]oxazola-4(1,4)-bencenaheptafan-
1¹-ium-1¹-il]metilo



frovocimabum #
frovocimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PCSK9
(proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, neural
apoptosis-regulated convertase 1, NARC1, NARC-1,
proprotein convertase 9, PC9) catalytic domain],
humanized monoclonal antibody;
gamma4 heavy chain (1-451) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV3-21*01 (88.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (100%))
[8.8.18] (1-125) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (126-
223), hinge S10>P (233) (224-235), CH2 F1.3>A (239),
L1.2>A (240) (236-345), CH3 (346-450), CHS K2>del
(451)) (126-451)], (139-219')-disulfide with kappa light
chain (1'-219') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens*
IGKV2-28*01 (87.00%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-
112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101
(196) (113'-219')]; dimer (231-231":234-234")-bisdisulfide

frovocimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PCSK9
(proprotéine convertase subtilisine/kexine type 9,
convertase 1 régulée par l'apoptose neuronale, NARC1,
NARC-1, proprotéine convertase 9, PC9)], anticorps
monoclonal humanisé;

chaîne lourde gamma4 (1-451) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV3-21*01 (88.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (100%)) [8.8.18] (1-125) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (126-223), charnière S10>P (233) (224-235), CH2 F1.3>A (239), L1.2>A (240) (236-345), CH3 (346-450), CHS K2>del (451)) (126-451)], (139-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens*IGKV2-28*01 (87.00%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (231-231":234-234")-bisdisulfure

frovocimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PCSK9 (proteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9, convertasa 1 regulada por la apoptosa neuronal, NARC1, NARC-1, proteína convertasa 9, PC9)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma4 (1-451) [VH humanizado (*Homo sapiens*IGHV3-21*01 (88.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (100%)) [8.8.18] (1-125) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (126-223), bisagra S10>P (233) (224-235), CH2 F1.3>A (239), L1.2>A (240) (236-345), CH3 (346-450), CHS K2>del (451)) (126-451)], (139-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens*IGKV2-28*01 (87.00%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (231-231":234-234")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada					
EVQLVESGGG	LVPKPGGSLRL	SCAASGFPFES	KLGMVWVRQA	PGKGLEWVST	50
ISSGGGYTYY	PDSVKGGRFTI	SRDNAKNSLY	LQMSNLAERAD	TAVYYCAREG	100
ISFQGGTYTY	VMDYWGQGTLL	VTSSASTKG	PWFVFLPAPCS	RTSSESTAAE	150
GCLVKDYFPE	PVTYSWNSGA	LTSGVHTFPA	VLQSSGLYSYL	SSVVTVPSSS	200
LGKTYTTCNV	DHKPSNTKVD	KRVESKYGPP	CNPYCPAPEAA	GGPSVFLFPF	250
KPKDTLMISR	TPEVTCVVVD	VSQEDPEVQF	WVVDGVGEVH	NAKTKPREEQ	300
FNSTYRVVSV	LTVLHQDWLN	GKEYKCKVSN	KGLPSSIEKT	ISAKAGQPRE	350
PQVYTLPPSQ	EEMTKNQVSL	TCLVKGFYPS	DIAEVWESNG	QPENNYTKT	400
PVLDSGGSFF	LYSRLTVDKS	RWQEGNVFSC	SVMHEALHNH	YTQKSLSLSL	450
G					451
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera					
DIVMTQSPSL	LPVTPGEPAS	ISCRSSKSL	HRNGITYSYW	YLQKPGSPQP	50
LLIYQLSNLA	SGVPDRFSGS	SGSDFTLTKI	SRVEAEDVG	YYCYQNLLEP	100
LTFGGGTQKVE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVVL	LNNFYPREAK	150
VQMKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKDYSTSL	SSTLTLSKAD	YEKHVVYACE	200
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC				219
Post-translational modifications					
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro					
Intra-H (C23-C104)	22-96	152-208	266-326	372-430	
	22"-96"	152"-208"	266"-326"	372"-430"	
Intra-L (C23-C104)	23'-93'	139'-199'			
	23'''-93'''	139'''-199'''			
Inter-H-L (CH1 10-CL 126)	139-219'	139"-219"			
Inter-H-H (h 8, h 11)	231-231"	234-234"			
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación					
H CH2 N84.4: 302, 302"					
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados					

futibatinibum
futibatinib



1-[(3*S*)-3-{4-amino-3-[(3,5-dimethoxyphenyl)ethynyl]-1*H*-pyrazolo[3,4-*d*]pyrimidin-1-yl}pyrrolidin-1-yl]prop-2-en-1-one

futibatinib

1-[(3*S*)-3-{4-amino-3-[(3,5-diméthoxyphényl)éthynyl]-1*H*-pyrazolo[3,4-*d*]pyrimidin-1-yl}pyrrolidin-1-yl]prop-2-én-1-one

futibatinib

1-[(3*S*)-3-{4-amino-3-[(3,5-dimetoxifenil)etinil]-1*H*-pirazolo[3,4-*d*]pirimidin-1-il}pirrolidin-1-il]prop-2-en-1-ona



galicaftorum
galicaftor



4-[(2*R*,4*R*)-4-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-1-carboxamido]-7-(difluoromethoxy)-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-2-yl]benzoic acid

galicaftor

acide 4-[(2*R*,4*R*)-4-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-1-carboxamido]-7-(difluorométhoxy)-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-2-yl]benzoïque

galicaftor

ácido 4-[(2*R*,4*R*)-4-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropano-1-carboxamido]-7-(difluorometoxi)-3,4-dihidro-2*H*-1-benzopiran-2-il]benzoico



gancotamabum #
gancotamab

immunoglobulin scFv, anti-[*Homo sapiens* ERBB2 (epidermal growth factor receptor 2, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], *Homo sapiens* monoclonal antibody single chain; scFv (1-251) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*04 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.12] (1-119) -15-mer tris(tetraglycyl-seryl) linker (120-134) -*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-40*01(97.0%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.3.11] (135-245) -6-mer bisglycyl-seryl-bisglycyl-cysteiny] (246-251)]

gancotamab

immunoglobuline scFv, anti-[*Homo sapiens* ERBB2 (récepteur 2 du facteur de croissance épidermique, récepteur tyrosine-protéine kinase erbB-2, EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal à chaîne unique; scFv (1-251) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*04 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.12] (1-119) -15-mer tris(tétraglycyl-séryl) linker (120-134) -*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-40*01(97.0%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.3.11] (135-245) -6-mer bisglycyl-séryl-bisglycyl-cystéinyl (246-251)]

gancotamab

immunoglobulina scFv, anti-[*Homo sapiens* ERBB2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico, receptor tirosina-proteína kinasa erbB-2, EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal con cadena única; scFv (1-251) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*04 (94.9%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.12] (1-119) -15-mer tris(tetraglicil-seril) conector (120-134) -*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-40*01(97.0%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.3.11] (135-245) -6-mer bisglicil-seril-bisglicil-cisteinil (246-251)]

QVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFR SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA 50
ISGRGDNITYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVIYCAKMT 100
SNAFAPDYWG QGTLVTVSSG GGGSGGGGSG GGSQSVLTQ PPSVSGAPGQ 150
RVTISCTGSS SNIGAGYGVH WYQQLPGTAP KLLIYGNTNR PSGVPDRFSG 200
FKSGTSASLA ITGLQAEDEA DYQCQSYDSS LSGWVFGGGT KLTVLGGSGG 250
C 251

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-scFv (C23-C104) 22-96 156-224

golexanolonum
golexanolone

(17*E*)-3α-ethynyl-17-(hydroxyimino)-5α-androstan-3β-ol


golexanolone

(17*E*)-3α-éthynyl-17-(hydroxyimino)-5α-androstan-3β-ol

golexanolona

(17*E*)-3α-etinil-17-(hidroxiimino)-5α-androstan-3β-ol

C₂₁H₃₁NO₂



gosuranemabum #
gosuranemab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* MAPT (microtubule-associated protein tau, tau)], monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-443)[VH (*Mus musculus* IGHV5-6*01 (85.6%)/*Homo sapiens* IGHV3-11*01 (84.5%) - (IGHD) -*Homo sapiens* IGHJ6*01 (92.9%)) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (118-215), hinge S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS K2>del (443)) (118-443)], (131-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens* IGKV2-30*02 (84.0%) - *Homo sapiens* IGKJ4*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (223-223'':226-226'')-bisdisulfide

gosuranémab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* MAPT (protéine tau associée aux microtubules, tau)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma4 (1-443) [VH (*Mus musculus*IGHV5-6*01 (85.6%)/*Homo sapiens*IGHV3-11*01 (84.5%)-(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ6*01 (92.9%)) [8.8.10] (1-117)-*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (118-215), charnière S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS K2>del (443)) (118-443)], (131-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-30*02 (84.0%)-*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112')-*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (223-223":226-226")-bisdisulfure

gosuranemab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* MAPT (proteína tau asociada con microtúbulos, tau)], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma4 (1-443) [VH (*Mus musculus*IGHV5-6*01 (85.6%)/*Homo sapiens*IGHV3-11*01 (84.5%)-(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ6*01 (92.9%)) [8.8.10] (1-117)-*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (118-215), bisagra S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS K2>del (443)) (118-443)], (131-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-30*02 (84.0%)-*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112')-*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (223-223":226-226")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVHVESGGA	LVKPGGSLRL	SCAASGFSFS	KYGMWVRQA	PGKGLEWVAT	50
ISSSGSRITY	PDSVKGFRFTI	SRDNAKNTLY	LQMNSLRAD	TAMYYSISW	100
DGAMDYWGQG	TTVTVSAST	KGPSVFPLAP	CSRSTSESTA	ALGCLVKDYF	150
PEPVTVSWSN	GALTSGVHTF	PAVLQSSGLY	SLSSVTVTPS	SSLGKTITYC	200
NVDHKPSNTK	VDKRVSKEYG	PPCPGPCAPE	FLGGPSVFLF	PPKPKDTLMI	250
SRTPEVTQCV	VDVSQEDPEV	QFNWYVDGVE	VHNAKTKPRE	EQFNSTYRVV	300
SVLTVLHQDW	LNGKEYKCKV	SNKGLPSSIE	KTISKAKGQP	REPQVYTLPP	350
SQEEMTKNQV	SLTCLVKGFY	PSDIAVEWES	NGQPENNYKT	TPPVLDSDGS	400
FFLYSRLTVD	KSRWQEGNVF	SCSVMHEALH	NHYTQKLSLS	SLG	443

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DVVMTQSPSL	LPVTLGQPAS	ISCKSSQSI	HSNGNTYLEW	YLQKPGQSPQ	50
LLVYKVSNR	SGVPDRFSGS	GSGETFTLKI	SRVEAEDVGT	YYCFQGSLLP	100
WAFGGGKTKE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVVL	LNNFYPREAK	150
VQWKKVDNAL	QSGNSQESVTE	QDSKSTYSL	SSTLTLSKAD	YEKHKVYACE	200
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC				219

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22-96	144-200	258-318	364-422
	22"-96"	144"-200"	258"-318"	364"-422"
Intra-L (C23-C104)	23'-93'	139'-199'		
	23'''-93'''	139'''-199'''		

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 131-219' 131"-219"

Inter-H-H (h 8, h 11) 223-223" 226-226"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

294, 294"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados

hydromethylthionium


hydromethylthionine

*N*³,*N*³,*N*⁷,*N*⁷-tetramethyl-10*H*-phenothiazine-3,7-diamine

hydrométhylthionine

*N*³,*N*³,*N*⁷,*N*⁷-tétraméthyl-10*H*-phénothiazine-3,7-diamine

hidrometilitionina

*N*³,*N*³,*N*⁷,*N*⁷-tetrametil-10*H*-fenotiazina-3,7-diaminaC₁₆H₁₉N₃S**iadademstatum**


iadademstat

trans-N'-[(1*R*,2*S*)-2-phenylcyclopropyl]cyclohexane-1,4-diamine

iadademstat

trans-N'-[(1*R*,2*S*)-2-phénylcyclopropyl]cyclohexane-1,4-diamine

iadademstat

trans-N'-[(1*R*,2*S*)-2-fenilciclopil]ciclohexano-1,4-diaminaC₁₅H₂₂N₂**idecabtagenum vicleucelum #**

idecabtagene vicleucel

human culture expanded genetically modified autologous T cells for cell-based gene therapy. Cells are derived from isolated blood of the patient and are transduced with non-replicative self-inactivating (SIN) human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) based lentiviral vector (LVV) pseudotyped with the vesicular stomatitis virus glycoprotein G (VSV-G) envelope protein, and encoding the C11D5.3 anti-TNF receptor superfamily member 17 (TNFRSF17, BCMA) single chain variable fragment (scFv) CD8/4-1BB/CD3zeta chimeric antigen receptor (CAR) under the transcriptional control of the myeloproliferative sarcoma virus enhancer, negative control region deleted, dl587rev primer-binding site substituted (MND) promoter. Cells exhibit anti-tumoral activity in patients with multiple myeloma.

idécabtagène vicleucel

lymphocytes T humains, autologues, génétiquement modifiés, en culture d'expansion pour thérapie génique avec cellules. Les cellules sont dérivées du sang prélevé chez le patient et sont transduites avec un vecteur lentiviral basé sur le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) non-répliquant auto-inactif, pseudotypé avec la

glycoprotéine G de l'enveloppe de du virus de la stomatite vésiculaire (VSV-G) et codant pour le récepteur de l'antigène chimérique (CAR) consistant en un fragment variable de la chaîne unique de l'anticorps CD11D5.3 anti-membre 17 de la superfamille des récepteurs du TNF (TNFRSF17, BCMA)/CD8/4-1BB/CD3zêta sous le contrôle transcriptionnel d'un promoteur du virus du sarcome myéloprolifératif dont la région de contrôle négatif a été supprimée, et le site de liaison de l'amorce substitué par dl587rev (MND). Les cellules montrent une activité anti-tumorale chez de patients atteints de multiples myélomes.

idecabtagén vicleucel

Linfocitos T autólogos, modificados genéticamente, humanos, expandidos en cultivo para terapia génica con células. Las células se derivan de sangre aislada del paciente y se transducen con un vector lentiviral basado en el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (HIV-1) no replicativo y autoinactivante, pseudotipado con la glicoproteína G de la envuelta del virus de la estomatitis vesicular (VSV-G), y que codifica para el receptor de antígeno quimérico (CAR) consistente en un fragmento variable de cadena sencilla (scFv) del anticuerpo CD11D5.3 anti-miembro 17 de la superfamilia de receptores de TNF (TNFRSF17, BCMA)/CD8/4-1BB/CD3zeta bajo el control transcripcional del enhancer del virus del sarcoma mieloproliferativo, y el promotor con la región de control negativo delecionada y el sitio de unión del cebador dl587rev sustituido (MND). Las células poseen actividad antitumoral en pacientes con mieloma múltiple.

ilginatinibum

ilginatinib

N^2 -[(1*S*)-1-(4-fluorophenyl)ethyl]-4-(1-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl)- N^6 -(pyrazin-2-yl)pyridine-2,6-diamine


ilginatinib

N^2 -[(1*S*)-1-(4-fluorophényl)éthyl]-4-(1-méthyl-1*H*-pyrazol-4-yl)- N^6 -(pyrazin-2-yl)pyridine-2,6-diamine

ilginatinib

N^2 -[(1*S*)-1-(4-fluorofenil)etil]-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)- N^6 -(pirazin-2-il)piridina-2,6-diamina

$C_{21}H_{20}FN_7$



iodinum (¹³¹I) apamistamabum #iodine (¹³¹I) apamistamab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PTPRC (protein tyrosine phosphatase receptor type C, GP180, LCA, T200, CD45)], *Mus musculus* monoclonal antibody, conjugated on six tyrosyl, to iodine (¹³¹I);

gamma1 heavy chain (1-444) [*Mus musculus* VH (IGHV4-1*02 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (199) (122-218), hinge (219-231), CH2 K81>Q (288), I84.3>F (294) (232-338), CH3 N27>D (369) (339-443), CHS (444-445)) (122-445)], (223-218')-disulfide with kappa light chain (1'-218') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV3-12*01 (98.0%) -IGKJ4*01 (100%)) [10.3.9] (1'-111') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (112'-218')]; dimer (225-225":228-228":230-230")-trisulfide; conjugated on 6 tyrosyl (2 per H chain and 1 per L chain), to iodine (¹³¹I)

iodine (¹³¹I) apamistamab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PTPRC (protéine tyrosine phosphatase de type récepteur C, GP180, LCA, T200, CD45)], *Mus musculus* anticorps monoclonal, conjugué sur 6 tyrosyl, à l'iode (¹³¹I);

chaîne lourde gamma1 (1-444) [*Mus musculus* VH (IGHV4-1*02 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (199) (122-218), charnière (219-231), CH2 K81>Q (288), I84.3>F (294) (232-338), CH3 N27>D (369) (339-443), CHS (444-445)) (122-445)], (223-218')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-218') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV3-12*01 (98.0%) -IGKJ4*01 (100%)) [10.3.9] (1'-111') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (112'-218')]; dimère (225-225":228-228":230-230")-trisulfure; conjugué sur 6 tyrosyl (2 par chaîne H et 1 par chaîne L) à l'iode (¹³¹I)

iodo (¹³¹I) apamistamab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PTPRC (proteína tirosina fosfatasa de tipo receptor C, GP180, LCA, T200, CD45)], *Mus musculus* anticuerpo monoclonal, conjugado con 6 restos tirosil, al iodo (¹³¹I);

cadena pesada gamma1 (1-444) [*Mus musculus* VH (IGHV4-1*02 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (199) (122-218), bisagra (219-231), CH2 K81>Q (288), I84.3>F (294) (232-338), CH3 N27>D (369) (339-443), CHS (444-445)) (122-445)], (223-218')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-218') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV3-12*01 (98.0%) -IGKJ4*01 (100%)) [10.3.9] (1'-111') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (112'-218')]; dímero (225-225":228-228":230-230")-trisulfuro; conjugado con 6 restos tirosil (2 por cadena H y 1 por cadena L) al iodo (¹³¹I)


Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
EVKLLSEGGG LVQPGGSLKL SCAASGFDFS RYWMSVVRQA PGKGLEWIGE 50
INPTSSSTINF TFSLKDKVPT SRDNAKNTLY LQMSKVRSED TALYYCARGN 100
YRYGDDAMDY WGGQTSVTVS SAKTTPPSVY PLAFGSAAQT NSMVTLGCLV 150
RGYFPEFVTV TWNSGSLSSG VHTFFAVLQS DLYTLSSSVT VFSSTWFSST 200
VTCNVAHPAS STKVDRKIIV RDCGCKKRIC TYPEVSSVFI FPFKPKDVL 250
ITLTPKVTCTV VVDISKDDIV VQSWFVDDV EYHTAQTFQR EEQPNSTFAS 300
VSELPIMHQD WLNKREFFCR VNSAAFPAPI EKTISKTKGR KPAQVYTIIP 350
PPEQMAKDK VSLTCMITDF FPEDITVEWQ WNGQPAENYK NTQPIMDTG 400
SYFVYSKLVN QKSNWEAGNT FTCSVLHEGL HNHTEKSLS HSPGK 445

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIALTQSPAS LAVSLGQRAT TSCRASKSVS TSGYSYLHWY QQKPGQPPKL 50
LIYLASNLES GVPARESSSG SGTDFTLNIH PVEEEDAATY YCQHSRELPP 100
TFSGSGTKLEI KRADAAPTVS IFPPSSBQLT SGASVVCFL NNFYPKDINW 150
KWKIDGSEKQ NGVLNSWTDQ DSKDSTYSMS STLTLTKDEY ERHNSYTCEA 200
THKTSTSPIV KSFNRNEC 218

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22°-96" 148°-203" 259°-319" 365°-423"
22°-96" 148°-203" 259°-319" 365°-423"
Intra-L (C23-C104) 23°-92" 138°-198"
23°-92" 138°-198"
Inter-H-L (h 5-C126) 223°-218" 223°-218"
Inter-H-H (h7, h 10, h 12) 225°-225" 228°-228" 230°-230"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
295, 295"
Mus musculus hybridoma-type glycans / glycanes de type hybridome de *Mus musculus* /
glicanos de tipo hibridoma de *Mus musculus*

Iodination sites / Sites d'iodation / Posiciones de yodación
radiolabeled 3-[¹²⁵I]iodotyrosine
H VH Y109, Y110: 101 or 102, 101" or 102"
H CH3 Y85.2, Y86: 402 or 405, 402" or 405"
L V-KAPPA Y36, Y38, Y42: 334' or 36' or 40',
34" or 36" or 40"



lenzumestrocelum
lenzumestrocel

human culture expanded autologous mesenchymal stromal cells for cell-based therapy. Cells are derived from isolated bone marrow of the patient. Cells express surface markers CD29, CD44, CD73, CD105 and CD49 and are intended to mediate immunomodulatory and neuroprotective effects

lenzumestrocel

cellules mésenchymales stromales humaines, autologues, expansées pour thérapie cellulaire. Les cellules sont dérivées de la moelle osseuse du patient. Les cellules expriment les marqueurs de surface CD29, CD44, CD73, CD105 et CD49, et sont destinées à avoir des effets immunomodulateurs et neuroprotecteurs.

lenzumestrocel

células mesenquimales estromales, autólogas, humanas, expandidas en cultivo para terapia celular. Las células derivan de médula ósea aislada del paciente. Las células expresan los marcadores de superficie CD29, CD44, CD73, CD105 y CD49, y se pretende que medien en efectos inmunomoduladores y neuroprotectores.

leriglitazonum
leriglitazone



rac-(5*R*)-5-[[4-(2-{5-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]pyridin-2-yl}ethoxy)phenyl)methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione

lériglitazone

rac-(5*R*)-5-[[4-(2-{5-[(1*R*)-1-hydroxyéthyl]pyridin-2-yl}éthoxy)phényl]méthyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione

leriglitazona

rac-(5*R*)-5-[[4-(2-{5-[(1*R*)-1-hidroxietyl]piridin-2-il}etoxi)fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona

**linrodostat**


linrodostat

(2*R*)-*N*-(4-chlorophenyl)-2-[*cis*-4-(6-fluoroquinolin-4-yl)cyclohexyl]propenamide

linrodostat

(2*R*)-*N*-(4-chlorophényl)-2-[*cis*-4-(6-fluoroquinoléin-4-yl)cyclohexyl]propénamide

linrodostat

(2*R*)-*N*-(4-clorofenil)-2-[*cis*-4-(6-fluoroquinolein-4-il)ciclohexil]propanamida**lisocabtagenum maraleucelum #**

lisocabtagene maraleucel

human culture expanded genetically modified autologous T cells for cell-based gene therapy. CD4+ CD8+ T Cells are derived from isolated blood of the patient and are transduced with non-replicative self-inactivating (SIM) lentiviral vector encoding an FMC63 anti-CD19 single chain variable fragment (scFv) IgG4 hinge region/CD28/CD137 (4-1BB)/CD3zeta chimeric antigen receptor (CAR) and a truncated form of the human epidermal growth factor receptor (EGFRt) under the control of the elongation factor 1-alpha (EF1-alpha)/R region from the human T cell leukaemia virus 1 (HTLV-1 R) composite promoter. Cells exhibit anti-tumoral activity in patients with CD19-expressing B cell malignancies.

lisocabtagène maraleucel

lymphocytes T humains autologues en culture d'expansion et génétiquement modifiés pour thérapie génique avec cellules. Les lymphocytes T CD4+ et CD8+ sont dérivés du sang prélevé chez le patient et sont transduits avec un vecteur lentiviral non-répliquant et auto-inactif codant pour un récepteur de l'antigène chimérique (CAR) consistant en un fragment variable de la chaîne unique (scFv) de l'anticorps FMC63 anti-CD-19, une région charnière de IgG4/CD28/CD137 (4-1BB)/CD3zêta et une forme tronquée du récepteur du facteur de croissance épidermique humain (EGFRt) sous le contrôle d'un promoteur composé du facteur d'élongation 1-alpha (EF1-alfa)/région R du virus T-lymphotrope humain (HTLV-1 R). Les cellules montrent une activité anti-tumorale chez les patients atteints de tumeurs malignes des lymphocytes B exprimant le CD-19.

lisocabtagén maraleucel

Linfocitos T autólogos, modificados genéticamente, humanos, expandidos en cultivo para terapia génica con células. Los linfocitos T CD4+ y CD8+ se derivan de sangre aislada del paciente y se transducen con un vector lentiviral no replicativo y autoinactivante que codifica para un receptor de antígeno quimérico (CAR) consistente en un fragmento variable de cadena sencilla (scFv) del anticuerpo FMC63 anti-CD19, una región bisagra de IgG4/CD28/CD137 (4-1BB)/CD3zeta y una forma truncada del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano (EGFRt) bajo el control de un promotor compuesto del factor de elongación 1-alfa (EF1-alfa)/región R del virus de la leucemia humana de linfocitos T (HTLV-1 R). Las células poseen actividad anti-tumoral en pacientes con cánceres de linfocitos B que expresan CD19.

lorecevivintum

lorecevivint


N-(5-{3-[7-(3-fluorophenyl)-1*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-2-yl]-1*H*-indazol-5-yl}pyridin-3-yl)-3-methylbutanamide

lorécivivint

N-(5-{3-[7-(3-fluorophényl)-1*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-2-yl]-1*H*-indazol-5-yl}pyridin-3-yl)-3-méthylbutanamide

lorecevivint

N-(5-{3-[7-(3-fluorophényl)-1*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-2-yl]-1*H*-indazol-5-yl}pyridin-3-yl)-3-méthylbutanamide

C₂₉H₂₄FN₇O**marstacimabum #**

marstacimab

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* TFPI (tissue factor pathway inhibitor, extrinsic pathway inhibitor, EPI, lipoprotein-associated coagulation inhibitor, LACI)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (100%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 L1.4>A (237), L1.3>A (238), G1>A (240) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (121-449)], (223-217')-disulfide with lambda light chain (1'-218') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-40*01 (100%) - IGLJ2*01 (100%)) [9.3.12] (1'-112') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (113-218'')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide

marstacimab

immunoglobuline G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* TFPI (inhibiteur de la voie du facteur tissulaire, inhibiteur de la voie extrinsèque, EPI, inhibiteur de la coagulation associé aux lipoprotéines, LACI)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (100%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), charnière (219-233), CH2 L1.4>A (237), L1.3>A (238), G1>A (240) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (121-449)], (223-217')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-218') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-40*01 (100%) -IGLJ2*01 (100%)) [9.3.12] (1'-112') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (113-218')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure

marstacimab

inmunoglobulina G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* TFPI (inhibidor de la vía del factor tisular, inhibidor de la vía extrínseca, EPI, inhibidor de la coagulación asociado a las lipoproteínas, LACI)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (100%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), bisagra (219-233), CH2 L1.4>A (237), L1.3>A (238), G1>A (240) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (121-449)], (223-217')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-218') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-40*01 (100%) -IGLJ2*01 (100%)) [9.3.12] (1'-112') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (113-218')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada						
EVQLLES	GGG	LVQPGGSLRL	SCAASGFTFS	SYAMSWVRQA	PGKGLEWVSA	50
ISGSGSTY		ADSVKGRFTI	SRDNSKNTLY	LQMNSLRAED	TAVYYCAILG	100
ATSLSA	FDIW	QGGMVTVSS	ASTKGPSVFP	LAPSSKSTSG	GTAALGCLVK	150
DYFPEP	VTVS	WNSGALTSGV	HTFPAVLQSS	GLYSLSSVVT	VPSSSLGTQT	200
YICNVN	HKPS	NTKVDKKVEP	KSCDKTHTCP	PCPAPEAAGA	PSVFLFPPKP	250
KDTLMIS	RTP	EVTCCVVVDVS	HEDPEVKFNW	YVDGVEVHNA	KTKPREEQYN	300
STYRVVSVLT		VLHQDWLNGK	EYKCKVSNKA	LPAPIEKTIS	KAKGQPREPQ	350
VYTLPPSREE		MTKNQVSLTC	LVKGFYPSDI	AVEWESNGQP	ENNYKTTTPV	400
LDS	DGSFFLY	SKLTVDKSRW	QQGNVFSQSV	MHEALHNHYT	QKSLSLSPG	449
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera						
QSVLTQ	PPSV	SGAPGQRVTI	SCTGSSSNIAG	AGYDVHWYQQ	LPGTAPKLLI	50
YGN	SNRPSGV	PDRFSGSKSG	TSASLAITGL	QAEDADYYC	QSYDSSLSGS	100
GVF	GGGTKLT	VLGQPKAAP	SVTLFPPSSEE	LQANKATLVC	LISDFYPGAV	150
TVAWK	ADSSP	VKAGVETTP	SKQSNNKYAA	SSYLSLTPEQ	WKSHRSYSQ	200
VTH	GSTVEK	TVAPTECS				218

Post-translational modifications		
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro		
Intra-H (C23-C104)	22-96	147-203 264-324 370-428
	22'-96"	147"-203" 264"-324" 370"-428"
Intra-L (C23-C104)	22'-90'	140"-199"
	22"-90"	140"-199"
Inter-H-L (h5-CL 126)	223-217"	223"-217"
Inter-H-H (h11, h 14)	229-229"	232-232"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
300, 300"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaríos complejos fucosilados

masupirdinum


masupirdine

1-(2-bromobenzene-1-sulfonyl)-5-methoxy-3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1*H*-indole

masupirdine

1-(2-bromobenzène-1-sulfonyl)-5-méthoxy-3-[(4-méthylpipérazin-1-yl)méthyl]-1*H*-indole

masupirdina

1-(2-bromobenceno-1-sulfonil)-5-metoxi-3-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-1*H*-indol $C_{21}H_{24}BrN_3O_3S$ **miricorilantum**


miricorilant

6-(*trans*-4-phenylcyclohexyl)-5-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]pyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione

miricorilant

6-(*trans*-4-phénylcyclohexyl)-5-[[3-(trifluorométhyl)phényl]méthyl]pyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione

miricorilant

6-(*trans*-4-fenilciclohexil)-5-[[3-(trifluorometil)fenil]metil]pirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona $C_{24}H_{23}N_2O_2F_3$ **mitazalimabum #**

mitazalimab

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CD40 (tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, TNFRSF5)], humanized monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-449) [humanized VH (IGHV3-48*01 (86.7%) -IGHD) -IGHJ1*01 (100%)] [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (216) (120-217), hinge (218-232), CH2 (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-216')-disulfide with lambda light chain (1'-217') [humanized V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-47*02 (90.9%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.4.11] (1'-111') -*Homo sapiens* IGLC3*04 (112'-217'))]; dimer (228-228':231-231')-bisdisulfide

mitazalimab

immunoglobuline G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CD40 (membre 5 de la superfamille des récepteurs du TNF, TNFRSF5)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-449) [VH humanisé (IGHV3-48*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%)) [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (216) (120-217), charnière (218-232), CH2 (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-216')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-217') [V-LAMBDA humanisé (*Homo sapiens*IGLV1-47*02 (90.9%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.4.11] (1'-111') -*Homo sapiens*IGLC3*04 (112'-217'')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure

mitazalimab

inmunoglobulina G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CD40 (miembro 5 de la superfamilia de los receptores del TNF, TNFRSF5)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 (1-449) [VH humanizado (IGHV3-48*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%)) [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (216) (120-217), bisagra (218-232), CH2 (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-216')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-217') [V-LAMBDA humanizado (*Homo sapiens*IGLV1-47*02 (90.9%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.4.11] (1'-111') -*Homo sapiens*IGLC3*04 (112'-217'')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EVQLLESGGG	LVQPGGSLRL	SCAASGFTFS	TYGMHWVRQA
ISGSSSYIFY	ADSVRGFRFTI	SRDENSEALY	LQMNSLRAED
RGSGMDLWG	QGTLTVTSSA	STKGPSVFPL	APSSKSTSGG
YFPEPVTWSW	NSGALTSGVH	TFPAVLQSSG	LYSLSSVVTV
ICNVNHKPSN	TKVDKKVEPK	SCDKTHTCPP	CPAPELLGGP
DTLMISRTP	ETCIVVDVSH	EDPEVKFNWY	VDGVEVHNAK
TYRVVSVLTV	LHQDWLNGKE	YKCKVSNKAL	PAPIETKISK
YTLPPSRDEL	TKNQVSLTCL	VKGFPYSDIA	VEWESNGQPE
DSGGSFFLYS	KLTVDKSRWQ	QGNVFSCSVM	HEALHNHYTQ
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
QSVLTQPPSA	SGTPGQRTVI	SCTGSSSNIG	AGYVWYVYQQ
YGNINRPSGV	PDRFSGSKSG	TSASLAISGL	RSEDEADYYC
VFGGKTKLTV	LGPQKAAAPSV	TLFPSSSEEL	QANKATLVCL
VAMKADSSPV	KAGVETTTTPS	KQSNNKYAAS	SYLSLTPEQW
THEGSTVEKT	VAPTECS		
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	146-202	263-323
	22"-96"	146"-202"	263"-323"
Intra-L (C23-C104)	22'-90'	139'-198'	
	22'''-90'''	139'''-198'''	
Inter-H-L (h 5-CL 126)	222-216'	222"-216"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	228-228"	231-231"	
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación			
H CH2 N84.4:			
299, 299"			
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados			

mivavotinibum


mivavotinib

6-[[[(1*R*,2*S*)-2-aminocyclohexyl]amino]-7-fluoro-4-(1-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl)-1,2-dihydro-3*H*-pyrrolo[3,4-*c*]pyridin-3-one

mivavotinib

6-[[[(1*R*,2*S*)-2-aminocyclohexyl]amino]-7-fluoro-4-(1-méthyl-1*H*-pyrazol-4-yl)-1,2-dihydro-3*H*-pyrrolo[3,4-*c*]pyridin-3-one

mivavotinib

6-[[[(1*R*,2*S*)-2-aminociclohexit]amino]-7-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-1,2-dihidro-3*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-3-onaC₁₇H₂₁FN₆O**murlentamabum #**

murlentamab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* AMHR2 (anti-Müllerian hormone (AMH) receptor type 2, Müllerian inhibiting substance type II receptor, MISRII, MISR2)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-445) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (90.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.8] (1-115) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (212) (116-213), hinge (214-228), CH2 (229-338), CH3 D12 (354), M14 (356) (339-443), CHS (444-445)) (116-445)], (218-213')-disulfide with kappa light chain (1'-213') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-5*01 (86.2%) -IGKJ4*01 (100%)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(107'-213')]; dimer (224-224":227-227")-bisdisulfide

murlentamab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* AMHR2 (récepteur de type 2 de l'hormone anti-müllérienne, récepteur de type II de la substance inhibitrice müllérienne, MISRII, MISR2)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-445) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (90.80%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.8] (1-115) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (212) (116-213), charnière (214-228), CH2 (229-338), CH3 D12 (354), M14 (356) (339-443), CHS (444-445)) (116-445)], (218-213')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-213') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens*IGKV1-5*01 (86.2%) -IGKJ4*01 (100%)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (107'-213')]; dimère (224-224":227-227")-bisdisulfure

murlentamab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* AMHR2 (receptor de tipo 2 de la hormona anti-mülleriana, receptor de tipo II de la sustancia inhibidora mülleriana, MISRII, MISR2)], anticuerpo monoclonal humanizado;
cadena pesada gamma1 (1-445) [VH humanizado (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (90.80%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8] (1-115) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (212) (116-213), bisagra (214-228), CH2 (229-338), CH3 D12 (354), M14 (356) (339-443), CHS (444-445)) (116-445)], (218-213')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-213') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens*IGKV1-5*01 (86.2%) -IGKJ4*01 (100%)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (107'-213')]; dímero (224-224":227-227")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada		
QVRLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCKASGYTFT
IYPGDDSTKY	SQKFQGRVTI	TRDTSASTAY
RFAYWGQGT	LVTSASTKG	PSVFPLAPSS
PVTVSWNSGA	LTSGVHTFPA	VLQSSGLYS
NHKPSNTKVD	KKVEPKSCDK	THTCPPCPAP
ISRTPEVTCV	VVDVSHEDPE	VKFNWYVDGV
VSVLTVLHQD	WLNKEYKCK	VSNKALPAPI
PSRDELTKNQ	VSLTCLVKGF	YPSDIAVEWE
SFFLYSKLTV	DKSRWQQGNV	FSCVMHEAL
DIQMTQSPST	LSASVGRVIT	ITCRASSSVR
SSLKSGVPSR	FSGSGSGTEF	TLTISSLQPD
TKVEIKRTVA	APSVFIFPPS	DEQLKSGTAS
NALQSGNSQE	SVTEQDSKDS	TYSLSTLTLL
SSPVTKSFNR	GEC	

Post-translational modifications		
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro		
Intra-H (C23-C104)	22-96	142-198
Intra-L (C23-C104)	23-87	133-193
Inter-H-L (h 5-CL 126)	218-213	218-213
Inter-H-H (h 11, h 14)	224-224	227-227

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84,4; 295, 295"
Low fucosylated complex bi-antennary rat myeloma YB2/0-type glycans / glycanes de type myélome de rat YB2/0 bi-antennaires complexes faiblement fucosylés / glicanos de tipo mieloma de rata YB2/0 biantenaricos complejos bajo fucosilados

neluxicaponium
neluxicapone



4,5-dihydroxy-2-[(4-methylphenyl)methyl]benzene-1,3-dicarbonitrile

neluxicapone

4,5-dihydroxy-2-[(4-méthylphényl)méthyl]benzène-1,3-dicarbonitrile

neluxicapona

4,5-dihidroxi-2-[(4-metilfenil)metil]benzeno-1,3-dicarbonitrilo



nerinetidum

nerinetide

L-tyrosylglycyl-L-arginyl-L-lysyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutamyl-L-arginyl-L-arginyl-L-lysyl-L-leucyl-L-seryl-L-seryl-L-isoleucyl-L- α -glutamyl-L-seryl-L- α -aspartyl-L-valine

nérinétide

L-tyrosylglycyl-L-arginyl-L-lysyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutamyl-L-arginyl-L-arginyl-L-lysyl-L-leucyl-L-seryl-L-seryl-L-isoleucyl-L- α -glutamyl-L-seryl-L- α -aspartyl-L-valine

nerinetida

L-tirosilglicil-L-arginil-L-lisil-L-lisil-L-arginil-L-arginil-L-glutaminiil-L-arginil-L-arginil-L-lisil-L-leucil-L-seril-L-seril-L-isoleucil-L- α -glutamil-L-seril-L- α -aspartil-L-valina $C_{105}H_{188}N_{42}O_{30}$

H-Tyr—Gly—Arg—Lys—Lys—Arg—Arg—Gln—Arg—Arg—
 10
 —Arg—Lys—Leu—Ser—Ser—Ile—Glu—Ser—Asp—Val—OH
 20

nevanimibum


nevanimibe

N-({1-[4-(dimethylamino)phenyl]cyclopentyl)methyl}-*N*-[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]urea

névanimibe

N-({1-[4-(diméthylamino)phényl]cyclopentyl)méthyl}-*N*-[2,6-di(propan-2-yl)phényl]urée

nevanimiba

N-({1-[4-(dimetilamino)fenil]ciclopentil}metil)-*N*-[2,6-di(propan-2-il)fenil]urea $C_{27}H_{39}N_3O$ **nirsevimabum #**

nirsevimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[human respiratory virus (RSV) fusion glycoprotein F], monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-456) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-69*01 (82.5%) -IGHD -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.19] (1-126) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (223) (127-224), hinge (225-239), CH2 M15.1>Y (261), S16>T (263), T18>E (265) (240-349), CH3 E12 (365), M14 (367) (350-454), CHS (455-456)) (127-456)], (229-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-33*01 (93.7%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (235-235':238-238')-bisdisulfide

nirsévimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[glycoprotéine de fusion F du virus respiratoire syncytial (VRS) humain], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-456) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-69*01 (82.5%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.19] (1-126) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (223) (127-224), charnière (225-239), CH2 M15.1>Y (261), S16>T (263), T18>E (265) (240-349), CH3 E12 (365), M14 (367) (350-454), CHS (455-456)) (127-456)], (229-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-33*01 (93.7%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (235-235":238-238")-bisdisulfure

nirsevimab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[glicoproteína de fusión F del virus respiratorio sincitial (VRS) humano], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1 (1-456) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-69*01 (82.5%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.19] (1-126) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (223) (127-224), bisagra (225-239), CH2 M15.1>Y (261), S16>T (263), T18>E (265) (240-349), CH3 E12 (365), M14 (367) (350-454), CHS (455-456)) (127-456)], (229-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-33*01 (93.7%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (235-235":238-238")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLVQSGAE VKKPGSSVMV SCQASGGLLE DYIINWVRQA PGQGPPEWMGG 50
IIPVLGTVHY GPKFQGRVTI TADESTDATY MELSSLRSED TAMYYCATET 100
ALVVSSETYLP HYFDNWGGQT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA 150
LGCLVKDYFP EPVTVSNWSG ALTSQVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS 200
SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF 250
LFPPKPKDTL YITREPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP 300
REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTIKAKG 350
QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY 400
KTTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL 450
SLSPGK 456

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIQMTQSPSS LSAAVGDRVT ITCQASQDIV NYLWYQQKPK GKAPKLLIYV 50
ASNLETGVPS RFSGSGSGTD FSLTISSLQP EDVATYYCQQ YDNLPLTFGG 100
GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 153-209 270-330 376-434
22'-96" 153"-209" 270"-330" 376"-434"
Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194'
23"-88" 134"-194"
Inter-H-L (h5-CL 126) 229-214' 229"-214"
Inter-H-H (h 11, h 14) 235-235" 238-238"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
306, 306"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

nomacopanum #

nomacopan

complement inhibitor from *Ornithodoros moubata* (soft tick or Argasid tick), produced in *Escherichia coli*

nomacopan

inhibiteur du complément de *Ornithodoros moubata* (tique molle ou Argasidé), produit dans *Escherichia coli*

nomacopán

inhibidor del complemento de *Ornithodoros moubata* (garrapata o Argásido), producido en *Escherichia coli*C₇₂₀H₁₁₀₇N₁₉₇O₂₄₄S₁₁

Sequence / Séquence / Secuencia

DSESDCTGSE PVDFAQAFSE GKEAYVLVRS TDPKARDCLK GEPAGEKQDN 50
 TLPVMTTFKN GTDWASTDWT FTLDGAKVTA TLGNLTQNR VVYDSQSHHC 100
 HVDKVEKEVP DYEMWLDAG GLEVEVECCR QKLEELASGR NQMYPHLKDC 150

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 6-128 38-150 100-129

obexelimabum #

obexelimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (B lymphocyte surface antigen B4, Leu-12)], monoclonal antibody;

gamma1 heavy chain (1-451) [VH (*Mus musculus*IGHV1-14*01 (77.6%)/*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (73.5%) - (IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) - *Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (218) (122-219), hinge (220-234), CH2 S29>E (271), L113>F (332) (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV2-137*01 (75.0%)/*Homo sapiens*IGKV3D-11*03 (73.7%) - *Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [11.3.9] (1'-112') - *Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide

obéxélimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (antigène de surface B4 des lymphocytes B, Leu-12)], anticorps monoclonal;

chaîne lourde gamma1 (1-451) [VH (*Mus musculus*IGHV1-14*01 (77.6%)/*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (73.5%) - (IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) - *Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (218) (122-219), charnière (220-234), CH2 S29>E (271), L113>F (332) (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV2-137*01 (75.0%)/*Homo sapiens*IGKV3D-11*03 (73.7%) - *Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [11.3.9] (1'-112') - *Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure

obexelimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (antígeno de superficie B4 de los linfocitos B, Leu-12)], anticuerpo monoclonal;

cadena pesada gamma1 (1-451) [VH (*Mus musculus* IGHV1-14*01 (77.6%)/*Homo sapiens* IGHV1-3*01 (73.5%) -(IGHD)-*Homo sapiens* IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (218) (122-219), bisagra (220-234), CH2 S29>E (271), L113>F (332) (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV2-137*01 (75.0%)/*Homo sapiens* IGKV3D-11*03 (73.7%) -*Homo sapiens* IGKJ2*01 (90.9%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
EVQLVESGGG LVKPGGSLKL SCAASGYTFT SYVMHWVRQA PGKGLEWIGY 50
INPYNDGTKY NEKFGGRVTI SSDKSISTAY MELSSLRSED TAMYVCARGT 100
YYYGTRVFDY WQQTTLVTVS SASTKGPSVF PLAPSKSTS GGTAAALGCLV 150
KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSTV TVPSSSLGTQ 200
TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHC PPCAPELLG GPSVFLFPPK 250
PKDTLMISRT PEVTCVVVDV EHEDEPKVFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300
NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK AFPAPIEKTI SKAKGQPREP 350
QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFPYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPPP 400
VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFCSS VMHEALHNNY TQKSLSLSPG 450
K 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIVMTQSPAT LSLSPGERAT LSCRSSKSLQ NVNGNTYLYW FQQKPGQSPQ 50
LLIYRMSNLN SGVPDRFSGS GSGTEFTLTI SSLEPEDFAV YYCMQHLEYP 100
ITFGAGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVCL LNNFYPREAK 150
VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE 200
VTHQGLSSPV TKSFNRGEC 219

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22"-96" 148"-204" 265"-325" 371"-429"
22"-96" 148"-204" 265"-325" 371"-429"
Intra-L (C23-C104) 23"-93" 139"-199"
23"-93" 139"-199"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 224"-219" 224"-219"
Inter-H-H (h 11, h 14) 230-230" 233-233"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
301,301"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.

odevixibat
odevixibat


(2*S*)-2-[(2*R*)-2-(2-[(3,3-dibutyl-7-(methylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1λ⁶,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy)acetamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]butanoic acid

odévixibat

acide (2*S*)-2-[(2*R*)-2-(2-[(3,3-dibutyl-7-(méthylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phényl-2,3,4,5-tétrahyd-ro-1*H*-1λ⁶,2,5-benzothiadiazépin-8-yl]oxy)acétamido)-2-(4-hydroxyphényl)acétamido]butanoïque

odevixibat

ácido (2*S*)-2-[(2*R*)-2-(2-[(3,3-dibutyl-7-(metilsulfanil)-1,1-dioxo-5-fenil-2,3,4,5-tetrahid-ro-1*H*-1λ⁶,2,5-benzotiadiazepin-8-il]oxi)acetamido)-2-(4-hidroxifenil)acetamido]butanoico

**olacatorum**

olacator


N-(benzenesulfonyl)-6-[3-fluoro-5-(2-methylpropoxy)phenyl]-2-[(4*S*)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxamide

olacator

N-(benzènesulfonyl)-6-[3-fluoro-5-(2-méthylpropoxy)phényl]-2-[(4*S*)-2,2,4-triméthylpyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxamide

olacator

N-(bencenosulfonyl)-6-[3-fluoro-5-(2-metilpropoxi)fenil]-2-[(4*S*)-2,2,4-trimetilpirrolidin-1-il]piridina-3-carboxamida

**olenasufligenum relduparvovec #**

olenasufligene relduparvovec

A recombinant non-replicating adeno-associated virus serotype rh.10 (AAVrh.10) vector, comprised of a recombinant genome with the AAV2 Inverted Terminal Repeats (ITR) packaged into an AAVrh.10 capsid, expressing the human N-sulfoglucosamine sulfohydrolase (hSGSH) cDNA, under the control of the CMV immediate early enhancer/chicken β actin (CAG) promoter and a bovine hGH polyA transcription termination site.

olénasufligène relduparvovec

vecteur viraladéno-associé de sérotype rh.10 recombinant non-répliquant (AAVrh.10), comprenant un génome fait de séquences inverses terminales répétées (ITR) de AAV2 empaquetées dans une capside de AAVrh.10, exprimant l'ADNc de la N-sulfoglucosamine sulfohydrolase humaine (hSGSH), sous le contrôle du promoteur du CMV (cytomégalo virus) immédiat précoce / du promoteur de l'actine β du poulet et une séquence poly A de la hGH bovine comme terminaison de la transcription.

olenasufligén relduparovec

Un vector de virus adenoasociado recombinante no replicativo de serotipo rh.10 (AAVrh.10), compuesto por un genoma recombinante con las Repeticiones Terminales Invertidas (ITR) empaquetadas en una cápside de AAVrh.10, expresando el cDNA de la N-sulfoglucosamina sulfhidrolasa humana, bajo el control del enhancer inmediato temprano del CMV/promotor de la β actina de pollo y un sitio poli A de la hGH bovina como terminación de la transcripción.

olinvacimabum #
olinvacimab

immunoglobulin G1_V-lambda-C-kappa, anti-[*Homo sapiens* KDR (kinase insert domain receptor, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR2, VEGF-R2, FLK1, CD309)], monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-462) [N-terminal 6-mer (1-6) - VH (*Homo sapiens* IGHV1-3*01 (84.7%) - (IGHD) - IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (7-127) -5-mer linker (128-132) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (229) (133-230), hinge(231-245), CH2(246-355), CH3E12 (371), M14 (373) (356-460), CHS (461-462)) (133-462)], (235-227')-disulfide with V-lambda-C-kappa light chain (1'-227') [N-terminal 5-mer (1'-5') -V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV3-21*01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%)) [6.3.10] (6'-112') -8-mer linker(113'-120') -*Homo sapiens* IGKC*01 T1.3>S (122), Km3 A45.1 (166), V101 (204) (121'-227'')]; dimer (241-241":244-244")-bisdisulfide

olinvacimab

immunoglobuline G1_V-lambda-C-kappa, anti-[*Homo sapiens* KDR (récepteur à domaine insert kinase, récepteur 2 du facteur de croissance endothélial vasculaire, VEGFR2, VEGF-R2, FLK1, CD309)], anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-462) [6-mer N-terminal (1-6) - VH (*Homo sapiens* IGHV1-3*01 (84.7%) - (IGHD) - IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (7-127) -5-mer linker (128-132) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (229) (133-230), charnière (231-245), CH2(246-355), CH3E12 (371), M14 (373) (356-460), CHS (461-462)) (133-462)], (235-227')-disulfure avec la chaîne légère V-lambda-C-kappa (1'-227') [5-mer N-terminal (1'-5') -V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV3-21*01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%)) [6.3.10] (6'-112') -8-mer linker (113'-120') -*Homo sapiens* IGKC*01 T1.3>S (122), Km3 A45.1 (166), V101 (204) (121'-227'')]; dimère (241-241":244-244")-bisdisulfure

olinvacimab

immunoglobulina G1_V-lambda-C-kappa, anti-[*Homo sapiens* KDR (receptor con dominio inserto kinasa, receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular, VEGFR2, VEGF-R2, FLK1, CD309)], anticuerpo monoclonal;

cadena pesada gamma1 (1-462) [6-mer N-terminal (1-6) -VH (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (84.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (7-127) -5-mer ligante (128-132) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (229) (133-230), bisagra(231-245), CH2(246-355), CH3E12 (371), M14 (373) (356-460), CHS (461-462)) (133-462)], (235-227')-disulfuro con la cadena ligera V-lambda-C-kappa (1'-227') [5-mer N-terminal (1'-5') -V-LAMBDA (*Homo sapiens*IGLV3-21*01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%)) [6.3.10] (6'-112') -8-mer ligante (113'-120') -*Homo sapiens*IGKC*01 T1.3>S (122), Km3 A45.1 (166), V101 (204) (121'-227')]; dímero (241-241":244-244")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
AQPAMQMQL VQSGAEVKKP GASVKLSCKA SGYTFSSYWM HWVRQAPGQR 50
LEWMGEINPG NGHTNYNEKF KSRVTITVDK SASTAYMELS SLRSEDATVY 100
YCAKIWGPSL TSPFDYWGQG TLVTVSSGLG GLASTKGPSV FPLAPSSKST 150
SGGTAALGCL VKDYFPEFVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV 200
VTVPSSSLGT QTYICNVNHH PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL 250
GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH 300
NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIRKT 350
ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG 400
QPENNYKTTT PVLDSGSGFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNN 450
YTKSLSLSP GK 462

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
SGVGSNEMLT QPPSVSVSPG KTARITCRGD NLGDVNVHWH QQRPGQAPVL 50
VMYYDADRP S GIPERFSGSN SGNATLTIS GVEAGDEADY YCQVWDRITSE 100
YVFGTGKVT VLGGSASLVE RSVAAPSVFI FPPSDEQLKS GTASVVCLLN 150
NFYPREAKVQ WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYSLSS TLTLSKADYE 200
KHKVYACEVT HQGLSSPVTK SFNRGEC 227

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 28-102 159-215 276-336 382-440
28"-102" 159"-215" 276"-336" 382"-440"
Intra-L (C23-C104) 27"-92" 147"-207"
27"-92" 147"-207"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 235-227' 235"-227"
Inter-H-H (h 11, h 14) 241-241" 244-244"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
312, 312"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados

olorinabum
olorinab



3-[(4a,5a,5)-3-[[[(2,5)-1-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]carbamoyl]-4,4a,5,5a-tetrahydro-1H-cyclopropa[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyrazol-1-yl]pyrazine 1-oxide

olorinab

1-oxyde de 3-[(4a,5a,5)-3-[[[(2,5)-1-hydroxy-3,3-diméthylbutan-2-yl]carbamoyl]-4,4a,5,5a-tétrahydro-1H-cyclopropa[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyrazol-1-yl]pyrazine

olorinab

1-óxido de 3-[(4a,5a,5)-3-[[[(2,5)-1-hidroxi-3,3-dimetilbutan-2-il]carbamoil]-4,4a,5,5a-tetrahidro-1H-ciclopropa[4,5]ciclopenta[1,2-c]pirazol-1-il]pirazina



omburtamabum #
omburtamab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD276 (B7H3, B7-H3, B7RP-2)], *Mus musculus* monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain (1-442) [*Mus musculus* VH (IGHV1-85*01 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (196) (119-215), hinge (216-228), CH2 K81>Q (285), I84.3>F (291) (229-335), CH3 N27>D (366) (336-440), CHS (441-442)) (119-442)], (220-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV5-39*01 (100%) -IGKJ5*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (108'-214')]; dimer (222-222":225-225":227-227")-trisdisulfide

omburtamab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD276 (B7H3, B7-H3, B7RP-2)], *Mus musculus* anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-442) [*Mus musculus* VH (IGHV1-85*01 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (196) (119-215), charnière (216-228), CH2 K81>Q (285), I84.3>F (291) (229-335), CH3 N27>D (366) (336-440), CHS (441-442)) (119-442)], (220-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV5-39*01 (100%) -IGKJ5*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (108'-214')]; dimère (222-222":225-225":227-227")-trisdisulfure

omburtamab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD276 (B7H3, B7-H3, B7RP-2)], *Mus musculus* anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1 (1-442) [*Mus musculus* VH (IGHV1-85*01 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (196) (119-215), bisagra (216-228), CH2 K81>Q (285), I84.3>F (291) (229-335), CH3 N27>D (366) (336-440), CHS (441-442)) (119-442)], (220-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV5-39*01 (100%) -IGKJ5*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (108'-214')]; dímero (222-222":225-225":227-227")-trisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLQSGAE LVKPGASVKL SCKASGYTFT NYDINWVRQR PEQGLEWIGW 50
IFPGDGSQY NEKFKGKATL TTDTSSTAY MQLSRLTSED SAVYFCARQT 100
TATWFAYWGQ GTLVTVSAAK TTPPSVYPLA PGSAAQTNSM VTGLCLVKGY 150
FPEPVTVTWN SGLSSGVHT FPAVLQSDLY TLSSSVTVPS STWPSETVTC 200
NVAHPASSTK VDKKIVPRDC GCKPCICTYP EVSSVFIFPP KPKDVLITIL 250
TPKVTGVVD ISKDDPEVQF SWFVDDVEYH TAQTQPREEQ FNSTFRSVSE 300
LPIMHQDLNL GKEFKCRVNS AAFPAPIEKT ISKTGRPHA PQVYTI PPPK 350
EQMAKDKVSL TCMITDFPFE DITVEWQWNG QPAENYKNTQ PIMDTGSIYF 400
VYSKINVQKS NWEAGNTFTC SVLHEGLHNN HTEKSLSHSP GK 442

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIVMTQSPAT LSVTPGDRVS LSCRASQSI S DYLHWYQQKS HESPRLLIKY 50
ASQSI SGIPS RFGSGSGSD FTLSINSVEP EDVGVYYCQN GHSPLTFPGA 100
GTKLELKRAD AAPTVISIFPP SSEQLTSGGA SVVCFLLNMFY PKDINVKWKI 150
DGSEQRNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTCEATHKT 200
STSPIVKSFN RNEC 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 145-200 256-316 362-420
22"-96" 145"-200" 256"-316" 362"-420"
Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 220-214' 220"-214"
Inter-H-H (h 7, h 10, h 12) 222-222" 225-225" 227-227"
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
292, 292"
Mus musculus hybridoma-type glycans / glycanes de type hybridome de *Mus musculus* /
glicanos de tipo hibridoma de *Mus musculus*
C-terminal lysine clipping:
H CHS K2:
442, 442"
(14.7% of H chain without the C-terminal lysine)

ontamalimabum #
ontamalimab

immunoglobulin G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* MADCAM1 (mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1, mucosal addressin cell adhesion molecule-1, MADCAM-1, MACAM1)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
gamma2 heavy chain (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-18*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.17] (1-124) -*Homo sapiens* IGHG2*01, G2m.. (CH1 (125-222), hinge (223-234), CH2 V45.1 (285) (235-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (125-450)], (138-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2D-29*1 (96.0%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (226-226":227-227":230-230":233-233")-tetrakisdisulfide

ontamalimab

immunoglobuline G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* MADCAM1 (molécule 1 d'adhésion cellulaire adressine de muqueuse vasculaire, molécule-1 d'adhésion cellulaire adressine de muqueuse, MAdCAM-1, MACAM1)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma2 (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-18*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.17] (1-124) -*Homo sapiens* IGHG2*01, G2m.. (CH1 (125-222), charnière (223-234), CH2 V45.1 (285) (235-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (125-450)], (138-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2D-29*1 (96.0%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (226-226":227-227":230-230":233-233")-tétrakisdisulfure

ontamalimab

inmunoglobulina G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* MADCAM1 (molécula 1 de adhesión celular adresina de mucosa vascular, molécula-1 de adhesión celular adresina de mucosa, MAdCAM-1, MACAM1)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma2 (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-18*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.17] (1-124) -*Homo sapiens* IGHG2*01, G2m.. (CH1 (125-222), bisagra (223-234), CH2 V45.1 (285) (235-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (125-450)], (138-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2D-29*1 (96.0%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (226-226":227-227":230-230":233-233")-tetrakisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada	
QVQLVQSGAE VKKFPGASVKV SCKASGYTFT SYGINWVRQA PGQGLEWMGW	50
ISVYSGNTNY AOKVQGRVTM TADTSTSTAY MDLRLSRDD TAVYYCAREG	100
SSSSGDDYYG MDVWGQGTTV TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG	150
CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSL SVTVTPSSNF	200
GTQTYTCNVD HKPSNTKVDK TVERKCCVEC PPCAPPVAG PSVFLFPPKP	250
KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN	300
STFRVSVLT VVHQDWLNGK EYCKVSNKG LPAPIEKTIS KTKGQPREPQ	350
VYTLPPSREE MTRKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTPPM	400
LDSDGSFFLY SKLTVDKSRV QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK	450
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera	
DIVMTQTPLS LSVTPGPQAS ISCKSSQSLL HTDGTITYLW YLQKPGQPPQ	50
LLIYEVSNRF SGVPRDFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGI YYCMQNIQLP	100
WTFQGQTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCCL LNNFYPREAK	150
VQMKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSYSL SSTLTLSKAD YERHKVYACE	200
VTHQGLSSPV TKSPNREGC	219

Post-translational modifications	
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro	
Intra-H (C23-C104)	22-96 151-207 264-324 370-428
	22"-96" 151"-207" 264"-324" 370"-428"
Intra-L (C23-C104)	23'-93' 139'-199'
	23'''-93''' 139'''-199'''
Inter-H-L (CH1 10-CL 126)	138-219' 138"-219"
Inter-H-H (h 4, h 5, h 8, h 11)	226-226" 227-227" 230-230" 233-233"
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación	
H CH2 N84.4:	
300, 300"	
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados	

orilanolimabum #
orilanolimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* FCGRT (Fc fragment of IgG receptor and transporter, neonatal Fc receptor, FcRn, transmembrane alpha chain of the neonatal receptor)], monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-444) [VH (*Mus musculus* IGHV1-81*01 (92.9%)/*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (77.6%) -(IGHD) -*Homo sapiens* IGHJ3*02 (83.3%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (119-216), hinge S10>P (226) (217-228), CH2 (229-338), CH3 (339-443), CHS K2>del (444)) (119-444)], (132-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV13-85*01 (88.4%)/*Homo sapiens* IGKV1-NL1*01 (83.2%) -*Homo sapiens* IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimer (224-224":227-227")-bisdisulfide

orilanolimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* FCGRT (transporteur et récepteur du fragment Fc des IgG, récepteur Fc néonatal, FcRn, chaîne alpha transmembranaire du récepteur néonatal)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma4 (1-444) [VH (*Mus musculus* IGHV1-81*01 (92.9%)/*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (77.6%) -(IGHD) -*Homo sapiens* IGHJ3*02 (83.3%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (119-216), charnière S10>P (226) (217-228), CH2 (229-338), CH3 (339-443), CHS K2>del (444)) (119-444)], (132-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV13-85*01 (88.4%)/*Homo sapiens* IGKV1-NL1*01 (83.2%) -*Homo sapiens* IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimère (224-224":227-227")-bisdisulfure

orilanolimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* FCGRT (transportador y receptor del fragmento Fc de las IgG, receptor Fc neonatal, FcRn, cadena alfa transmembranaria del receptor neonatal)], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma4 (1-444) [VH (*Mus musculus* IGHV1-81*01 (92.9%)/*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (77.6%) -(IGHD) -*Homo sapiens* IGHJ3*02 (83.3%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (119-216), bisagra S10>P (226) (217-228), CH2 (229-338), CH3 (339-443), CHS K2>del (444)) (119-444)], (132-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV13-85*01 (88.4%)/*Homo sapiens* IGKV1-NL1*01 (83.2%) -*Homo sapiens* IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dímero (224-224":227-227")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada					
QVQLVQSGAE	LKKPGASVKL	SCKASGYTFT	SYGISWVKQA	TGQGLEWIGE	50
IGHV1-81*01 (92.9%)	IGHV1-18*01 (77.6%)	IGHD	-Homo sapiens IGHJ3*02 (83.3%)		
IGHG4*01 (CH1 (119-216), charnière S10>P (226) (217-228), CH2 (229-338), CH3 (339-443), CHS K2>del (444)) (119-444)], (132-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (<i>Mus musculus</i> IGKV13-85*01 (88.4%)/ <i>Homo sapiens</i> IGKV1-NL1*01 (83.2%) - <i>Homo sapiens</i> IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimère (224-224":227-227")-bisdisulfure					
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera					
DIQMTQSPSS	LSASVGDRVT	ITCKASDHIN	NWLAWYQKP	GQAPRLISG	50
IGKV1-NL1*01 (83.2%)	IGKJ4*01 (100%)	IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dímero (224-224":227-227")-bisdisulfuro			
IGTKVEIKRVT	AAPSVFIIPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNIFY	PREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDQSD	STYLSLSLT	LSKADYKKHK	VIYACEVTHQ	200
LSSPVTKFS	RGEC				214

Post-translational modifications				
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro				
Intra-H (C23-C104)	22-96	145-201	259-319	365-423
	22"-96"	145"-201"	259"-319"	365"-423"
Intra-L (C23-C104)	23'-88'	134'-194'		
	23"-88"	134"-194"		
Inter-H-L (CH1 10-CL 126)	132-214'	132"-214"		
Inter-H-H (h 8, h 11)	224-224"	227-227"		
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación				
H CH2 N84.4:				
295, 295"				
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados				

osocimabum #**osocimab**

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* F11 (coagulation factor XI, FXI, plasma thromboplastin antecedent, PTA) activated], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 D12 (359), L14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (120-449)], (223-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-33*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide

osocimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* F11 (facteur de coagulation XI, FXI, antécédent de la thromboplastine plasmatique, PTA) activé], *Homo sapiens* anticorps monoclonal;
 chaîne lourde gamma1 (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (217) (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 D12 (359), L14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (120-449)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-33*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure

osocimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* F11 (factor de coagulación XI, FXI, antecedente de la tromboplastina plasmática, PTA) activada], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal;
 cadena pesada gamma1 (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (217) (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 D12 (359), L14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (120-449)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-33*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLLESQGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS QYGMWVRQA PGKLEWVSG 50
 IGPSGGSTVY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRARD TAVYYCTRGG 100
 PYYYYGMDWV GQGTITVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
 DYFPEPTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSVVT VPSSSLGTQT 200
 YICNVNHKPS NTKVDKVEP KSCDKHTCP PCPAPPELLGG FSVFLFPPKP 250
 KDTLMISRTPEVTCVVKVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
 STYRVVSVLT VLHQDLNMGK EYKCKVSNKA LPAPAEKTIS KAKGQPREPQ 350
 VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV 400
 LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG 449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIQMTQSPSS LSASVGRVIT ITCAQASQDIS NYLWVYQKPK GKAPKLLIYD 50
 ASNLETGVPSS RPSGSGSGTD FTFITSLQP EDIATYYCQQ ADSFPTVFGG 100
 GTKVEIKFTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNFFY PREARVQWVK 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RREG 214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
 22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"

Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
 23""-88"" 134""-194""

Inter-H-L (h5-CL 126) 223-214' 223"-214"

Inter-H-H (h 11, h 14) 229-229" 232-232"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2N84.4:

300,300"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires

complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

otilimabum #
otilimab

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CSF2 (colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), granulocyte-macrophage colony stimulating factor, GM-CSF)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-NL1*01 (88.1%) - (IGHD) -IGHJ1*01 (100%)) [8.10.8] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (214) (118-215), hinge (216-230), CH2 (231-340), CH3 E12 (356), M14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-209')-disulfide with lambda light chain (1'-210') -[*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-1*01 (85.2%) -IGLJ3*02 (100%)) [6.1.9] (1'-104') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (105'-210')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide

otilimab

immunoglobuline G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CSF2 (facteur 2 stimulant de colonies (granulocyte-macrophage), facteur stimulant des colonies de granulocytes et macrophages, GM-CSF)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-NL1*01 (88.1%) - (IGHD) -IGHJ1*01 (100%)) [8.10.8] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (214) (118-215), charnière (216-230), CH2 (231-340), CH3 E12 (356), M14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-209')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-210') -[*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-1*01 (85.2%) -IGLJ3*02 (100%)) [6.1.9] (1'-104') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (105'-210')]; dimère (226-226":229-229")-bisdisulfure

otilimab

immunoglobulina G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CSF2 (factor 2 estimulante de colonias (granulocito-macrófago), factor estimulante de las colonias de granulocitos y macrófagos, GM-CSF)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-NL1*01 (88.1%) - (IGHD) -IGHJ1*01 (100%)) [8.10.8] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (214) (118-215), bisagra (216-230), CH2 (231-340), CH3 E12 (356), M14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-209')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-210') -[*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-1*01 (85.2%) -IGLJ3*02 (100%)) [6.1.9] (1'-104') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (105'-210')]; dímero (226-226":229-229")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLVSGGG LVQPGGSLRL SCASGFTFS SYWMNWVRQA PGKLEWVSG 50
IENKYAGGAT YYAASVKGRF TISRDNKNT LYLQMNLSRA EDTAVYYCAR 100
GFGTDFWGQG TLTVYSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF 150
PEPVTWVSNIS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVTPS SSLGTQTYIC 200
NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKHTTCCPPC APELLGGPSV FLFPPKPKDT 250
LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY 300
RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTIKAK GQPREPQVYT 350
LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPPVLD 400
DGSFLYSKL TVDKSRWQGG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK 447

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIELTQPPSV SVAPGQTARI SCSGDSIGKK YAYWYQKPG QAPVLVIYKK 50
RPSGIPERFS GNSNGTATL TISGTQAEDE ADYYCSAWGD KGMVFGGKT 100
LTVLGQPKAA PSVTLFPPSS EELQANKATL VCLISDFYPG AVTVAWKADS 150
SPVKAGVETT TPSKQSNKY AASSYLSLTP EQWKSRRYS QCVTHEGSTV 200
EKTVPATECS 210

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-98 144-200 261-321 367-425
22"-98" 144"-200" 261"-321" 367"-425"
Intra-L (C23-C104) 22'-85' 132'-191'
22"-85" 132"-191"
Inter-H-L (h5-CL 126) 220-209' 220"-209"
Inter-H-H (h 11, h 14) 226-226" 229-229"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
297, 297"
Fucosylated complex bi-antennary PER.C6-type glycans / glycanes de type PER.C6 bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo PER.C6 biantennarios complejos fucosilados

oxycodogolum


oxycodogol

4,5 α -epoxy-6 α -[(2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-yl)oxy]-3-methoxy-17-methylmorphinan-14-ol

oxycodégol

4,5 α -époxy-6 α -[(2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadécane-19-yl)oxy]-3-méthoxy-17-méthylmorphinan-14-ol

oxicodegol

4,5 α -epoxi-6 α -[(2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-il)oxi]-3-metoxi-17-metilmorfinan-14-olC₃₁H₄₉NO₁₀**prademagenum zamikeracelum #**

prademagene zamikeracel

human culture expanded genetically modified autologous keratinocytes for cell-based gene therapy. Cells are isolated from skin of the patient, expanded and transduced with replication incompetent and non-self-inactivating Moloney murine leukemia virus (MMLV) derived retroviral vector encoding the functional collagen type VII alpha 1 chain (COL7A1) under the control of the mouse phosphoglycerol kinase-1 (mPGK-1) promoter.

pradémagène zamikéracel

kératinocytes humains, autologues, en culture d'expansion et génétiquement modifiés pour thérapie génique avec cellules. Les cellules sont isolées à partir de la peau du patient et sont expansées et transduites avec un vecteur rétroviral non-répliquant et auto-inactif dérivé du virus de la leucémie murine de Moloney (MMLV) codant pour la chaîne fonctionnelle alpha 1 du collagène de type VII (COL7A1) sous le contrôle du promoteur de la phosphoglycérol kinase-1 murine (mPGK-1).

prademagén zamikeracel

queratinocitos autólogos, modificados genéticamente, humanos, expandidos en cultivo para terapia génica con células. Las células se aíslan de la piel del paciente, se expanden y transducen con un vector retroviral incompetente para replicación y no autoinactivante derivado del virus de la leucemia murina de Moloney (MMLV), que codifica para la cadena funcional alfa 1 del colágeno tipo VII (COL7A1) bajo el control del promotor de la fosfoglicerol cinasa-1 de ratón (mPGK-1).

prolgolimabum #

prolgolimab

immunoglobulin G1_V-lambda-C-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], monoclonal antibody;

	gamma1 heavy chain (1-459) [VH (<i>Vicugna pacos</i> IGHV3S1*01 (89.8%)/ <i>Homo sapiens</i> IGHV3-23*04 or IGHV3-64*04 (85.7%) -(IGHD) - <i>Homo sapiens</i> IGHJ1*01 (100%)) [8.8.22] (1-129) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (226) (130-227), hinge (228-242), CH2 L1.3>A (246), L1.2>A (247) (243-352), CH3 E12 (368), M14 (370) (353-457), CHS (458-459)) (130-459)], (232-214')-disulfide with V-lambda-C-kappa light chain (1'-214') [V-LAMBDA (IGLV3-9*01 (100%) - IGLJ1*01 (90.9%)) [6.3.9] (1'-106') -1-mer glutaminyl linker (107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC1*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (238-238":241-241")-bisdisulfide
prolgolimab	immunoglobuline G1_V-lambda-C-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-459) [VH (<i>Vicugna pacos</i> IGHV3S1*01 (89.8%)/ <i>Homo sapiens</i> IGHV3-23*04 or IGHV3-64*04 (85.7%) -(IGHD) - <i>Homo sapiens</i> IGHJ1*01 (100%)) [8.8.22] (1-129) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (226) (130-227), charnière (228-242), CH2 L1.3>A (246), L1.2>A (247) (243-352), CH3 E12 (368), M14 (370) (353-457), CHS (458-459)) (130-459)], (232-214')-disulfure avec la chaîne légère V-lambda-C-kappa (1'-214') [V-LAMBDA (IGLV3-9*01 (100%) - IGLJ1*01 (90.9%)) [6.3.9] (1'-106') -1-mer glutaminyl linker (107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC1*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (238-238":241-241")-bisdisulfure
prolgolimab	inmunoglobulina G1_V-lambda-C-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-459) [VH (<i>Vicugna pacos</i> IGHV3S1*01 (89.8%)/ <i>Homo sapiens</i> IGHV3-23*04 or IGHV3-64*04 (85.7%) -(IGHD) - <i>Homo sapiens</i> IGHJ1*01 (100%)) [8.8.22] (1-129) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (226) (130-227), bisagra (228-242), CH2 L1.3>A (246), L1.2>A (247) (243-352), CH3 E12 (368), M14 (370) (353-457), CHS (458-459)) (130-459)], (232-214')-disulfuro con la cadena ligera V-lambda-C-kappa (1'-214') [V-LAMBDA (IGLV3-9*01 (100%) - IGLJ1*01 (90.9%)) [6.3.9] (1'-106') -1-mer glutaminil linker (107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC1*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (238-238":241-241")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
QVQLVQSGG6	LVQPGGSLRL	SCAASGFTFS	SYWMYWRQV PGKGLEWVSA 50
IDTGGGRTRY	ADSVKGRFAI	SRVNAKNTMY	LQMNSLRAED TAVYYCARDE 100
GGGTGWGLK	DWPGYGLDAW	QGTLTVTSSA	STKGPSVFPL APSSKSTSGG 150
TAALGCLVKD	YFPEPTVTSW	NSGALTSGVH	TFPAVLQSSG LYSLSVVTV 200
PSSSLGTQTY	ICNVNHKPSN	TKVDKRVPEK	SCDKTHTCPP CPAPEAAGVP 250
SVFLFPPKPK	DTLMISRTPE	VTCVVVDVSH	EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK 300
TKPREEQYNS	TYRVVSVLTV	LHQDWLNGKE	YKCKVSNKAL PAPIEKTISK 350
AKGQPREPQV	YTLPPSREEM	TKNQVSLTCL	VKGFPYSDIA VEWESNGQPE 400
NNYKTTTPVL	DSDSGFFLYS	KLTVDKSRWQ	QGNVFSCSVN HEALHNHYTQ 450
KSLSLSPGK			459
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
QPVLTPQLSV	SVALGQTARI	TCGGNNIGSK	NVHWYQQKQP QAPVLVIYRD 50
SNRPSGIPER	FSGSNSGNTA	TLTISRAGAG	DEADYYCQVM DSSTAVFGTG 100
TKLTVLQRTY	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNIFY PREAKVKWVK 150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSLSLT	LSKADYERKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN	RGEC		214
Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	156-212	273-333 379-437
	22"-96"	156"-212"	273"-333" 379"-437"
Intra-L (C23-C104)	22'-87'	134'-194'	
	22"'-87'"	134"'-194'"	
Inter-H-L (h 5-CL 126)	232-214'	232"-214"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	238-238"	241-241"	
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación			
H CH2 N84.4:			
309, 309"			
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaríos complejos fucosilados			

redipultidum
redipultide

L-cysteinyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-cysteinyl-L-arginyl-L-alanyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-lysyl-L-arginyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-alanyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-lysylglycylglycyl-L-arginyl-L-leucyl-L-leucyl-L-prolyl-L-glutamyl-L-leucyl-L-valyl-L-cysteinyl-L-arginyl-L-leucyl-L-valyl-L-leucyl-L-arginyl-L-cysteinyl-L-serine, cyclic (1-33:4-27)-bisdisulfide

rédiplutide

bisdisulfure cyclique (1-33:4-27) de L-cystéinyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-cystéinyl-L-arginyl-L-alanyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-lysyl-L-arginyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-alanyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-lysylglycylglycyl-L-arginyl-L-leucyl-L-leucyl-L-prolyl-L-glutamyl-L-leucyl-L-valyl-L-cystéinyl-L-arginyl-L-leucyl-L-valyl-L-leucyl-L-arginyl-L-cystéinyl-L-sérine

redipultida

bisdisulfuro cíclico (1-33:4-27) de L-cisteinil-L-triptofil-L-leucil-L-cisteinil-L-arginil-L-alanil-L-leucil-L-isoleucil-L-lisil-L-arginil-L-isoleucil-L-glutaminil-L-alanil-L-leucil-L-isoleucil-L-prolil-L-lisilglicilglicil-L-arginil-L-leucil-L-leucil-L-prolil-L-glutaminil-L-leucil-L-valil-L-cisteinil-L-arginil-L-leucil-L-valil-L-leucil-L-arginil-L-cisteinil-L-serina



Sequence / Séquence / Secuencia

CWLCRALIKR IQALIPKGGRR LLPQLVCRLV LRCS

34

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
1-33 4-27**relatlimabum #**
relatlimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (lymphocyte activating 3, lymphocyte-activation 3, CD223)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-34*01 (92.7%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%)) [8.7.14] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), hinge S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-11*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (90.9%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214'')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide

rélatlimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (activateur 3 des lymphocytes, lymphocyte-activation 3, CD223)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma4 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-34*01 (92.7%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%)) [8.7.14] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), charnière S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-11*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (90.9%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214'')]; dimère (226-226":229-229")-bisdisulfure

relatlimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (activador 3 de los linfocitos, linfocito-activación 3, CD223)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma4 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-34*01 (92.7%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%)) [8.7.14] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), bisagra S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134'-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-11*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (90.9%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (226-226":229-229")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLQQWGAG	LLKPSETLSL	TCAVYGGSF	DYYWNWIRQP	PGKGLEWIGE	50
INHRGSTNSN	PSLKSRTVLS	LDTSKNQFSL	KLRSVTAADT	AVYYCAFGYS	100
DYEYNWFDPW	GGGLTVTVSS	ASTKGPSVFP	LAPCSRSTSE	STAALGCLVK	150
DYFPEPVTVS	WNSGALTSGV	HTFPAVLQSS	GLYSLSSVVT	VPSSSLGTKT	200
YTCNVDPKPS	NTKVDKRVES	KYGPPCPPCP	APEFLGGPSV	FLFPPPKPDT	250
LMISRTPEVT	CVVVDVSQED	PEVQFNWYVD	GVEVHNAKTK	PREEQFNSTY	300
RVSVLTVLH	QDWLNGKEYK	CKVSNKGLPS	SIETISKAK	GQPREPQVYT	350
LPPSQEEMTK	NQVSLTCLVK	GFYPSDIAVE	WESNGQPENN	YKTTTPPVLD	400
DGSFFLYSRL	TVDKSRWQEG	NVFSCSVME	ALHNYHTQKS	LSLSLGK	447

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

EIVLTQSPAT	LSLSPGERAT	LSCRASQGIS	SYLAWYQQKP	GQAPRLLIYD	50
ASNRRATGIPA	RFGSGSGSTD	FTLTISSELP	EDFAVYYCQ	RSNWPLTFGQ	100
GTNLEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLNNFY	PREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSSTLT	LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	200
LSSPVTKSFN	RGEC				214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22"-95"	147"-203"	261"-321"	367"-425"
	22"-95"	147"-203"	261"-321"	367"-425"

Intra-L (C23-C104)	23"-88"	134"-194"
	23"-88"	134"-194"

Inter-H-L (CH1 10-CL 126)	134'-214'	134"-214"
---------------------------	-----------	-----------

Inter-H-H (h 8, h 11)	226-226"	229-229"
-----------------------	----------	----------

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

297, 297"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

reldesemtivum

reldesemtiv


1-[2-({[*trans*-3-fluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)cyclobutyl]methyl}amino)pyrimidin-5-yl]-1 *H*-pyrrole-3-carboxamide

reldésemtiv

1-[2-({[*trans*-3-fluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)cyclobutyl]méthyl}amino)pyrimidin-5-yl]-1 *H*-pyrrole-3-carboxamide

reldesemtiv

1-[2-({[*trans*-3-fluoro-1-(3-fluoropiridin-2-il)ciclobutil]metil}amino)pirimidin-5-il]-1 *H*-pirrol-3-carboxamida

C₁₉H₁₈F₂N₆O

reproxalapum

reproxalap


2-(3-amino-6-chloroquinolin-2-yl)propan-2-ol

réproxalap

2-(3-amino-6-chloroquinoléin-2-yl)propan-2-ol

reproxalap

2-(3-amino-6-cloroquinolein-2-il)propan-2-ol

 $C_{12}H_{13}ClN_2O$ **resmetiromum**

resmetirom


2-(3,5-dichloro-4-[[6-oxo-5-(propan-2-yl)-1,6-dihydropyridazin-3-yl]oxy]phenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile

resmétirom

2-(3,5-dichloro-4-[[6-oxo-5-(propan-2-yl)-1,6-dihydropyridazin-3-yl]oxy]phényl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tétrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile

resmetirom

2-(3,5-dicloro-4-[[6-oxo-5-(propan-2-il)-1,6-dihidropiridazin-3-il]oxi]fenil)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,4-triazina-6-carbonitrilo

 $C_{17}H_{12}Cl_2N_6O_4$ **ripretinibum**


ripretinib

N-{4-bromo-5-[1-ethyl-7-(methylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-3-yl]-2-fluorophenyl}-*N*-phenylurea

riprétinib

N-{4-bromo-5-[1-éthyl-7-(méthylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-1,6-naphtyridin-3-yl]-2-fluorophényl}-*N*-phénylurée

ripretinib

N-{4-bromo-5-[1-etil-7-(metilamino)-2-oxo-1,2-dihidro-1,6-naftiridin-3-il]-2-fluorofenil}-*N*-fenilurea $C_{24}H_{21}BrFN_5O_2$ 

rocacetrapium


rocacetrapiib

(4*S*,5*R*)-5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-({2-[4-fluoro-2-methoxy-5-(propan-2-yl)phenyl]-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl}methyl)-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-one

rocacétrapiib

(4*S*,5*R*)-5-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]-3-({2-[4-fluoro-2-méthoxy-5-(propan-2-yl)phényl]-5,5-diméthylcyclohex-1-én-1-yl}méthyl)-4-méthyl-1,3-oxazolidin-2-one

rocacetrapiib

(4*S*,5*R*)-5-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-3-({2-[4-fluoro-2-metoxi-5-(propan-2-il)fenil]-5,5-dimetilciclohex-1-en-1-il}metil)-4-metil-1,3-oxazolidin-2-ona $C_{31}H_{34}F_7NO_3$ **rodatristatum**


rodatristat

(3*S*)-8-{2-amino-6-[(1*R*)-1-(5-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2,2,2-trifluoroethoxy]pyrimidin-4-yl}-2,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid

rodatristat

acide (3*S*)-8-{2-amino-6-[(1*R*)-1-(5-chloro[1,1'-biphényl]-2-yl)-2,2,2-trifluoroéthoxy]pyrimidin-4-yl}-2,8-diazaspiro[4.5]décane-3-carboxylique

rodatristat

ácido (3*S*)-8-{2-amino-6-[(1*R*)-1-(5-cloro[1,1'-bifenil]-2-il)-2,2,2-trifluoroetoxi]pirimidin-4-il}-2,8-diazaspiro[4.5]decano-3-carboxílico $C_{27}H_{27}ClF_3N_5O_3$ **rolinsatamabum #**

rolinsatamab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PRLR (prolactin receptor)], monoclonal antibody;

	gamma1 heavy chain (1-450) [VH (<i>Mus musculus</i> IGHV1-69*02 (82.70%)/ <i>Homo sapiens</i> IGHV1-46*01 (79.6%) -(IGHD)- <i>Homo sapiens</i> IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (<i>Mus musculus</i> IGKV6-13*01 (82.10%)/ <i>Homo sapiens</i> IGKV1-12*01 (81.1%) - <i>Homo sapiens</i> IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide
rolinsatamab	immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> PRLR (récepteur de la prolactine)], anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-450) [VH (<i>Mus musculus</i> IGHV1-69*02 (82.70%)/ <i>Homo sapiens</i> IGHV1-46*01 (79.6%) -(IGHD)- <i>Homo sapiens</i> IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), charnière (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (<i>Mus musculus</i> IGKV6-13*01 (82.10%)/ <i>Homo sapiens</i> IGKV1-12*01 (81.1%) - <i>Homo sapiens</i> IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure
rolinsatamab	inmunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> PRLR (receptor de la prolactina)], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-450) [VH (<i>Mus musculus</i> IGHV1-69*02 (82.70%)/ <i>Homo sapiens</i> IGHV1-46*01 (79.6%) -(IGHD)- <i>Homo sapiens</i> IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), bisagra (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA (<i>Mus musculus</i> IGKV6-13*01 (82.10%)/ <i>Homo sapiens</i> IGKV1-12*01 (81.1%) - <i>Homo sapiens</i> IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EVQLVQSGAE	VKKPGSSVKV	SKKASGYTFT	TYWMHWVRQA PGQGLEWIGE 50
IDPSDSYSNY	NQKFKDRATL	TVDKSTSTAY	MELSSLRSED TAVYYCARNG 100
GLGPAWFSYW	GQGTLTVTSS	ASTKGPSVFP	LAPSSKSTSG GTAAALGCLVK 150
DYFPEPVTVS	WNSGALTSGV	HTFPAVLQSS	GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
YICNVNHKPS	NTKVDKKVEP	KSCDKHTHCP	PCPAPELLGG PCVFLFPPPK 250
KDTLMISRTP	EVTQCVVDVS	HEDPEVKENW	YVDGVEVHNA KTKPREBEQYN 300
STYRVVSVLT	VLHQDWLNGK	EYKCKVSNKA	LPAPIEKTIIS KAKGQPREPQ 350
VYTLPPSREE	MTKNQVSLTC	LVKGFYPSDI	AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV 400
LDSDGSFFLY	SKLTVDKSRW	QQGNVFESCV	MHEALHNYHT QKSLSLSPGK 450
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DIQMTQSPSS	VSASVGDRAVT	ITCKASQYVG	TAVAWYQQKP GKSPKLLIYS 50
ASNRYTGWPS	RFSDSGSGTD	FTLTISSLQP	EDFATYFCQQ YSSYPWTFGG 100
GTKVEIKRTV	AAPSVFIFFP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNNFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYSLSSSTLT	LSKADYERKH VYACEVTHQG 200
LSPVPTKSFN	RGEC		214
Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	147-203	264-324 370-428
	22"-96"	147"-203"	264"-324" 370"-428"
Intra-L (C23-C104)	23'-88"	134'-194"	
	23'''-88'''	134'''-194'''	
Inter-H-L (h 5-CL 126)	223-214'	223"-214"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	229-229"	232-232"	
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación			
H CH2 N84.4:			
300, 300"			
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados.			

rolinsatamabum talirinum #

rolinsatamab talirine

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PRLR (prolactin receptor)], monoclonal antibody, conjugated to the pyrrolobenzodiazepine (PDB) dimer SGD-1882; gamma1 heavy chain (1-450) [VH (*Mus musculus*IGHV1-69*02 (82.7%)/*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (79.6%)-(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV6-13*01 (82.10%)/*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (81.1%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide; conjugated, on two site-specific drug attachment engineered cysteines (C242, C242"), to a maximum of two pyrrolobenzodiazepine (PDB) dimers SGD-1882, each via a cleavable (valine-alanine dipeptide as cathepsin B cleavage site) maleimidocaproyl type linker

rolinsatamab talirine

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PRLR (récepteur de la prolactine)], anticorps monoclonal, conjugué à deux pyrrolobenzodiazépine (PDB) dimères SGD-1882; chaîne lourde gamma1 (1-450) [VH (*Mus musculus*IGHV1-69*02 (82.7%)/*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (79.6%)-(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), charnière (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV6-13*01 (82.10%)/*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (81.1%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure; conjugué, sur deux cystéines sites de fixation spécifique du linker-produit actif (C242, C242"), à un maximum de deux pyrrolobenzodiazépine (PDB) dimères SGD-1882, chacun via un linker clivable (dipeptide valine-alanine clivable par la cathepsine B) de type maléimidocaproyl


rolinsatamab talirina

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PRLR (receptor de la prolactina)], anticuerpo monoclonal, conjugado con diez pirrolobenzodiazepinas (PDB) dímeros SGD-1882; cadena pesada gamma1 (1-450) [VH (*Mus musculus*IGHV1-69*02 (82.7%)/*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (79.6%)-(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), bisagra (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV6-13*01 (82.10%)/*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (81.1%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro; conjugado, en diez cisteinas sitios de fijación específicos del linker-producto activo (C242, C242"), con un máximo de diez dímeros de pirrolobenzodiazepina (PDB) SGD-1882, cada uno mediante un espaciador escindible (dipéptido valina-alanina escindible por la catepsina B) del tipo maléimidocaproyl

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EVQLVQSGAE	VKKPGSSVKV	SCKASGYTFT	TYWMHWVRQA
IDPSDSYSNY	NQKFKDRATL	TVDKSTSTAY	MELSSLRSED
GLGPAWFSYW	GQGTLVTVSS	ASTKGPSVFP	LAPSSKSTSG
DYFPEPVTVS	WNSGALTSGV	HTFPAVLQSS	GLYSLSSVVT
YICNVNHKPS	NTKVDKVEP	KSCDKTHTCP	PCPAPELLGG
KDTLMISRTP	EVTCCVVDVS	HEDPEVKFNW	YVDGVEVHNA
STYRVVSVLT	VLHQDWLNGK	EYKCKVSNKA	LPAPIEKTIS
VTTLPPSREE	MTKNQVSLTC	LVKGFYPSDI	AVEWESNGQP
LDSGGSFFLY	SKLTVDKSRW	QQGNVFCSCV	MHEALHNHYT
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DIQMTQSPSS	VSAASVGDRTV	ITCKASQYVG	TAVAWYQQKP
ASNRYTGVPS	RFSDSGSGTD	FTLTISLSQP	EDFATYFCQQ
GTKVEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNIFY
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYSLSSTLT	LSKADYEKHK
LSSPVTKSFN	RGEC		

Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22"-96"	147"-203"	264"-324"
	22"-96"	147"-203"	264"-324"
Intra-L (C23-C104)	23"-88"	134"-194"	
	23"-88"	134"-194"	
Inter-H-L (h 5-CL 126)	223"-214"	223"-214"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	229"-229"	232"-232"	
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación			
H CH2 N84,4:			
300, 300"			
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.			

Modified residues / résidus modifiés / restos modificados



roluperidonum
roluperidone

2-({1-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]piperidin-4-yl)methyl}-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-1-one


rolupéridone

2-({1-[2-(4-fluorophényl)-2-oxoéthyl]pipéridin-4-yl)méthyl}-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-1-one

roluperidona

2-({1-[2-(4-fluorofenil)-2-oxoetil]piperidin-4-il}metil)-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-1-ona

C₂₂H₂₃FN₂O₂



rovafovirum etalafenamidum
rovafovir etalafenamide


ethyl (2*S*)-2-({[(*S*)-({[(2*R*,5*R*)-5-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)-4-fluoro-2,5-dihydrofuran-2-yl]oxy)methyl]phenoxyphosphonyl}amino)propanoate

rovafovir étalafénamide

(2*S*)-2-[[[(*S*)-{[(2*R*,5*R*)-5-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)-4-fluoro-2,5-dihydrofuran-2-yl]oxy)méthyl]phénoxyphosphonoyl]amino]propanoate d'éthyle

rovafovir etalafenamida

(2*S*)-2-[[[(*S*)-{[(2*R*,5*R*)-5-(6-amino-9*H*-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-dihidrofuran-2-il]oxi]metil]fenoxifosfonoil]amino]propanoato de etilo

C₂₁H₂₄FN₆O₆P**ruxotemitidum**

ruxotemitide


L-lysyl-L-lysyl-L-tryptophyl-L-tryptophyl-L-lysyl-L-lysyl-L-tryptophyl-β-phenyl-L-phenylalanyl-L-lysineamide

ruxotémítide

L-lysyl-L-lysyl-L-tryptophyl-L-tryptophyl-L-lysyl-L-lysyl-L-tryptophyl-β-phényl-L-phénylalanil-L-lysineamide

ruxotemitida

L-lisil-L-lisil-L-triptopfil-L-triptopfil-L-lisil-L-lisil-L-triptopfil-β-fenil-L-fenilalanil-L-lisineamida

C₇₈H₁₀₆N₁₈O₉**selatogrelum**

selatogrel



[(2*R*)-3-[4-(butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-2-{6-[(3*S*)-3-methoxypyrrolidin-1-yl]-2-phenylpyrimidine-4-carboxamido}-3-oxopropyl]phosphonic acid

sélatogrel

acide [(2*R*)-3-[4-(butoxycarbonyl)pipérazin-1-yl]-2-{6-[(3*S*)-3-méthoxypyrrolidin-1-yl]-2-phénylpyrimidine-4-carboxamido}-3-oxopropyl]phosphonique

selatogrel

ácido [(2*R*)-3-[4-(butoxicarbonil)piperazin-1-il]-2-{6-[(3*S*)-3-metoxipirrolidin-1-il]-2-fenilpirimidina-4-carboxamida}-3-oxopropil]fosfónico



sintilimabum #
sintilimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
gamma4 heavy chain (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (93.9%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), hinge S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)), (134-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-12*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide

sintilimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma4 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (93.9%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), charnière S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)), (134-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-12*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (226-226":229-229")-bisdisulfure

sintilimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma4 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (93.9%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), bisagra S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)), (134-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-12*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (226-226":229-229")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLVQSGAE YKKPGSSVKY CKASGGTFS SYAISWVRQA PQGLEWMGL 50
IIMFDTAGY AQKFQGRVAI TVDESTSTAY MELSSLRSD TAVYYCARAE 100
HSSGTGTFDYW GQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK 150
DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTTK 200
YTCNVDPKPS NTKVDKRVES KYGPPCPFCP APEFLGGPSV FLFPFKPKDT 250
LMISRTEFTV CVVVDVSGED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY 300
RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTIKAK GQPREPQVYT 350
LPFSQSEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS 400
DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVEFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSLGK 447

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIQMTQSPSS VSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQK GKAPKLLISA 50
ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQ ANHLPTFTFG 100
GTKVELIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQMKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGECC 214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22°-96° 147°-203° 261°-321° 367°-425°
22°-96° 147°-203° 261°-321° 367°-425°
Intra-L (C23-C104) 23°-88° 134°-194°
23°-88° 134°-194°
Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 134°-214° 134°-214°
Inter-H-H (h 8, h 11) 226°-226° 229°-229°

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 297, 297°
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados
N-terminal glutamine cyclization to pyroglutamate (pE, 5-oxoproline)
HVHQ1:1, 1°
C-terminal lysine clipping
H CHS K2: 447, 447°

siremadlinum
siremadlin



(6*S*)-5-(5-chloro-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)-6-(4-chlorophenyl)-2-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)-1-(propan-2-yl)-5,6-dihydropyrrolo[3,4-*d*]imidazol-4(1*H*)-one

sirémadline

(6*S*)-5-(5-chloro-1-méthyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)-6-(4-chlorophényl)-2-(2,4-diméthoxypyrimidin-5-yl)-1-(propan-2-yl)-5,6-dihydropyrrolo[3,4-*d*]imidazol-4(1*H*)-one

siremadlina

(6*S*)-5-(5-cloro-1-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(4-clorofenil)-2-(2,4-dimetoxipirimidin-5-il)-1-(propan-2-il)-5,6-dihidropirrolo[3,4-*d*]imidazol-4(1*H*)-ona



soticlestatum
soticlestat



(4-benzyl-4-hydroxypiperidin-1-yl)([2,4'-bipyridin]-3-yl)methanone

soticlestat

(4-benzyl-4-hydroxypipéridin-1-yl)([2,4'-bipiridin]-3-yl)méthanone

soticlestat

(4-bencil-4-hidroxipiperidin-1-il)([2,4'-bipiridin]-3-il)metanona



spesolimabum #
spesolimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL1RL2 (interleukin 1 receptor like 2, interleukin 36 receptor, IL1R-rp2, IL1RRP2)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain humanized (1-449) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-2*02 (81.20%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), hinge (218-232), CH2 L1.3>A (236), L1.2>A (237) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-215')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV3-20*01 (79.2%)-*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [7.3.9] (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192)(109'-215')]; dimer (228-228":231-231")-bisdisulfide

spesolimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL1RL2 (récepteur like 2 de l'interleukine 1, récepteur de l'interleukine 36, IL1R-rp2, IL1RRP2), anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 humanisée (1-449) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-2*02 (81.20%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), charnière (218-232), CH2 L1.3>A (236), L1.2>A (237) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV3-20*01 (79.2%)-*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [7.3.9] (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192)(109'-215')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure

espesolimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL1RL2 (receptor like 2 de la interleukina 1, receptor de la interleukina 36, IL1R-rp2, IL1RRP2), anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 humanizada (1-449) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-2*02 (81.20%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), bisagra (218-232), CH2 L1.3>A (236), L1.2>A (237) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV3-20*01 (79.2%)-*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [7.3.9] (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192)(109'-215')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada					
QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCKASGYSFT	SSIWHVWKQA	PGQGLEWMGE	50
INPGNVRTNY	NENFRNKVTM	TVDTISISTAY	MELSRRLRSSD	TAVYYCTVVF	100
YGEPYFPYWG	QGTLLVTSSA	STKGPSVFPL	APSSKSTSGG	TAALGCLVKD	150
YFPEPVTYSW	NSGALTSGVH	TFPAVLQSSG	LYSLSSVVTV	PSSSLGTQTY	200
ICNVNHKPSN	TKVDKRVPEK	SCDKTHTCPP	CPAPEAAGGP	SVFLPPKPKP	250
DTLMISRTP	ETCIVVDVSH	EDPEVKFNWY	VDGVEVHNAK	TKPREEQYNS	300
TYRVSVLTV	LHQDWLNGKE	YKCKVSNKAL	PAPIEKTISK	AKGQPREPQV	350
YTLPPSREEM	TKNQVSLTCL	VKGFYPSDIA	WEWESNGQPE	NNYKTTTPVL	400
DSDGSEFLYS	KLTVDKSRWQ	QGNVFSQSV	HEALHNHYTQ	KSLSLSPGK	449
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera					
QIVLTQSPGT	LSSLSPGERAT	MTCTASSSVS	SSYFHWYQQK	PGQAPRLRWI	50
RTSRLASGVP	DRFSGSGSGT	DFTLTISRLE	PEDAATYYCH	QFHRSPFTFG	100
AGTKLEIKRT	VAAPSVFIFP	PSDEQLKSGT	ASVVCLLNMF	YPREAKVQWK	150
VDNALQSGNS	QESVTEQDSK	DSTYLSSTLT	TLSKADYEKH	KVYACEVTHQ	200
GLSSPVTKSF	NRGEC				215
Post-translational modifications					
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro					
Intra-H (C23-C104)	22-96	146-202	263-323	369-427	
	22"-96"	146"-202"	263"-323"	369"-427"	
Intra-L (C23-C104)	23'-89'	135'-195'			
	23'''-89'''	135'''-195'''			
Inter-H-L (h 5-CL 126)	222-215'	222"-215"			
Inter-H-H (h 11, h 14)	228-228"	231-231"			
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación					
H CH2 N84.4:					
299, 299"					
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados					

tabituximabum #
tabituximab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (frizzled class receptor 10, frizzled family receptor 10, Frizzled-10, CD350)], chimeric monoclonal antibody; gamma1 heavy chain chimeric (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfide with kappa light chain chimeric (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (227-227":230-230")-bisdisulfide

tabituximab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (récepteur 10 de la classe frizzled, récepteur 10 de la famille frizzled, Frizzled-10, CD350)], anticorps monoclonal chimérique; chaîne lourde gamma1 chimérique (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), charnière (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa chimérique (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure

tabituximab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (receptor 10 de la clase frizzled, receptor 10 de la familia frizzled-10, CD350)], anticuerpo monoclonal quimérico;
cadena pesada gamma1 quimérica (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), bisagra (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa quimérica (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro

Heavy chain / chaîne lourde / cadena pesada

```
EVQLQQSGAE LVKPGASVKL SCTASGFNIN DTYMHVWKQR PEQGLEWIGR 50
IDPANGNTKY DPKFQGKATI TADTSSNTAY LQLSSLTSED TAVYYCARGA 100
RGSRFAYWGQ GTLVTVSAAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY 150
FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI 200
CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHCTPCP PAPELLGGPS VFLFPPKPKD 250
TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGEVHNAKT KPREEQYNST 300
YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPVY 350
TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD 400
SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNNHYQK SLSLSPGK 448
```

Light chain / chaîne légère / cadena ligera

```
DIQMTQSPAS LSVSVGETVT ITCRASENIY SNLAWYQQKQ GKSPQLLYVY 50
ATNLADGVPS RFSGSGSGTQ YSLKINSLSQ EDFGSYYCQH FWGTPYTFGG 100
GTLKEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWVKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSLT LSKADYEHKK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214
```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / positions des ponts disulfure / posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 145-201 262-322 368-426
22"-96" 145"-201" 262"-322" 368"-426"

Intra-L (C23-C104) 23-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 221-214" 221"-214"

Inter-H-H (h 11, h 14) 227-227" 230-230"

N-glycosylation sites / sites de N-glycosylation / posiciones de N-glicosilación

H VH N35:

30, 30"

H CH2 N84.4:

298, 298"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans/ glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

tabituximabum barzuxetanum #
tabituximab barzuxetan

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (frizzled class receptor 10, frizzled family receptor 10, Frizzled-10, CD350)], chimeric monoclonal antibody conjugated to *barzuxetan*, a DPTA chelator derivative; gamma1 heavy chain chimeric (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfide with kappa light chain chimeric (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (227-227":230-230")-bisdisulfide; conjugated, on an average of 2 to 4 lysyl, to *barzuxetan*, *p*-SCN-Bn-CHX-A"-DPTA, a DPTA chelator derivative

For the *barzuxetan* part, please refer to the annex « *Names for radicals and groups* ».

tabituximab barzuxétan

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (récepteur 10 de la classe frizzled, récepteur 10 de la famille frizzled, Frizzled-10, CD350)], anticorps monoclonal chimérique conjugué au *barzuxétan*, un dérivé du chélateur DPTA; chaîne lourde gamma1 chimérique (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) - *Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), charnière (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa chimérique (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - *Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure; conjugué, sur une moyenne de 2 à 4 lysyl, au *barzuxétan*, p-SCN-Bn-CHX-A"-DPTA, un dérivé du chélateur DPTA
Pour la partie *barzuxétan*, veuillez-vous référer à l'annexe « Noms pour radicaux et groupes».

tabituximab barzuxetán

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (receptor 10 de la clase frizzled, receptor 10 de la familia frizzled, Frizzled-10, CD350)], anticuerpo monoclonal quimérico conjugado al *barzuxetán*, un derivado del DPTA; cadena pesada gamma1 quimérica (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) - *Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), bisagra (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa quimérica (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - *Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro; conjugado, en 2 - 4 restos lisil, por término medio, al *barzuxetán*, p-SCN-Bn-CHX-A"-DPTA, un derivado de un agente quelante DPTA
Por la parte *barzuxetán*, por favor vaya al anexo « Denominaciones para Radicales y Grupos».

Heavy chain / chaîne lourde / cadena pesada
EVQLQQSGAE LVKPGASVKL SCTASGFNIN DTYMHVWQQR PEQGLEWIGR 50
IDPANGNTKY DPKFQKGKATI TADTSSNTAY LQLSSLTSED TAVYYCARGA 100
RGRSFAYWQQ GTLVTVSAAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY 150
FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI 200
CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAFELLGGPS VLFPPRPKPD 250
TLMISRTPEV TCVVVDVSHS DPEYFENWYV DGVFHNHAKT KPREEQINST 300
YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIETKISKA KGQPREPQVY 350
TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTFPVLD 400
SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK 448

Light chain / chaîne légère / cadena ligera
DIQMTQSPAS LSVSVGETVT ITCRASENIY SNLAWYQQKQ GKSPQLLVYV 50
ATNLADGVPS RFSGSGSGTQ YSLKINSLSQS EDFGSYYCQH FWGTPYTFGG 100
GTKLEIKRTV AAFSVFIAPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWV 150
DNALQSGKQK ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VIACEVTHGQ 200
LSSPVTKSFN RGEQ 214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / positions des ponts disulfure / posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 145-201 262-322 368-426
22"-96" 145"-201" 262"-322" 368"-426"
Intra-L (C23-C104) 23-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 221-214" 221"-214"
Inter-H-H (h 11, h 14) 227-227" 230-230"
conjugated, on an average of 2 to 4 lysyl, to *barzuxetán* / conjugué, sur une moyenne de 2 à 4 lysyl, au *barzuxétan* / conjugado en 2 - 4 restos lisil, por término medio, al *barzuxetán*
N-glycosylation sites / sites de N-glycosylation / posiciones de N-glicosilación
H VH N35:
30, 30"
H CH2 N84.4:
298, 298"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

tafasitamabum #

tafasitamab

immunoglobulin G1-G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (B lymphocyte surface antigen B4, Leu-12)], monoclonal antibody;
 gamma1-gamma2 heavy chain (1-451) [VH (*Mus musculus*IGHV1-14*01 (77.6%)/*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (73.5%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens*IGHG1*01 (CH1 G1m17, K120 (218) (122-219) -hinge (220-234) -CH2 1.6-1.1 (235-240)) (122-240) -*Homo sapiens*IGHG2*01 (CH2 1-125, S3>D (243), G2m.. V45.1 (286), G110>A (331), I117>E (336) (241-344) -CH3 nG1m1 E12 (360) M14 (362) (345-449) -CHS (450-451)) (241-451)], (224-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV2-137*01 (75.0%)/*Homo sapiens*IGHV3D-11*03 (73.7%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide

tafasitamab

immunoglobuline G1-G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (antigène de surface B4 des lymphocytes B, Leu-12)], anticorps monoclonal;
 chaîne lourde gamma1-gamma2 (1-451) [VH (*Mus musculus*IGHV1-14*01 (77.6%)/*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (73.5%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens*IGHG1*01 (CH1 G1m17, K120 (218) (122-219) -charnière (220-234) -CH2 1.6-1.1 (235-240)) (122-240) -*Homo sapiens*IGHG2*01 (CH2 1-125, S3>D (243), G2m.. V45.1 (286), G110>A (331), I117>E (336) (241-344) -CH3 nG1m1 E12 (360) M14 (362) (345-449) -CHS (450-451)) (241-451)], (224-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV2-137*01 (75.0%)/*Homo sapiens*IGHV3D-11*03 (73.7%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure

tafasitamab

inmunoglobulina G1-G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (antígeno de superficie B4 de los linfocitos B, Leu-12)], anticuerpo monoclonal;
 cadena pesada gamma1-gamma2 (1-451) [VH (*Mus musculus*IGHV1-14*01 (77.6%)/*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (73.5%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens*IGHG1*01 (CH1 G1m17, K120 (218) (122-219) -bisagra(220-234) -CH2 1.6-1.1 (235-240)) (122-240) -*Homo sapiens*IGHG2*01 (CH2 1-125, S3>D (243), G2m.. V45.1 (286), G110>A (331), I117>E (336) (241-344) -CH3 nG1m1 E12 (360) M14 (362) (345-449) -CHS (450-451)) (241-451)], (224-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV2-137*01 (75.0%)/*Homo sapiens*IGHV3D-11*03 (73.7%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada	
EVQLVESGGG LVKPGGSLKL SCAASGYTFT SYVMHWVRQA PGKGLEWIGY	50
INPYNDGTKY NEKFQGRVTII SSDKSISTAY MELSSLRSED TAMYVCARGT	100
YYYGTRVFDY WQGQTLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV	150
KDYFPEPVTY SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ	200
TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPDVFLFPPK	250
PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF	300
NSTFRVSVSL TVVHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPEEKTI SKTKGPQREP	350
QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFPYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP	400
MLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG	450
K	451
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera	
DIVMTQSPAT LSLSPGERAT LSCRSSKSLQ NVNGNTYLYW FQKPGQSPQ	50
LLIYRMSNLN SGVPDRFSGS GSGTEFTLTI SSLEPEDFAV YYCMQHLEYP	100
ITFGAGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVCL LNNFYPREAK	150
VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTYSL SSTLTLSKAD YEKKHVKYACE	200
VTHQGLSSPV TKSFNRGEC	219
Post-translational modifications	
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro	
Intra-H (C23-C104)	22-96 148-204 265-325 371-429
	22"-96" 148"-204" 265"-325" 371"-429"
Intra-L (C23-C104)	23"-93" 139"-199"
	23"-93" 139"-199"
Inter-H-L (h 5-CL 126)	224-219' 224"-219"
Inter-H-H (h 11, h 14)	230-230" 233-233"
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación	
H CH2 N84.4: 301, 301"	
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires	
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados.	
C-terminal lysine clipping:	
H CHS K2: 451, 451"	

taniborbactamum
taniborbactam



(3*R*)-3-(2-{*trans*-4-[(2-aminoethyl)amino]cyclohexyl)acetamido)-2-hydroxy-3,4-dihydro-2*H*-1,2-benzoxaborinine-8-carboxylic acid

taniborbactam

acide (3*R*)-3-(2-{*trans*-4-[(2-aminoéthyl)amino]cyclohexyl)acétamido)-2-hydroxy-3,4-dihydro-2*H*-1,2-benzoxaborinine-8-carboxylique

taniborbactam

ácido (3*R*)-3-(2-{*trans*-4-[(2-aminoetil)amino]ciclohexil)acetamido)-2-hidroxi-3,4-dihidro-2*H*-1,2-benzoxaborinina-8-carboxílico




tavapadonum
tavapadon

(-)-(6*E*)-1,5-dimethyl-6-(2-methyl-4-[[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy]phenyl)pyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione

tavapadon

(-)-(6*E*)-1,5-diméthyl-6-(2-méthyl-4-[[3-(trifluorométhyl)pyridin-2-yl]oxy]phényl)pyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione

tavapadón

(-)-(6*E*)-1,5-dimetil-6-(2-metil-4-[[3-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi]fenil)pirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona $C_{19}H_{16}F_3N_3O_3$ 

telaglenastatum


telaglenastat

N-[6-(4-{5-[2-(pyridin-2-yl)acetamido]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}butyl)pyridazin-3-yl]-2-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide

télaglénastat

N-[6-(4-{5-[2-(pyridin-2-yl)acétamido]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}butyl)pyridazin-3-yl]-2-[3-(trifluorométhoxy)phényl]acetamide

telaglenastat

N-[6-(4-{5-[2-(piridin-2-il)acetamido]-1,3,4-tiadiazol-2-il}butil)piridazin-3-il]-2-[3-(trifluorometoxi)fenil]acetamida $C_{26}H_{24}F_3N_7O_3S$ 

temelimabum #

temelimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* endogenous retrovirus (HERV) family W multiple sclerosis-associated retrovirus (MRSV) envelope protein], humanized monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-443) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (81.2%) - (IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.9] (1-116) - *Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (117-214), hinge S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-213')-disulfide with kappa light chain (1'-213') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (81.9%) - IGKJ4*01 (100%)) [5.3.9] (1'-106') - *Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (152), V101 (190) (107'-213')]; dimer (222-222":225-225")-bisdisulfide

témélimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[protéine d'enveloppe du rétrovirus associé à la sclérose en plaques (MRSV) de la famille W des rétrovirus endogènes (HERV) d'*Homo sapiens*], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma4 (1-443) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (81.2%) - (IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.9] (1-116) - *Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (117-214), charnière S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-213')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-213') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (81.9%) - IGKJ4*01 (100%)) [5.3.9] (1'-106') - *Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (152), V101 (190) (107'-213')]; dimère (222-222":225-225")-bisdisulfure

temelimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[proteína de la envoltura del retrovirus asociado a la esclerosis en placas (MRSV) de la familia W de los retrovirus endógenos (HERV) d' *Homo sapiens*], anticuerpo monoclonal humanizado;
cadena pesada gamma4 (1-443) [VH humanizado (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (81.2%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.9] (1-116) - *Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (117-214), bisagra S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-213')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-213') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens*IGKV1-39*01 (81.9%) -IGKJ4*01 (100%)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (152), V101 (190) (107'-213')]; dímero (222-222":225-225")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT DYEMHWVRQA PGQGLEWIGA 50
VAPETGGTAY NQKFKGRATI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCTSTV 100
VPFAYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP 150
EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVTPSS SLGKTKYTCN 200
VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS 250
RTPPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNMWVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS 300
VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS 350
QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF 400
FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSMVHEALHN HYTKQSLSLG LSK 443

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
QIQLTQSPSS LSASVGDRTV ITCSASSSVS YMYWYQQKPG KAPKAWIYRT 50
SNLASGVPSR FSGSGSGTDY TLTISSLQPE DFATYYCQY QSLPLTFGGG 100
TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNFFYP REAKVQWKVD 150
NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSTLT SKADYEKHKV YACEVTHQGL 200
SSPVTKSFNR GEC 213

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 143-199 257-317 363-421
22"-96" 143"-199" 257"-317" 363"-421"
Intra-L (C23-C104) 23'-87' 133'-193'
23'''-87''' 133'''-193'''
Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 130-213' 130"-213"
Inter-H-H (h 8, h 11) 222-222" 225-225"
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84,4:
293, 293"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaricos complejos fucosilados

teserpaturevum #
teserpaturev

A conditionally-replicating oncolytic Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) strain F that has genetically engineered deletions within both copies of the γ 34.5 gene and within the α 47 gene, and further modified by insertion of an expressible beta-galactosidase (LacZ) gene in the ICP6 locus.

téserpaturev

souche F du virus Herpes simplex type 1 (HSV-1), oncolytique, dont la réplication est conditionnée, avec délétions par génie génétique dans les deux copies du gène γ 34.5 et dans le gène α 47 et avec des modifications par insertion du gène exprimable de la bêta-galactosidase (LacZ) dans le locus ICP6

teserpaturev

Un virus Herpes simplex de tipo 1 (VHS-1) de la cepa F oncolítico, con replicación condicionada, que tiene delecciones introducidas por ingeniería genética en ambas copias del gen γ 34.5 y en el gen α 47, y con modificaciones adicionales mediante inserción de un gén expresable de beta-galactosidasa (LacZ) en el locus ICP6.

tildacerfontum


tildacerfont

3-[4-chloro-2-(morpholin-4-yl)-1,3-thiazol-5-yl]-2,5-dimethyl-7-(pentan-3-yl)pyrazolo[1,5-*a*]pyrimidine

tildacerfont

3-[4-chloro-2-(morpholin-4-yl)-1,3-thiazol-5-yl]-2,5-diméthyl-7-(pentan-3-yl)pyrazolo[1,5-*a*]pyrimidine

tildacerfont

3-[4-cloro-2-(morfolin-4-il)-1,3-tiazol-5-il]-2,5-dimetil-7-(pentan-3-il)pirazolo[1,5-*a*]pirimidina $C_{20}H_{26}ClN_5OS$ **tirbanibulinum**


tirbanibulin

N-benzyl-2-(5-{4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}pyridin-2-yl)acetamide

tirbanibuline

N-benzyl-2-(5-{4-[2-(morpholin-4-yl)éthoxy]phényl}pyridin-2-yl)acetamide

tirbanibulina

N-bencil-2-(5-{4-[2-(morfolin-4-il)etoxi]fenil}piridin-2-il)acetamida $C_{26}H_{29}N_3O_3$ **tirzepatidum**

tirzepatide

L-tyrosyl-2-methylalanyl-L- α -glutamylglycyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L- α -aspartyl-L-tyrosyl-L-seryl-L-isoleucyl-2-methylalanyl-L-leucyl-L- α -aspartyl-L-lysyl-L-isoleucyl-L-alanyl-L-glutaminy-L-*N*⁶-[(2*S*)-22,42-dicarboxy-10,19,24-trioxo-3,6,12,15-tetraoxa-9,18,23-triazadotetracontan-1-oyl]-L-lysyl-L-alanyl-L-phenylalanyl-L-valyl-L-glutaminy-L-tryptophyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-alanylglycylglycyl-L-prolyl-L-seryl-L-serylglycyl-L-alanyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-L-serinamide

tirzépatide

L-tyrosyl-2-méthylalanyl-L- α -glutamylglycyl-L-thréonyl-L-phénylalanyl-L-thréonyl-L-séryl-L- α -aspartyl-L-tyrosyl-L-séryl-L-isoleucyl-2-méthylalanyl-L-leucyl-L- α -aspartyl-L-lysyl-L-isoleucyl-L-alanyl-L-glutaminy-L-*N*⁶-[(2*S*)-22,42-dicarboxy-10,19,24-trioxo-3,6,12,15-tétraoxa-9,18,23-triazadotétracontan-1-oyl]-L-lysyl-L-alanyl-L-phénylalanyl-L-valyl-L-glutaminy-L-tryptophyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-alanylglycylglycyl-L-prolyl-L-séryl-L-sérylglycyl-L-alanyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-L-sérinamide

tirzepatida


L-tirosil-2-metilalanil-L- α -glutamilglicil-L-treonil-L-fenilalanil-L-treonil-L-seril-L- α -aspartil-L-tirosil-L-seril-L-isoleucil-2-metilalanil-L-leucil-L- α -aspartil-L-lisil-L-isoleucil-L-alanil-L-glutaminil-*N*⁶-[(22*S*)-22,42-dicarboxi-10,19,24-trioxa-3,6,12,15-tetraoxa-9,18,23-triazadotetracontan-1-oil]-L-lisil-L-alanil-L-fenilalanil-L-valil-L-glutaminil-L-triptofil-L-leucil-L-isoleucil-L-alanilglicilglicil-L-prolil-L-seril-L-serilglicil-L-alanil-L-prolil-L-prolil-L-prolil-L-serinamida




Sequence / Séquence / Secuencia

YXEGTFTSDY SI^XLDKIAQK AFVQWLIAGG PSSGAPPPS 39

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



K (20) *N*⁶-{*N*-(hydrogen icosanedioyl)- γ -Glu-bis[iminobis(ethylenoxy)acetyl]}-Lysine



tofersenum

tofersen

all-P-ambo-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)adenylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)guanylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)guanylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine

tofersen

tout-P-ambo-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)adénylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)guanylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-5-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)guanylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyluridine

tofersén

todo-P-ambo-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)adenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)guanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)guanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metiluridina

C₂₃₀H₃₁₇N₇₂O₁₂₃P₁₉S₁₅

(3'→5')-mC=A-G-A=dT=dA=dmC=dA=dT=dT=dmC=dT=dA=mC-A=G-mC=mU

Legend :

X : 2'-O-(2-methoxyethyl)

dX : 2'-deoxy

mX : 5-methyl



toripalimabum #

toripalimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], monoclonal antibody;
gamma4 heavy chain (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (80.6%) -(IGHD)-IGHJ3*01 (92.9%)) [8.8.18] (1-125) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (126-223), hinge S10>P (233) (224-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (126-452)], (139-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV1-117*01 (93.0%)/*Homo sapiens* IGKV2-30*02 (88.0%) -*Homo sapiens* IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (231-231":234-234")-bisdisulfide

toripalimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma4 (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (80.6%) -(IGHD)-IGHJ3*01 (92.9%)) [8.8.18] (1-125) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (126-223), charnière S10>P (233) (224-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (126-452)], (139-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV1-117*01 (93.0%)/*Homo sapiens* IGKV2-30*02 (88.0%) -*Homo sapiens* IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (231-231":234-234")-bisdisulfure

toripalimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], anticuerpo monoclonal;

cadena pesada gamma4 (1-452) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (80.6%) -(IGHD)-IGHJ3*01 (92.9%)) [8.8.18] (1-125) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (126-223), bisagra S10>P (233) (224-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CH5 (451-452)) (126-452)], (139-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (93.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-30*02 (88.0%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (231-231":234-234")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QGQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYEMHWVRQA PIHGLEWIGV 50
IESEETGGTAY NQKFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCAREG 100
ITTVATTYYW YFDVWGQGTI VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL 150
GCLVKDYFPE PVTVMNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS 200
LGKTKYTCNV DHKPSNTKVD KRVEKSYGPP CPPCPAPEFL GGPVFLFPP 250
KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ 300
FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE 350
PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP 400
PVLDSGDSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTKSLSLSL 450
GK 452

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DVVMTQSPSL LPVTLGQPAS ISCRSSQSIV HSNNGTYLEW YLQKPGQSPQ 50
LLIYKVSNRG SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDGVV YYCFQGSHPV 100
LTFGQGTGLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVCL LNNFYPREAK 150
VQWVKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSITYSL SSTLTLSKAD YEKHVYACE 200
VTHQGLSSPV TKSFNRGEC 219

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 152-208 266-326 372-430
22"-96" 152"-208" 266"-326" 372"-430"

Intra-L (C23-C104) 23'-93' 139'-199'
23'"-93'" 139'"-199'"

Inter-H-L (CH1 10-CL126) 139-219' 139"-219"

Inter-H-H (h 8, h 11) 231-231" 234-234"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

302, 302"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaríos complejos fucosilados

umibecestatum

umibecestat


N-{6-[(3*R*,6*R*)-5-amino-3,6-dimethyl-6-(trifluoromethyl)-3,6-dihydro-2*H*-1,4-oxazin-3-yl]-5-fluoropyridin-2-yl}-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide

umibécestat

N-{6-[(3*R*,6*R*)-5-amino-3,6-diméthyl-6-(trifluorométhyl)-3,6-dihydro-2*H*-1,4-oxazin-3-yl]-5-fluoropyridin-2-yl}-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxamide

umibecestat

N-{6-[(3*R*,6*R*)-5-amino-3,6-dimetil-6-(trifluorometil)-3,6-dihidro-2*H*-1,4-oxazin-3-il]-5-fluoropiridin-2-il}-3-cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida


C₁₉H₁₅ClF₇N₅O₂

vafidemstatum

vafidemstat (4¹*R*,4²*S*)-6-oxa-3-aza-1(2)-[1,3,4]oxadiazola-5(1,4),8(1)-dibenzena-4(1,2)-cyclopropanaoctaphan-1⁵-amine

vafidemstat (4¹*R*,4²*S*)-6-oxa-3-aza-1(2)-[1,3,4]oxadiazola-5(1,4),8(1)-dibenzéna-4(1,2)-cyclopropanaoctaphan-1⁵-amine


vafidemstat (4¹*R*,4²*S*)-6-oxa-3-aza-1(2)-[1,3,4]oxadiazola-5(1,4),8(1)-dibencena-4(1,2)-ciclopropanaoctafan-1⁵-amina

**valecobulinum**

valecobulin (2*S*)-2-amino-3-methyl-*N*-{4-[3-(1-*H*-1,2,4-triazol-1-yl)-4-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)phenyl]-1,3-thiazol-2-yl}butanamide

valécobuline (2*S*)-2-amino-3-méthyl-*N*-{4-[3-(1-*H*-1,2,4-triazol-1-yl)-4-(3,4,5-triméthoxybenzoyl)phényl]-1,3-thiazol-2-yl}butanamide

valecobulina (2*S*)-2-amino-3-metil-*N*-{4-[3-(1-*H*-1,2,4-triazol-1-il)-4-(3,4,5-trimetoxibenzoil)fenil]-1,3-tiazol-2-il}butanamide

**vutrisiranum**

vutrisiran {[(2*S*,4*R*)-1-{1-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis-[(3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl]-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oyl)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl)methyl hydrogen *all-P-ambo*-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenilyl-(3'→5')-2'-*O*-methyluridylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyluridylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyluridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenilyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenilyl-(3'→5')-2'-*O*-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenilyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenilyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-3'-adenylate duplex


with *all-P-ambo*-2'-*O*-methyl-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyladenylyl-(5'→3')-2'-*O*-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyluridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyladenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(5'→3')-2'-*O*-methylguanylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyluridylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyladenylyl-(5'→3')-2'-*O*-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyluridylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyluridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroguanilyl-(5'→3')-2'-*O*-methylguanylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyluridylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoro-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyluridine

vutrisiran

hydrogéno-*tout-P-ambo*-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-*O*-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluorocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-3'-adénylate de {(2*S*,4*R*)-1-{[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis-[(3-{[(3-{5-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido)propyl]amino]-3-oxopropoxy)méthyle]-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oyl}-4-hydroxypyrrolidin-2-yl)méthyle duplex avec *tout-P-ambo*-2'-*O*-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyladenylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyladenylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyladenylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyl-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoro-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-méthyluridine


vutrisirán

hidrógeno-*todo-P-ambo*-2'-*O*-metil-*P*-tiouridilil-(3'→5')-2'-*O*-metil-*P*-tioguanilil-(3'→5')-2'-*O*-metilguanilil-(3'→5')-2'-*O*-metilguanilil-(3'→5')-2'-*O*-metiladenilil-(3'→5')-2'-*O*-metiluridilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(3'→5')-2'-*O*-metiluridilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(3'→5')-2'-*O*-metilguanilil-(3'→5')-2'-*O*-metiluridilil-(3'→5')-2'-*O*-metiladenilil-(3'→5')-2'-*O*-metiladenilil-(3'→5')-2'-*O*-metilcitidilil-(3'→5')-2'-*O*-metilcitidilil-(3'→5')-2'-*O*-metiladenilil-(3'→5')-2'-*O*-metilguanilil-(3'→5')-2'-*O*-metil-3'-adenilato de {(2*S*,4*R*)-1-{[(2-acétamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]-16,16-bis-[(3-{[(3-{5-[(2-acétamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]pentanamido)propil]amino]-3-oxopropoxi}metil)-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oyl]-4-hidroxi-pirrolidin-2-il}metilo duplex con *todo-P-ambo*-2'-*O*-metil-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-2'-*O*-metil-*P*-tiouridilil-(5'→3')-2'-*O*-metiladenilil-(5'→3')-2'-*O*-metilcitidilil-(5'→3')-2'-*O*-metilcitidilil-(5'→3')-2'-*O*-metilcitidilil-(5'→3')-2'-*O*-metiluridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-(5'→3')-2'-*O*-metilguanilil-(5'→3')-2'-*O*-metiluridilil-(5'→3')-2'-*O*-metiladenilil-(5'→3')-2'-*O*-metilcitidilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-(5'→3')-2'-*O*-metiluridilil-(5'→3')-2'-*O*-metiluridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoroguanilil-(5'→3')-2'-*O*-metilguanilil-(5'→3')-2'-*O*-metiluridilil-(5'→3')-2'-*O*-metil-*P*-tiouridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoro-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-2'-*O*-metiluridina



X : 2'-deoxy-2'-fluoro-X / **X** : 2'-désoxy-2'-fluoro-X

X : 2'-O-methyl-X / X : 2'-O-méthyl-X



zampilimabum #
zampilimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* TGM2 (transglutaminase 2, transglutaminase-2 (TG2), protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase C polypeptide; TGC)], humanized and chimeric monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-441) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV3-23*03 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.7] (1-114) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (115-212), hinge S10>P (222) (213-224), CH2 (225-334), CH3 (335-439), CHS (440-441)) (115-441)], (128-214')-disulfide with kappa light chain chimeric (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV14-111*01 (82.1%)/*Homo sapiens*IGKV1-16*01 (78.9%) -*Homo sapiens*IGKJ1*01 (91.7%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (220-220":223-223")-bisdissulfide

zampilimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* TGM2 (transglutaminase 2, transglutaminase-2, TG2, protéine-glutamine-gamma-glutamyltransférase polypeptide C, TGC)], anticorps monoclonal humanisé et chimérique; chaîne lourde gamma4 (1-441) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV3-23*03 (89.8%) -IGHD) -IGHJ4*01 (100%)] [8.8.7] (1-114) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (115-212), charnière S10>P (222) (213-224), CH2 (225-334), CH3 (335-439), CHS (440-441)) (115-441)], (128-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa chimérique (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV14-111*01 (82.1%)/*Homo sapiens*IGKV1-16*01 (78.9%) -*Homo sapiens*IGKJ1*01 (91.7%)] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (220-220''-223-223'')-bisdisulfure

zampilimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* TGM2 (transglutaminasa 2, transglutaminasa-2, TG2, proteína-glutamina-gamma-glutamiltransferasa polipéptido C, TGC)], anticuerpo monoclonal humanizado y quimérico;

cadena pesada gamma4 (1-441) [VH humanizado (*Homo sapiens*IGHV3-23*03 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.7] (1-114) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (115-212), bisagra S10>P (222) (213-224), CH2 (225-334), CH3 (335-439), CH5 (440-441)) (115-441)], (128-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa quimérica (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV14-111*01 (82.1%)/*Homo sapiens*IGKV1-16*01 (78.9%) -*Homo sapiens*IGKJ1*01 (91.7%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (220-220":223-223")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTLS THAMSWVRQA PGKGLEWVAT 50
 ISSGGRSTYY PDSVKGRTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYFCARLI 100
 STYWGQGTLY TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG CLVKDYFPEP 150
 VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVTVTPSSSL GTKTYTCNDV 200
 HKPSNTKVDK RVESEKYGPPC PPCPAPEFLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT 250
 PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTYRVSVSL 300
 TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPSSIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSQE 350
 EMTKNQVSLT CLVKGFPYSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL 400
 YSRLTVDKSR WQEGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSLG K 441

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DITMTQSPSS LSASVGDRTV ITCKASQDIN SYLTWFQKPK GKAPKILIYL 50
 VNRLVDGVPS RFGSGSGQD YALTISSLQP EDFATYYCLQ YDDFPYTFGQ 100
 GTKVEIKRTV AAPSVEIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEK 214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 141-197 255-315 361-419
 22"-96" 141"-197" 255"-315" 361"-419"

Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
 23"-88" 134"-194"

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 128-214' 128"-214"

Inter-H-H (h 8, h 11) 220-220" 223-223"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

291, 291"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados.

Electronic structure available on Mednet: <http://mednet.who.int/>

Structure électronique disponible sur Mednet: <http://mednet.who.int/>

Estructura electrónica disponible en Mednet: <http://mednet.who.int/>

* <http://www.who.int/medicines/services/inn/publication/en/>

**AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES
MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES**

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 64
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 64
Denominaciones Comunes internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 64
(WHO Drug Information, Vol. 24, No. 3, 2010)

p. 286 vonicogum alfa #

- vonicog alfa *replace the description and structure (corrected amino acids (A618 and H709) in bold) by the following ones, delete the molecular formula*
- vonicog alfa *remplacer la description et structure (acides aminés corrigés (A618 et H709) en gras) par les suivantes, supprimer la formule moléculaire brute*
- vonicog alfa *sustitúyase la descripción y la estructura (ácidos aminos corregidos (A618 y H709) en graso) por las siguientes, suprimáse la fórmula molecular*

[89-arginine]von Willebrand factor *Homo sapiens* (852Q>R variant), produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa

[89-arginine]facteur de von Willebrand *Homo sapiens* (variant 852Q>R), produit par des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa

[89-arginina]factor de von Willebrand *Homo sapiens* (variante 852Q>R), producido por las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicofoma alfa

SLSCRPPMVK	LVCAPADNLRA	EGLECTKTCQ	NYDLECMSMG	CVSGCLCPPG	50
MVRHENRCVA	LERPCPFHQG	KEYAPGETVK	IGCNTCVCRD	RKWNCTDHVC	100
DATCSTIGMA	HYLTFDGLKY	LFPGECQYVL	VQDYCGSNPG	TFRILVGNKG	150
CSHPSVKCKK	RVITILVEGGE	IELFDGEVNV	KRPMKDETHF	EVVESGRYII	200
LLLGKALSIV	WDRHLSISVV	LKQTYQEKVC	GLCGNFDGIQ	NNDLTSSNLQ	250
VEEDPVPDFGN	SWKVSSQCAD	TRKVPLDSSP	ATCHNNIMKQ	TMVDSSCRIL	300
TSDFVQDCNK	LVDPEPYLDV	CYDTCSCES	IGDCACFCDD	IAAYAHVCAQ	350
HGKVVWTWRTA	TLCQPSCEER	NLRENGYECE	WRYNSCAPAC	QVTCQHPEPL	400
ACPVQCVEGC	HAHCPPGKIL	DELLQTCVDP	EDCPVCEVAG	RRFASGKKVT	450
LNPSDFEHCQ	ICHCDVNVLT	CEACQEPGGL	VVPPDAPVPS	PTTLYVEDIS	500
EPPLHDFYCS	RLLDLVFLLD	GSSRLSEAEF	EVLFKAFVDM	MERLRISQKW	550
VRVAVVEYHD	GSAYIGLKD	RKRPSSELRI	ASQVKYAGSQ	VASTSEVLKY	600
TLFQIFSKID	RPEASRIALL	LMAEQEPQRM	SRNFVRYVQG	LKKKKVIVIP	650
VGIGPHANLK	QIRLIEKQAP	ENKAFVLSSV	DELEQQRDEI	VSYLCDLAPE	700
APPTTLPPHM	AQVTVGPGLL	GVSTLGPKNR	SMVLDVAFVL	EGSDKIGEAD	750
FNRSEKFMEE	VIQRMVDGQD	SIHVTVLQYS	YMTVEYPPFS	EAQSKGDILO	800
RVREIRYQGG	NRTNTGLALR	YLSDSHFVLS	QGDREQAPNL	VYMTGNPAS	850
DEIKRLPGDI	QVVPVIGVGN	ANVQELERIG	WPNAIILIQD	FETLPREAPD	900
LVLQRCCSGE	GLQIPTLSPA	PDCSQPLDVI	LLLDGSSSFP	ASYFDEMKSF	950
AKAFISKANI	GPRLTQVSVL	QYGSITITDV	PWNVVEPEAK	LLSLVDVMQR	1000
EGGPSQIGDA	LGFVAVRYLTS	EMHGARGPAS	KAVVILVTDV	SVDSVDAADA	1050
AARSNRVTVF	PIGIGDRYDA	AQLRILAGPA	GDSNVVKLQR	IEDLPTMTVL	1100
GNFSLHLKCS	GFVRICMDED	GNEKRPQDVW	TLDPQCHTVT	CQPDQGTLLK	1150
SHRVNCDRGL	RPSCPNQSP	VKVEETCCGR	WTCPCVCTGS	STRHIVTFDG	1200
QNFKLITGSCS	YVLFQNKEDQ	LEVILHNGAC	SPGARQGCCK	SIEVKFTACR	1250
VELHSDMEVT	VNGRLVSVPY	VGGNMEVNVY	GAIMHEVRFN	HLGHIFTFTF	1300
QWNEFQLQLS	PKTFASKTYG	LCGICDENG	NDFMLRDGTG	TTDWKTLVQE	1350
WTVQRPQGTQ	QPILEEQLV	PDSSHQCVLL	LPFLAECHKV	LAPATFYAIC	1400
QQDSCHQEQQ	CEVIASYAHL	CRTNQVGVDM	RTPDFCAMS	PPSLVYNHCE	1450
HGCPRHCDGN	VSSCGDHPSE	GCFPPDKVM	LEGSCVPEEA	CTQCIGEDGV	1500
QHGFLEAWVP	DHQPQCICITC	LSGRKVNCTT	QPCPTAKAPT	CGLCEVARLR	1550
QNADQCCPEY	ECVCDPVSCD	LPPVPHCERG	LQPTLTNPGE	CRPNFTCACR	1600
KEECKRRVSP	SCPPHRLPTL	RKTQCCDEYE	CACNCNVNST	SCPLGYLAST	1650
ATNDCCGTTT	TCLPDKVCVH	RSTIYPVPGF	WEEGCDVCTC	TDMEDAVMGL	1700
RVAQCSQKPC	EDSCRSFTY	VLHEGECGR	CLPSACEVVT	GSPRGDSQSS	1750
WKSVGQWAS	PENPCLINEC	VRVKEEVFIQ	QRNVSCPQLE	VPVCPGSGFL	1800
SKTSAACPCS	CRCEMEACM	LNGTVIGPGK	TVMIDVCTTC	RCMVQVGVIS	1850
GFKLECRKTT	CNPCLGYKE	ENNTGECCCR	CLPTACTIQL	RGGQIMTLKR	1900
DETLQDQCDT	HFCKVNERGE	YFWEKRVTCG	PPFDEHKCLA	EGGKIMKTPG	1950
TCDDTCEPE	CNDITARLQY	VKVGSCSKSEV	EVDIHYCQCK	CASKAMYSID	2000
INDVDQDQSC	CSPTRTEPMQ	VALHCTNGSV	VYHEVLNAME	CKCSPRKCSK	2050

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 72**Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 72****Denominaciones comunes internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 72***(WHO Drug Information, Vol. 28, No. 3, 2014)***p. 381 alpelisibum**

alpelisib

alpélisib

alpelisib

*replace the chemical name by the following one**remplacer le nom chimique par le suivant**sustitúyase el nombre químico por el siguiente**(2S)-N'-[4-methyl-5-[2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl]-1,3-thiazol-2-yl]pyrrolidine-1,2-dicarboxamide**(2S)-N'-[4-méthyl-5-[2-(1,1,1-trifluoro-2-méthylpropan-2-yl)pyridin-4-yl]-1,3-thiazol-2-yl]pyrrolidine-1,2-dicarboxamide**(2S)-N'-[4-metil-5-[2-(1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)piridin-4-il]-1,3-tiazol-2-il]pirrolidina-1,2-dicarboxamida***Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 78****Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 78****Denominaciones comunes internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 78***(WHO Drug Information, Vol. 31, No. 3, 2017)***p. 517 eltanexorum**

eltanexor

eltanexor

eltanexor

*replace the molecular formula by the following one**remplacer la formule moléculaire brute par la suivante**sustitúyase la fórmula molecular por la siguiente* $C_{17}H_{10}F_6N_6O$ **Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 79****Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 79****Denominaciones comunes internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 79***(WHO Drug Information, Vol. 32, No. 1, 2018)***p. 109 crenigacestatum**

crenigacestat

crénigacestat

crenigacestat

*replace the chemical name by the following one**remplacer le nom chimique par le suivant**sustitúyase el nombre químico por el siguiente**4,4,4-trifluoro-N'-[(2S)-1-[[[(7S)-5-(2-hydroxyethyl)-6-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrido[3,2-a][3]benzazepin-7-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]butanamide**4,4,4-trifluoro-N'-[(2S)-1-[[[(7S)-5-(2-hydroxyéthyl)-6-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrido[3,2-a][3]benzazépin-7-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]butanamide**4,4,4-trifluoro-N'-[(2S)-1-[[[(7S)-5-(2-hidroxietyl)-6-oxo-6,7-dihidro-5H-pirido[3,2-a][3]benzazepin-7-il]amino]-1-oxopropan-2-il]butanamida*

- p. 119 **estetrolum**
 estetrol
 estétrol
 estetrol
replace the molecular formula by the following one
remplacer la formule moléculaire brute par la suivante
sustitúyase la fórmula molecular por la siguiente
 $C_{18}H_{24}O_4$
- p. 179 **vecabrutinibum**
 vecabrutinib
 vécabrutinib
 vecabrutinib
replace the molecular formula by the following one
remplacer la formule moléculaire brute par la suivante
sustitúyase la fórmula molecular por la siguiente
 $C_{22}H_{24}ClF_4N_7O_2$

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 80**Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 80****Denominaciones comunes internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 80***(WHO Drug Information, Vol. 32, No. 3, 2018)*

- p. 429 **apraglutidum***
 apraglutide *replace the description and structure by the following ones*
 apraglutide *remplacer les description et structure par les suivantes*
 apraglutida *sustitúyase la descripción y la estructura por las siguientes*
- [Ala²>Gly, Met¹⁰>Ahx, Asn¹¹>D-Phe, Asn¹⁶>Leu]human glucagon-like peptide 2 (1-33)-peptide 33-amide:
 L-histidylglycyl-L-α-aspartylglycyl-L-seryl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-2-aminohexanoyl-D-phenylalanyl-L-threonyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-leucyl-L-alanyl-L-alanyl-L-arginyl-L-α-aspartyl-L-phenylalanyl-L-isoleucyl-L-asparaginyll-L-tryptophyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-glutaminyll-L-threonyl-L-lysyl-L-isoleucyl-L-threonyl-L-isoasparagine
- [Ala²>Gly, Met¹⁰>Ahx, Asn¹¹>D-Phe, Asn¹⁶>Leu]peptide semblable au glucagon 2 humain (1-33)-peptide 33-amide:
 L-histidylglycyl-L-α-aspartylglycyl-L-séryl-L-phénylalanyl-L-séryl-L-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-2-aminohexanoyl-D-phénylalanyl-L-thréonyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-leucyl-L-alanyl-L-alanyl-L-arginyl-L-α-aspartyl-L-phénylalanyl-L-isoleucyl-L-asparaginyll-L-tryptophyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-glutaminyll-L-thréonyl-L-lysyl-L-isoleucyl-L-thréonyl-L-isoasparagine
- [Ala²>Gly, Met¹⁰>Ahx, Asn¹¹>D-Phe, Asn¹⁶>Leu]péptido similar al glucagón 2 humano (1-33)-péptido 33-amida:
 L-histidilglicil-L-α-aspartilglicil-L-seril-L-fenilalanil-L-seril-L-α-aspartil-L-α-glutamil-L-2-aminohexanoil-D-fenilalanil-L-treonil-L-isoleucil-L-leucil-L-α-aspartil-L-leucil-L-leucil-L-alanil-L-alanil-L-arginil-L-α-aspartil-L-fenilalanil-L-isoleucil-L-asparaginil-L-triptofil-L-leucil-L-isoleucil-L-glutaminil-L-treonil-L-lisil-L-isoleucil-L-treonil-L-isoasparagina

H-His-Gly-Asp-Gly-Ser-Phe-Ser-Asp-Glu-Ahx-D-Phe-Thr-Ile-Leu-Asp-Leu-Leu-Ala-Ala-Arg-Asp-Phe-Ile-Asn-Trp-Leu-Ile-Gln-Thr-Lys-Ile-Thr-Asp-NH₂


p. 464 **lanraplenibum**

lanraplenib

lanraplénib

lanraplenib

replace the molecular formula by the following one
remplacer la formule moléculaire brute par la suivante
sustitúyase la fórmula molecular por la siguiente

p. 479 **pegcetacoplanum**

pegcetacoplan



pegcétacoplan

pegcetacoplán

replace the molecular formula and the structure by the following ones

remplacer la formule moléculaire et la structure par les suivantes

sustitúyase la fórmula molecular y la estructura por las siguientes



Procedure and Guiding Principles / Procédure et Directives / Procedimientos y principios generales

The text of the *Procedures for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* and *General Principles for Guidance in Devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* will be reproduced in proposed INN lists only.

Les textes de la *Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques* et des *Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux substances pharmaceutiques* seront publiés seulement dans les listes des DCI proposées.

El texto de los *Procedimientos de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas* y de los *Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas* aparece solamente en las listas de DCI propuestas.