

NLP for Healthcare - Survey

Hello! We are team N/A (Navya and Anshul)

You are invited to take part for our survey for our course project about how people understand short medical explanations. Participation is voluntary. The information you provide will be used **only** for the project and will be treated as confidential. No personally identifying information will be published or shared. Your responses will be anonymized for analysis. You may stop at any time. There are no expected risks from participating.

If you agree to participate, you will complete a short online survey where you will read 3 clinical statements in Hindi or Telugu, with three different short versions of it and rate each version for comprehensibility, fluency, and accuracy on a scale of 1–5. The survey should take ~5–15 minutes.

Comprehensibility: How easy it is to understand

Fluency: How natural it sounds

Accuracy: How close it is to the original text (in English)

* Indicates required question

1. I have read the information above, and I agree to participate. I understand that my data will be used only for educational/research purposes and all personal details will be kept entirely confidential. *

Tick all that apply.

☐ Yes

2. Full Name *

3. Roll Number *

4. Mother Tongue *

Mark only one oval.

☐ Telugu

☐ Hindi

5. Age *

Sentence 1

Rate each from 1 to 5 (1 being very bad and 5 being very good) on:

Comprehensibility: How easy it is to understand

Fluency: How natural it sounds

Accuracy: How close it is to the original text

After rating for comprehensibility and fluency, go to the next section to rate it for accuracy.

6. పడక పక్కన, రోగులు సాధారణ వస్తువులను దృష్టి, స్పర్శ లేదా మరొక ఇంద్రియం *
ద్వారా గుర్తించమని కోరతారు.
बिस्तर के पास, मरीजों को दृष्टि, स्पर्श या किसी अन्य इंद्रिय के माध्यम से सामान्य वस्तुओं की
पहचान करने के लिए कहा जाता है।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Comprehensibility	☐	☐	☐	☐	☐
Fluency	☐	☐	☐	☐	☐

7.

*

వైద్యులు వ్యక్తిని దృష్టి, స్పర్శ లేదా మరొక ఇంద్రియం ద్వారా సాధారణ
వస్తువులను గుర్తించమని అడుగుతారు.

डॉक्टर व्यक्ति को सामान्य वस्तुओं को दृष्टि, स्पर्श या किसी अन्य इंद्रिय से पहचानने के लिए
कहते हैं।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Comprehensibility	☐	☐	☐	☐	☐
Fluency	☐	☐	☐	☐	☐

8.

*

రోగులు విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలని కోరినప్పుడు, వారు వారికి సహాయం
చేయడానికి వారి కళ్ళు, చేతులు లేదా ఇతర శరీర భాగాలను ఉపయోగించవచ్చు.
जब मरीजों को चीजें याद रखने के लिए कहा जाता है, तो वे उनकी मदद के लिए अपनी आंखों,
हाथों या शरीर के अन्य अंगों का उपयोग कर सकते हैं।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Comprehensibility	☐	☐	☐	☐	☐
Fluency	☐	☐	☐	☐	☐

Sentence 1

Rate each from 1 to 5 (1 being very bad and 5 being very good) on:

Comprehensibility: How easy it is to understand

Fluency: How natural it sounds

Accuracy: How close it is to the original text

After rating for comprehensibility and fluency, go to the next section to rate it for accuracy.

9. At bedside, patients are asked to identify common objects through sight, touch, or another sense. *

పడక పక్కన, రోగులు సాధారణ వస్తువులను దృష్టి, స్పర్శ లేదా మరొక ఇంద్రియం ద్వారా గుర్తించమని కోరతారు.

बिस्तर के पास, मरीजों को दृष्टि, स्पर्श या किसी अन्य इंद्रिय के माध्यम से सामान्य वस्तुओं की पहचान करने के लिए कहा जाता है।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Accuracy	☐	☐	☐	☐	☐

10. *

At bedside, patients are asked to identify common objects through sight, touch, or another sense.

వైద్యులు వ్యక్తిని దృష్టి, స్పర్శ లేదా మరొక ఇంద్రియం ద్వారా సాధారణ వస్తువులను గుర్తించమని అడుగుతారు.

डॉक्टर व्यक्ति को सामान्य वस्तुओं को दृष्टि, स्पर्श या किसी अन्य इंद्रिय से पहचानने के लिए कहते हैं।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Accuracy	☐	☐	☐	☐	☐

11. At bedside, patients are asked to identify common objects through sight, touch, or another sense. *

రోగులు విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలని కోరినప్పుడు, వారు వారికి సహాయం చేయడానికి వారి కళ్ళు, చేతులు లేదా ఇతర శరీర భాగాలను ఉపయోగించవచ్చు. जब मरीजों को चीजें याद रखने के लिए कहा जाता है, तो वे उनकी मदद के लिए अपनी आंखों, हाथों या शरीर के अन्य अंगों का उपयोग कर सकते हैं।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Accuracy	☐	☐	☐	☐	☐

Sentence 2

Rate each from 1 to 5 (1 being very bad and 5 being very good) on:

Comprehensibility: How easy it is to understand

Fluency: How natural it sounds

Accuracy: How close it is to the original text

After rating for comprehensibility and fluency, go to the next section to rate it for accuracy.

12. రక్తహీనత, ఆర్థికరణ, సాధారణ స్థితి మరియు సాధ్యమయ్యే కాలేయ మెటాస్టేజ్‌లను అంచనా వేయడానికి CBC, ఎలక్ట్రోలైట్‌లు మరియు కాలేయ పనితీరు పరీక్షలతో సహా ప్రాథమిక రక్త పరీక్షలు చేయాలి. *
- एनीमिया, जलयोजन, सामान्य स्थिति और संभावित लिवर मेटास्टेस का आकलन करने के लिए सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स और लिवर फंक्शन टेस्ट सहित बुनियादी रक्त परीक्षण किए जाने चाहिए।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Comprehensibility	☐	☐	☐	☐	☐
Fluency	☐	☐	☐	☐	☐

13. పూర్తి రక్త గణన, ఎలక్ట్రోలైట్లు, కాలేయ రక్త పరీక్షలు మరియు కార్సిన్‌ఎంబ్రియోనిక్ యాంటిజెన్ స్థాయిలతో సహా ప్రాథమిక రక్త పరీక్షలు చేయబడతాయి. *
- संपूर्ण रक्त गणना, इलेक्ट्रोलाइट्स, यकृत रक्त परीक्षण और कार्सिनोएम्ब्रायोनिक एंटीजन स्तर सहित बुनियादी रक्त परीक्षण किए जाते हैं।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Comprehensibility	☐	☐	☐	☐	☐
Fluency	☐	☐	☐	☐	☐

14. మీ రక్తంలో సమస్య ఉందా, మీకు ఎంత ఉంది మరియు మీ శరీరంలో ఇంకా ఏమైనా జరుగుతోందా అని తనిఖీ చేయడానికి కొన్ని పరీక్షలు చేయండి.
यह जांचने के लिए कुछ परीक्षण करें कि क्या आपके रक्त में कोई समस्या है, कितना है, और क्या आपके शरीर में कुछ और भी चल रहा है।

*

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Comprehensibility	☐	☐	☐	☐	☐
Fluency	☐	☐	☐	☐	☐

Sentence 2

Rate each from 1 to 5 (1 being very bad and 5 being very good) on:

Comprehensibility: How easy it is to understand

Fluency: How natural it sounds

Accuracy: How close it is to the original text

After rating for comprehensibility and fluency, go to the next section to rate it for accuracy.

15. Basic blood tests, including CBC, electrolytes, and liver function tests, should be done to assess anemia, hydration, general condition, and possible liver metastases.

*

రక్తహీనత, ఆర్ధికరణ, సాధారణ స్థితి మరియు సాధ్యమయ్యే కాలేయ మెటాస్టేజీలను అంచనా వేయడానికి CBC, ఎలక్ట్రోలైట్లు మరియు కాలేయ పనితీరు పరీక్షలతో సహా ప్రాథమిక రక్త పరీక్షలు చేయాలి.

एनीमिया, जलयोजन, सामान्य स्थिति और संभावित लिवर मेटास्टेस का आकलन करने के लिए सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स और लिवर फंक्शन टेस्ट सहित बुनियादी रक्त परीक्षण किए जाने चाहिए।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Accuracy	☐	☐	☐	☐	☐

16. Basic blood tests, including CBC, electrolytes, and liver function tests, should be done to assess anemia, hydration, general condition, and possible liver metastases. *

పూర్తి రక్త గణన, ఎలక్ట్రోలైట్లు, కాలేయ రక్త పరీక్షలు మరియు కార్సిన్‌ఎంబ్రియోనిక్ యాంటిజెన్ స్థాయిలతో సహా ప్రాథమిక రక్త పరీక్షలు చేయబడతాయి.
संपूर्ण रक्त गणना, इलेक्ट्रोलाइट्स, यकृत रक्त परीक्षण और कार्सिनोएम्ब्रायोनिक एंटीजन स्तर सहित बुनियादी रक्त परीक्षण किए जाते हैं।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Accuracy	☐	☐	☐	☐	☐

17. Basic blood tests, including CBC, electrolytes, and liver function tests, should be done to assess anemia, hydration, general condition, and possible liver metastases. *

మీ రక్తంలో సమస్య ఉందా, మీకు ఎంత ఉంది మరియు మీ శరీరంలో ఇంకా ఏమైనా జరుగుతోందా అని తనిఖీ చేయడానికి కొన్ని పరీక్షలు చేయండి.
यह जांचने के लिए कुछ परीक्षण करें कि क्या आपके रक्त में कोई समस्या है, कितना है, और क्या आपके शरीर में कुछ और भी चल रहा है।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Accuracy	☐	☐	☐	☐	☐

Sentence 3

Rate each from 1 to 5 (1 being very bad and 5 being very good) on:

Comprehensibility: How easy it is to understand

Fluency: How natural it sounds

Accuracy: How close it is to the original text

After rating for comprehensibility and fluency, go to the next section to rate it for accuracy.

18. డ్రగ్స్, ముఖ్యంగా benzodiazepines మరియు anticholinergics (ఉదా, కొన్ని ట్రైసైక్లిక్ antidepressants, antihistamines, antipsychotics, benztropine), మితమైన మోతాదులో కూడా మద్యపానం వలె, చిత్తవైకల్యం యొక్క లక్షణాలను తాత్కాలికంగా కలిగించవచ్చు లేదా తీవ్రతరం చేయవచ్చు. దవాएं, విశేష రూపం benzodiazepines और anticholinergics (उदाहरण के लिए, कुछ ट्राइसाइक्लिक antidepressants, antihistamines, antipsychotics, benztropine), अस्थायी रूप से लक्षणों का कारण बन सकती हैं या बिगड़ सकती हैं dementia, शराब की तरह, मध्यम मात्रा में भी।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Comprehensibility	☐	☐	☐	☐	☐
Fluency	☐	☐	☐	☐	☐

19. అనేక మందులు తాత్కాలికంగా చిత్తవైకల్యం యొక్క లక్షణాలను కలిగించవచ్చు లేదా మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి. ఈ మందులలో కొన్ని ప్రెస్క్రిప్షన్ లేకుండా (కౌంటర్ ద్వారా) కొనుగోలు చేయవచ్చు. స్లీప్ ఎయిడ్స్ (అవి మత్తుమందులు), జలుబు నివారణలు, యాంటి యాంట్లైటి డ్రగ్స్ మరియు కొన్ని యాంటిడిప్రెసెంట్స్ సాధారణ ఉదాహరణలు. कई दवाएं अस्थायी रूप से मनोभ्रंश के लक्षण पैदा कर सकती हैं या उन्हें बदतर बना सकती हैं। इनमें से कुछ दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के (काउंटर पर) खरीदी जा सकती हैं। नींद में सहायक (जो शामक हैं), सर्दी के उपचार, चिंता-विरोधी दवाएं और कुछ अवसादरोधी दवाएं इसके सामान्य उदाहरण हैं।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Comprehensibility	☐	☐	☐	☐	☐
Fluency	☐	☐	☐	☐	☐

20. కొన్ని మందులు ముఖ్యంగా బెంజోడియాజిపైన్స్, యాంటికోలినెర్జిక్స్, ట్రైసైక్లిక్ యాంటిడిప్రెసెంట్స్, యాంటిహిస్టామైన్లు, యాంటిసైకోటిక్స్ మరియు బెంజోట్రోపిన్లను కలిగి ఉన్న చిత్తవైకల్యాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి లేదా మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి. ఆల్కహాల్, చిన్న మొత్తంలో కూడా చిత్తవైకల్యాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది.

कुछ दवाएँ मनोभ्रंश का कारण बन सकती हैं या उसे बदतर बना सकती हैं, विशेष रूप से वे जिनमें बेंजोडायजेपाइन, एंटीकोलिनर्जिक्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, एंटीहिस्टामाइन, एंटीसाइकोटिक्स और बेंज़ट्रोपिन शामिल हैं। शराब, यहां तक कि थोड़ी मात्रा में भी, मनोभ्रंश को बदतर बना सकती है।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Comprehensibility	☐	☐	☐	☐	☐
Fluency	☐	☐	☐	☐	☐

Sentence 3

Rate each from 1 to 5 (1 being very bad and 5 being very good) on:

Comprehensibility: How easy it is to understand

Fluency: How natural it sounds

Accuracy: How close it is to the original text

After rating for comprehensibility and fluency, go to the next section to rate it for accuracy.

21. Drugs, particularly benzodiazepines and anticholinergics (eg, some tricyclic antidepressants, antihistamines, antipsychotics, benztropine), may temporarily cause or worsen symptoms of dementia, as may alcohol, even in moderate amounts. *

డ్రగ్స్, ముఖ్యంగా benzodiazepines మరియు anticholinergics (ఉదా, కొన్ని ట్రైసైక్లిక్ antidepressants, antihistamines, antipsychotics, benztropine), మితమైన మోతాదులో కూడా మద్యపానం వలె, చిత్తవైకల్యం యొక్క లక్షణాలను తాత్కాలికంగా కలిగించవచ్చు లేదా తీవ్రతరం చేయవచ్చు.

दवाएं, विशेष रूप से benzodiazepines और anticholinergics (उदाहरण के लिए, कुछ ट्राइसाइक्लिक antidepressants, antihistamines, antipsychotics, benztropine), अस्थायी रूप से लक्षणों का कारण बन सकती हैं या बिगड़ सकती हैं dementia, शराब की तरह, मध्यम मात्रा में भी।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Accuracy	☐	☐	☐	☐	☐

22. Drugs, particularly benzodiazepines and anticholinergics (eg, some tricyclic antidepressants, antihistamines, antipsychotics, benztropine), may temporarily cause or worsen symptoms of dementia, as may alcohol, even in moderate amounts. *

అనేక మందులు తాత్కాలికంగా చిత్తవైకల్యం యొక్క లక్షణాలను కలిగించవచ్చు లేదా మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి. ఈ మందులలో కొన్ని ప్రీస్క్రిప్షన్ లేకుండా (కౌంటర్ ద్వారా) కొనుగోలు చేయవచ్చు. స్లీప్ ఎయిడ్స్ (అవి మత్తుమందులు), జలుబు నివారణలు, యాంటి యాంట్జీ డ్రగ్స్ మరియు కొన్ని యాంటీడిప్రెసెంట్స్ సాధారణ ఉదాహరణలు.

कई दवाएं अस्थायी रूप से मनोभ्रंश के लक्षण पैदा कर सकती हैं या उन्हें बदतर बना सकती हैं। इनमें से कुछ दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के (काउंटर पर) खरीदी जा सकती हैं। नींद में सहायक (जो शामक हैं), सर्दी के उपचार, चिंता-विरोधी दवाएं और कुछ अवसादरोधी दवाएं इसके सामान्य उदाहरण हैं।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Accuracy	☐	☐	☐	☐	☐

23. Drugs, particularly benzodiazepines and anticholinergics (eg, some tricyclic antidepressants, antihistamines, antipsychotics, benztropine), may temporarily cause or worsen symptoms of dementia, as may alcohol, even in moderate amounts. *

కొన్ని మందులు ముఖ్యంగా బెంజోడియాజిపైన్స్, యాంటికోలిన్బెర్టిక్స్, ట్రైసైక్లిక్ యాంటిడిప్రెసెంట్స్, యాంటిహిస్టామైన్లు, యాంటిపైకోటిక్స్ మరియు బెంజ్ ట్రోపిన్లను కలిగి ఉన్న చిత్తవైకల్యాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి లేదా మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి. ఆల్కహాల్, చిన్న మొత్తంలో కూడా చిత్తవైకల్యాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది.

कुछ दवाएँ मनोभ्रंश का कारण बन सकती हैं या उसे बदतर बना सकती हैं, विशेष रूप से वे जिनमें बेंजोडायजेपाइन, एंटीकोलिनर्जिक्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, एंटीहिस्टामाइन, एंटीसाइकोटिक्स और बेंज़ट्रोपिन शामिल हैं। शराब, यहां तक कि थोड़ी मात्रा में भी, मनोभ्रंश को बदतर बना सकती है।

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Accuracy	☐	☐	☐	☐	☐

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

