Dashboard Prevalensi Penyakit Ginjal Kronis

Ringkasan indikator berdasarkan usia, kadar glukosa darah acak (bgr), status diabetes melitus (dm), hemoglobin (hemo), dan klasifikasi CKD.
Sumber: dataset kidney_disease, 400 pasien.

Kelompok_usia | status_dm | status_hipertensi | klasifikasi_bersih | Record Count | Type to search


62.50% Prevalensi CKD (250 dari 400 pasien)

54.80% Pasien CKD dengan DM


10.65 Rata-rata hemo CKD (g/dL); non-CKD 15,2

175.42 Rata-rata bgr pasien CKD (mg/dL)


Komposisi Klasifikasi
Proporsi pasien CKD vs bukan CKD




Prevalensi CKD per kelompok usia
Jumlah pasien CKD dalam tiap kelompok usia




Prevalensi CKD menurut status DM
Jumlah pasien CKD pada DM vs non-DM




Distribusi hemoglobin
Jumlah pasien per rentang hemo (g/dL)



Prevalensi CKD menurut glukosa darah acak
Jumlah pasien CKD per kategori bgr (mg/dL)



Hubungan hemoglobin dan glukosa darah acak
Tiap titik adalah satu pasien; data kosong tidak ditampilkan



Ringkasan per klasifikasi
Rata-rata dan kelengkapan data

	klasifikasi_bersih	Record Count	age	bgr	hemo	pct_dm
1.	CKD	250	54.54	175.42	10.65	0.55
2.	Bukan CKD	150	46.52	107.72	15.19	0

1 - 2 / 2

Interpretasi Keseluruhan

Gambaran umum
Dari 400 pasien, 250 (62,5%) berklasifikasi CKD dan 150 bukan CKD.

Usia
Prevalensi CKD tertinggi ada pada kelompok 60 tahun ke atas (78,1%), disusul 40-59 tahun (57,5%). Prevalensi terendah ada pada kelompok 18-39 tahun (29,4%). Kelompok di bawah 18 tahun menunjukkan 84,2%, tetapi hanya 19 pasien sehingga angkanya kurang stabil untuk disimpulkan.

Diabetes melitus
Seluruh pasien DM (137 orang) berklasifikasi CKD (100%). Pada pasien non-DM, prevalensi CKD 43,3% (113 dari 261).

Glukosa darah acak (bgr)
Prevalensi CKD naik seiring kenaikan bgr: 41,5% pada <140 mg/dL, 93,0% pada 140-199 mg/dL, dan 100% pada 200 mg/dL ke atas.

Hemoglobin
Semua pasien dengan hemo <12 g/dL adalah CKD (147 orang). Porsi CKD menurun pada hemo yang lebih tinggi: 59,2% pada 12-14, 13,4% pada 14-16, dan 2,3% pada 16 g/dL ke atas.

Perbandingan rata-rata CKD vs bukan CKD
Usia: 54,5 vs 46,5 tahun. bgr: 175,4 vs 107,7 mg/dL. hemo: 10,6 vs 15,2 g/dL. Pasien dengan DM: 54,8% pada kelompok CKD, 0% pada kelompok bukan CKD.

Hubungan hemo dan bgr
Dari 312 pasien dengan data lengkap, korelasinya negatif dengan kekuatan lemah sampai sedang (-0,31). Titik CKD mengumpul di hemoglobin rendah dengan glukosa cenderung tinggi, sedangkan titik bukan CKD mengumpul di hemoglobin tinggi dengan glukosa rendah.

Kesimpulan
Usia lanjut, DM, bgr tinggi, dan hemoglobin rendah berasosiasi kuat dengan CKD pada data ini. Hemoglobin tampak paling jelas memisahkan kedua kelompok. Catatan batasan Hasil bersifat deskriptif untuk sampel dataset, bukan prevalensi populasi. Hubungan antarvariabel adalah asosiasi, bukan sebab-akibat. DM dan bgr saling terkait, jadi keduanya tidak bisa dibaca sebagai faktor yang berdiri sendiri. Data kosong tidak dihitung pada analisis terkait: usia 9, bgr 44, hemo 52, dan dm 2.