


Establecimiento: Boschetto.
Localidad: Angélica, Santa Fe.
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE 54

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
Este (0-20 cm)	430	1290	2795	3655	4300	4300
Oeste (0-20 cm)	420	1260	2730	3570	4200	4200



Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
Este (0-20 cm)	5	8	18
Este (20-40 cm)	8	12	28
Oeste (0-20 cm)	5	8	19
Oeste (20-40 cm)	9	12	29

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
Este (0-20 cm)	6.2	110
Este (20-40 cm)	6.3	112
Oeste (0-20 cm)	6.1	100
Oeste (20-40 cm)	6.4	82

Este (0-20 cm)


Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación regular. Se observa una adecuada humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Desarrollo adecuado de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



Este (20-40 cm)


Estructura estadística de Compuestos



Salinidad de origen diverso. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación significativa. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad regular, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa una variación del 5%, siendo mas alta en la muestra de 0-20 cm, además, se observa un proceso de humificación menor en la muestra de 20-40 siendo regular en esta zona y bueno en la zona entre 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 6%, lo cual no implica variaciones significativas. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan ligeramente debido a la lixiviación de los mismos; El pH y la conductividad eléctrica no varían de forma significativa.
- **Compactación:** Se observa un aumento notable de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación moderada en la mas profunda.

Oeste (0-20 cm)


Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Buen desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



Oeste (20-40 cm)


Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con adecuada relación mineral/orgánico. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa poca variación. En ambas muestras se observa una buena actividad, aunque es algo mayor en la muestra de 0-20 cm. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 6%, además, se observa un proceso de humificación menor en la muestra de 20-40 siendo regular en esta zona y bueno en la zona entre 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 8%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan casi en un 50% debido a la lixiviación de los mismos; El pH aumenta ligeramente (0.3 en su escala) en la profundidad de 20-40 cm, lo cual no implica inconvenientes; la conductividad eléctrica disminuyo ligeramente en la profundidad de 20-40 cm, lo que no implica cambios significativos en los valores medidos; este dato se encuentra en consonancia con la baja variación de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento notable de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación moderada en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa).


Establecimiento: Boschetto.
Localidad: Angélica, Santa Fe.
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE 58

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
Este (0-20 cm)	430	1290	2795	3655	4300	4300
Oeste (0-20 cm)	375	1125	2437,5	3187,5	3750	3750



Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
Este (0-20 cm)	6	9	20
Este (20-40 cm)	8	11	25
Oeste (0-20 cm)	6	8	19
Oeste (20-40 cm)	7	9	22

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
Este (0-20 cm)	6.3	92
Este (20-40 cm)	6.4	140
Oeste (0-20 cm)	6.5	70
Oeste (20-40 cm)	6.4	104

Este (0-20 cm)


Estructura estadística de Compuestos



Salinidad de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



Este (20-40 cm)


Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una regular humificación y mineralización de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable


Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación significativa. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad regular, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** No se observa una variación significativa en el porcentaje de materia orgánica, pero se observa que el proceso humificación se encuentra ralentizado en la profundidad de 20-40 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 2%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan ligeramente en la fracción mas profunda (20-40 cm); El pH no muestra variación significativa; la conductividad eléctrica es mayor en la muestra de 20-40, lo que se correlaciona con el leve aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento notable de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación moderada en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa).

Oeste (0-20 cm)


Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con adecuada relación mineral/orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



Oeste (20-40 cm)


Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación leve. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad regular, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es adecuada en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, aumenta el porcentaje de materia orgánica en un 5%, pero el proceso de humificación se encuentra ralentizado, siendo regular en esta zona y bueno en la zona entre 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales disminuye en un 5%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) varían de forma insignificante; El pH disminuye ligeramente (0,1 punto en su escala); la conductividad eléctrica aumenta levemente en la muestra tomada a mayor profundidad.
- **Compactación:** No se observa un cambio significativo en la compactación, siendo regular en ambas profundidades.