


Establecimiento: COLOMBERO

Localidad: Aurelia, Santa Fe



DATOS DE MUESTREO LOTE El Pino

MUESTRA	LOTE	N	P	K	pH	CE $\mu\text{S}/\text{cm}$	STD
M1	El Pino	14	15	93	6,23	128	64
M2	El Pino	13	13	91	6.76	50	25
M3	El Pino	16	19	97	6,22	204	102
M4	El Pino	11	9	86	5,9	120	60




Muestra 1

Estructura estadística de Compuestos



Relación orgánico mineral adecuada. Se observa mediana actividad biológica con procesos de humificación y mineralización de la materia orgánica. Buen intercambio gaseoso suelo-atmósfera.




Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	




Muestra 2

Estructura estadística de Compuestos





Buena relación orgánico mineral. Se observa mediana actividad biológica con procesos de humificación y mineralización de la materia orgánica. Buen intercambio gaseoso suelo-atmósfera.




Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	

Muestra 3

Estructura estadística de Compuestos



Buena relación orgánico mineral. Se observa mediana actividad biológica con procesos de humificación y mineralización de la materia orgánica. Buen intercambio gaseoso suelo-atmósfera.





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo

Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	




Muestra 4

Estructura estadística de Compuestos



Suelo deficiente. Bloqueo nutricional. La actividad biológica es menor en esta parte del lote. Con pH ácido que limita la disponibilidad de fósforo y molibdeno (Mo). La compactación es leve.



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo

Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	




El lote se encuentra trabajado al momento del análisis, el cultivo antecesor es soja. La estructura observada a partir de los 15 cm es de bloques subangulares con buena presencia de poros y raíces. Hay buena humedad en el perfil de suelo a partir de los 15 - 20 cm de profundidad. Presencia de gusanos blancos con densidad mayor a 1 por metro cuadrado.

Establecimiento: COLOMBERO

Localidad: Aurelia, Santa Fe



DATOS DE MUESTREO LOTE Vietto

MUESTRA	LOTE	N	P	K	pH	CE $\mu\text{S}/\text{cm}$	STD
M1	Vietto	15	18	98	6,24	120	60
M2	Vietto	20	31	108	6,14	184	92
M3	Vietto	14	15	93	6,2	96	48
M4	Vietto	13	12	91	6,28	60	30




Muestra 1

Estructura estadística de Compuestos




Actividad biológica moderada con buena relación orgánico-mineral.




Muestra 2

Estructura estadística de Compuestos




Actividad biológica moderada con buena relación orgánico-mineral.




Muestra 3

Estructura estadística de Compuestos




Bloqueo nutricional por residualidad química. Compactación moderada y deficiente intercambio gaseoso suelo- atmósfera.




Muestra 4

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo nutricional por residualidad química. Compactación moderada y deficiente intercambio gaseoso suelo- atmósfera.





El lote tiene un cultivo de trigo en fase fenológica Z3. Se observó a campo mayor compactación a medida que nos dirigimos hacia el sur, la capa compacta se hace cada vez mas superficial. El cultivo tiene una profundidad del sistema radicular aproximada de 15 cm, lo que es mayor al desarrollo aereo de las plantas. La estructura es en bloques angulares pero con buena presencia de poros y raíces (se observó incluso lombrices).