

Establecimiento: Leiggener Carlos.

Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.

Fecha: 07/01/2026



ANALISIS LOTES Múltiples

Denominación de las muestras:

M1: Juanita 0-20 cm

M2: Juanita 20-40 cm

M3: Brosolasco

M4: Caragliatto

M5: Cabaña

Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	M1	M2	M3	M4	M5
N (ppm)	11	7	18	28	40
P (ppm)	16	10	25	40	57
K (ppm)	37	24	58	92	131

Ph y Conductividad

MUESTRA	M1	M2	M3	M4	M5
pH	6.8	7.6	6.7	6.8	6.8
EC (µS/cm)	136	68	286	390	530


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Baja producción de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Mal	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable




M2 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Mal	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.



Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad baja. La emisión de CO₂ es buena en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 69%, además, el proceso de humificación disminuye, siendo deficiente en la muestra de 20-40 cm y bajo en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 78%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) disminuyen en un 37% ; El pH disminuye 0,4 puntos en su escala, siendo alcalino en ambas profundidades; la conductividad eléctrica disminuyo en un 34% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se correlaciona con la disminución de NPK.
- **Compactación:** No se observa un aumento significativo de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, en ambas profundidades se observa una compactación alta (aunque mayor en la muestra de 20-40). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.




M3

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación regular tendiendo a baja. Se observa una humificación regular (tendiendo a buena) de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Baja producción de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Mal
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M4

Estructura estadística de Compuestos




Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular tendiendo a bajo, hay compactación moderada. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Buen desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Mal
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular tendiendo a bajo, hay compactación moderada. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Desarrollo regular de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Mal
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

