

Establecimiento: Colombero Javier.

Localidad: Aurelia, Santa Fe.

Fecha: 07/01/2026



ANALISIS LOTE Lucero

Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	A	B
N (ppm)	11	18
P (ppm)	16	25
K (ppm)	37	59

Ph y Conductividad

MUESTRA	A	B
pH	6.9	7.3
EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	131	120


Muestra A

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera baja, hay compactación moderada. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Desarrollo regular de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Mal
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable




Muestra B

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica Deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una deficiente humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Mal
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficitaria, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es buena en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 50%, además, el proceso de humificación disminuye, siendo bajo en la muestra de 20-40 cm y bueno en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 117%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 60% por la lixiviación de los mismos; El pH aumenta 0,4 puntos en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica disminuye en un 9% en la profundidad de 20-40 cm.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación moderada en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.