

Establecimiento: Chautemps Mario.

Localidad: Sa Pereira, Santa Fe.

Fecha: 11/05/2026.



ANALISIS LOTE Campo Milanese

Nutricionales básicos biodisponibles

MUESTRA	M 0-20	M 20-40
N (ppm)	21	48
P (ppm)	29	67
K (ppm)	67	153


Ph y Conductividad

MUESTRA	M 0-20	M 20-40
pH	7.4	8.4
EC (μS/cm)	170	610

En el analisis de cromatografias, los valores de analisis van de 0 a 5, siendo 0 el valor mas bajo y 5 el mas alto.
De los valores individuales de analisis se obtiene un valor promedio, indicativo del estado de agregacion del suelo

M 0-20

Estructura estadística de Compuestos





Calificación del suelo: 1,4.
Estado de conservación:
carente con potencial de
mejora.

Actividad biológica baja tendiendo a regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada tendiendo a regular. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biológica		1.7			
Humificación de la materia orgánica		1.4			
Mineralización de la materia orgánica		2			
Sustancias básicas esenciales	0.3				
Compactación		1.8			
Respiración		1.5			

M 20-40

Estructura estadística de Compuestos



Calificación del suelo: 0,3.
Estado de conservación:
deficiente con pH alcalino.

Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación moderada tendiendo a alta. Se observa una deficiencia de materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biológica	0.3				
Humificación de la materia orgánica	0.1				
Mineralización de la materia orgánica	0.1				
Sustancias básicas esenciales	0.1				
Compactación		1.3			
Respiración	0.1				

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad baja.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 64%, además, el proceso de humificación disminuye en gran medida, siendo deficiente en la muestra de 20-40 cm y bajo en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 57%. Además, el proceso de mineralización aumenta notablemente aumentando más la brecha entre este proceso y el de humificación. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan a más del doble; El pH aumenta 1 punto en su escala, alcanzando valores alcalinos; la conductividad eléctrica aumentó en un 260% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se correlaciona con el aumento de NPK.
- **Compactación:** Se observa un ligero aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, se observa una compactación moderada en ambas muestras, pero en la muestra de 20-40 cm tiende al aumento. Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

ANALISIS LOTE Campo Taparo

Nutricionales básicos biodisponibles

MUESTRA	M 0-20	M 20-40
N (ppm)	6	12
P (ppm)	9	16
K (ppm)	21	38


Ph y Conductividad

MUESTRA	M 0-20	M 20-40
pH	6.6	6.8
EC (μS/cm)	42	48

En el analisis de cromatografias, los valores de analisis van de 0 a 5, siendo 0 el valor mas bajo y 5 el mas alto.
De los valores individuales de analisis se obtiene un valor promedio, indicativo del estado de agregacion del suelo

M 0-20

Estructura estadística de Compuestos




Calificación del suelo: 2,4.
Estado de conservación:
regular con potencial de
mejora.

Actividad biológica buena tendiendo a regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular tendiendo a moderada. Se observa una humificación regular de la materia orgánica (tendiendo a buena), con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biológica				3	
Humificación de la materia orgánica			2.8		
Mineralización de la materia orgánica			2.5		
Sustancias básicas esenciales		1.7			
Compactación			2		
Respiración			2.6		

M 20-40

Estructura estadística de Compuestos



Calificación del suelo: 0,9.
Estado de conservación:
deficiente con potencial
de mejora.

Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación moderada. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biológica		1.2			
Humificación de la materia orgánica	1				
Mineralización de la materia orgánica	0.5				
Sustancias básicas esenciales	0.3				
Compactación		2			
Respiración	0.8				

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 56%, además, el proceso de humificación disminuye en gran medida, siendo deficiente en la muestra de 20-40 cm y regular tendiendo a bueno en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 170%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan al doble; El pH aumenta 0,2 puntos en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumentó ligeramente en la profundidad de 20-40 cm.
- **Compactación:** Se observa un ligero aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación moderada en la mas profunda. Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.