

Establecimiento: Beltramino.

Localidad: .


Fecha: 31/10/2025



ANALISIS LOTE Unico

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	449,2	1347,6	2919,8	3818,2	4492	4492



Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	13	19	43
M1 (20-40 cm)	30	42	97

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.0	274
M1 (20-40 cm)	6.9	614


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica (tendiendo a regular), con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica regular tendiendo a baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad regular, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es regular en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 251%, además, el proceso de humificación disminuye, siendo bajo en la muestra de 20-40 cm y bueno en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 117%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 130% debido a la lixiviación de los mismos; El pH aumenta 0,9 puntos en su escala; la conductividad eléctrica aumento un 125% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se correlaciona con el aumento de NPK.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

Establecimiento: Alberto.

Localidad: .


Fecha: 31/10/2025



ANALISIS LOTE Norte

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	500	1500	3250	4250	5000	5000
M1 (total)	383,5	1150,5	2492,75	3259,75	3835	3835



Nutricionales básicos biodisponibles


MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	11	15	36
M1 (20-40 cm)	38	53	121
M1 (total)	9	13	30

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.9	228
M1 (20-40 cm)	6.3	762
M1 (total)	6.4	193


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación baja. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.


Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 1783%, además, el proceso de humificación disminuye en gran medida, siendo deficiente en la muestra de 20-40 cm y bueno en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 668%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 240% debido a la lixiviación de los mismos; El pH aumenta ligeramente (0,4 puntos en su escala), manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumentó un 230% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se corresponde con el aumento de NPK biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un gran aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.


M1 (total)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno (tendiendo a regular), hay compactación baja tendiendo a regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



Establecimiento: Alberto.

Localidad: .


Fecha: 31/10/2025



ANALISIS LOTE Sur

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	500	1500	3250	4250	5000	5000
M1 (total)	500	1500	3250	4250	5000	5000



Nutricionales básicos biodisponibles


MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	8	11	26
M1 (20-40 cm)	52	72	116
M1 (total)	6	9	21

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.7	169
M1 (20-40 cm)	5.4	1043
M1 (total)	6.3	135


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación baja. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. pH ácido. Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es óptima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 1881%, además se observa un proceso de humificación deficiente en la muestra de 20-40 cm, mientras que en la muestra de 0-20 cm el proceso de humificación es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta al doble. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan un 795% (446% para el K) debido a la lixiviación de los mismos; El pH disminuye ligeramente (0,3 en su escala) hasta un valor inadecuado en la profundidad de 20-40 cm, reduciendo la biodisponibilidad de nutricionales básicos; la conductividad eléctrica aumento en un 600%, lo que se corresponde con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un gran aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.


M1 (total)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación baja tendiendo a regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



Establecimiento: Talita.

Localidad: .


Fecha: 31/10/2025



ANALISIS LOTE Casita 1

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	328,1	984,3	2132,65	2788,85	3281	3281



Nutricionales básicos biodisponibles


MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	6	9	21
M1 (20-40 cm)	16	23	52

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.1	135
M1 (20-40 cm)	5.8	332


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena tendiendo a regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado tendiendo a regular, hay compactación baja. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es buena en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 1624%, además, el proceso de humificación es deficiente en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es regular.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 463%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 150% debido a la lixiviación de los mismos; El pH disminuye 0.3 puntos en su escala en la mayor profundidad, manteniéndose en un rango adecuado; la conductividad eléctrica aumento en un 145% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles en proporción similar.
- **Compactación:** Se observa un gran aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



Establecimiento: Toibero.

Localidad: .


Fecha: 31/10/2025



ANALISIS LOTE 3 y 4

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	500	1500	3250	4250	5000	5000



Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	7	10	24
M1 (20-40 cm)	26	36	82

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.3	154
M1 (20-40 cm)	6.3	522


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica regular tendiendo a buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad regular. La emisión de CO₂ es regular en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 1028%, además, el proceso de humificación es deficiente en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es regular.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 89%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 250% debido a la lixiviación de los mismos; El pH se mantiene constante y en un valor adecuado; la conductividad eléctrica aumenta en un 240% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



Establecimiento: Levrino.

Localidad: .


Fecha: 31/10/2025



ANALISIS LOTE Campo Ravasio

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	299,3	897,9	1945,45	2544,05	2993	2993



Nutricionales básicos biodisponibles


MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	50	71	162

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.9	1016


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada tendiendo a alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica (tendiendo a deficiente), con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



Establecimiento: Levrino.

Localidad: .


Fecha: 31/10/2025



ANALISIS LOTE Guachera Imhoff

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	463,9	1391,7	3015,35	3943,15	4639	4639



Nutricionales básicos biodisponibles


MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	40	56	129
M1 (20-40 cm)	55	77	177

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.3	812
M1 (20-40 cm)	9.5	1112


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. pH alcalino. Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación leve. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad baja. La emisión de CO₂ es deficiente en la zona mas superficial (el valor registrado en la tabla de CO₂ es producto de una alta mineralización, mas no debido a la actividad biológica), mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 337%, además, el proceso de humificación es deficiente en ambas profundidades.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 18%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 37% con respecto a la fracción mas superficial; El pH aumenta en gran medida (3.2 puntos en su escala), alcanzando un valor muy alarmante en la muestra de 20-40 cm y bloqueando la biodisponibilidad de los nutricionales básicos; la conductividad eléctrica aumenta en un 37% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** No se observa una variación de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, siendo alta en ambas profundidades y bloqueando la biodisponibilidad de los nutrientes.

Establecimiento: Angel 6.


Localidad: .

Fecha: 31/10/2025

ANALISIS LOTE Mitad Este

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	310,1	930,3	2015,65	2635,85	3101	3101



Nutricionales básicos biodisponibles


MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	29	41	95
M1 (20-40 cm)	61	86	197

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.3	594
M1 (20-40 cm)	7.9	1236


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. pH alcalino. Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** No se observa variación. En ambas muestras se observa actividad biológica deficiente. La emisión de CO₂ es deficiente (el valor observado de CO₂ se corresponde al proceso de mineralización, no a actividad biológica) en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica 356%, además, el proceso de humificación es deficiente en ambas profundidades.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 20%. Teniendo en cuenta: los nutrientes básicos biodisponibles (NPK) aumentan al doble con respecto a la fracción mas superficial; El pH aumenta 1.6 puntos en su escala en la mayor profundidad, alcanzando un valor alarmante y reduciendo la disponibilidad de nutrientes básicos; la conductividad eléctrica aumenta al doble, lo que se correlaciona con el aumento de nutrientes básicos biodisponibles.
- **Compactación:** No se observa una variación de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, siendo alta en ambas profundidades y bloqueando la biodisponibilidad de los nutrientes.

Establecimiento: Angel 6.


Localidad: .

Fecha: 31/10/2025

ANALISIS LOTE Mitad Oeste

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	500	1500	3250	4250	5000	5000



Nutricionales básicos biodisponibles


MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	55	77	177
M1 (20-40 cm)	69	97	223

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.5	1109
M1 (20-40 cm)	9.5	1383


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. pH alcalino. Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** No se observa variación. En ambas muestras se observa actividad biológica deficiente. La emisión de CO₂ es deficiente (el valor observado de CO₂ se corresponde al elevado proceso de mineralización, no a actividad biológica) en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 136%, además, el proceso de humificación es deficiente en ambas profundidades.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 15%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 26% con respecto a la fracción mas superficial; El pH aumenta de en gran medida en la mayor profundidad, siendo su valor alarmante en ambas profundidades y reduciendo la disponibilidad de nutricionales básicos (ya que varia de un extremo al otro); la conductividad eléctrica aumenta en un 25%, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** No se observa una variación de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, siendo alta en ambas profundidades y bloqueando la biodisponibilidad de los nutrientes.

Establecimiento: El Tala.

Localidad: .


Fecha: 31/10/2025



ANALISIS LOTE 11

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	410,4	1231,2	2667,6	3488,4	4104	4104



Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	6	8	19
M1 (20-40 cm)	15	21	49

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.3	123
M1 (20-40 cm)	6.6	311


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad regular. La emisión de CO₂ es baja en la zona mas superficial (el valor observado de CO₂ se corresponde al elevado proceso de mineralización, no a actividad biológica), mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 1480%, además, el proceso de humificación es deficiente en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es regular.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 263%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 150%; El pH aumenta ligeramente 0,3 puntos en su escala en la mayor profundidad; la conductividad eléctrica aumenta ligeramente, en un 150%, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación moderada en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

