

Establecimiento: Vatano Racolto.

Localidad: .


Fecha: 20/11/2025



ANALISIS LOTE Unico

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	380,2	1140,6	2471,3	3231,7	3802	3802
M1 (total)	247,3	741,9	1607,45	2102,05	2473	2473



Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	12	17	40
M1 (20-40 cm)	9	12	29
M1 (total)	7	10	22

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.4	250
M1 (20-40 cm)	6.1	201
M1 (total)	6.3	143


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación baja tendiendo a regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
■	Deficiente
■	Bajo
■	Regular
■	Bueno
■	Excelente
Índice de Compactación	
■	Alta
■	Moderada
■	Regular
■	Baja
■	Nula





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
■	Deficiente
■	Bajo
■	Regular
■	Bueno
■	Excelente
Índice de Compactación	
■	Alta
■	Moderada
■	Regular
■	Baja
■	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es buena en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 186%, además, el proceso de humificación disminuye, siendo bajo en la muestra de 20-40 cm y bueno en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 432%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) disminuyen en un 70% ; El pH disminuye 0,3 puntos en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica disminuyo en un 80% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se correlaciona con la disminución de NPK.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.


M1 (total)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica (tendiendo a regular), con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



Establecimiento: Fabian Cabaslitto.

Localidad: .


Fecha: 20/11/2025



ANALISIS LOTE Carmen 10

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	397,5	1192,5	2583,75	3378,75	3975	3975



Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	6	9	21
M1 (20-40 cm)	19	27	62

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.3	135
M1 (20-40 cm)	6.2	394


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica regular tendiendo a buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular tendiendo a bueno, hay compactación baja. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.


Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad regular. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 120%, además, el proceso de humificación disminuye, siendo deficiente en la muestra de 20-40 cm y bajo en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 91%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 200% debido a la lixiviación de los mismos; El pH disminuye ligeramente 0,1 punto en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumentó un 190% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se corresponde con el aumento de NPK biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un gran aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

ANALISIS LOTE Carmen 15

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO ₂ en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	318,1	954,3	2067,65	2703,85	3181	3781



Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	20	29	66
M1 (20-40 cm)	48	68	155

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.5	415
M1 (20-40 cm)	6.7	978


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica regular tendiendo a buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.


Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad regular. La emisión de CO₂ es regular en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 385%, además se observa un proceso de humificación deficiente en la muestra de 20-40 cm, mientras que en la muestra de 0-20 cm el proceso de humificación es regular.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 122%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 135% debido a la lixiviación de los mismos; El pH aumenta ligeramente 0,2 en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumento en un 135%, lo que se corresponde con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un gran aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

ANALISIS LOTE Carmen 27

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO ₂ en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	432,5	1297,5	2811,25	3676,25	4325	4325



Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	6	9	22
M1 (20-40 cm)	15	21	50

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.2	139
M1 (20-40 cm)	6.1	314


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno tendiendo a regular, hay compactación regular tendiendo a baja. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:


- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es buena en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 153%, además, el proceso de humificación es deficiente en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 197%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 140% debido a la lixiviación de los mismos; El pH disminuye ligeramente en 0.1 punto en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumento en un 125% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles en proporción similar.
- **Compactación:** Se observa un gran aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



ANALISIS LOTE Campo Curva

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO ₂ en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	500	1500	3250	4250	5000	5000



Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	27	38	88
M1 (20-40 cm)	43	61	140

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.1	554
M1 (20-40 cm)	6.2	880


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo tendiendo a deficiente, hay compactación moderada tendiendo a alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.


Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación mínima. En ambas muestras se observa una actividad baja. La emisión de CO₂ es baja en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 530%, el proceso de humificación es deficiente en ambas muestras, pero menor en la muestra de 20-40 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 33%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 60% debido a la lixiviación de los mismos; El pH aumenta ligeramente 0.1 punto en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumenta en un 58% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un ligero aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación moderada en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

ANALISIS LOTE Campo Rodriguez

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO ₂ en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	500	1500	3250	4250	5000	5000



Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	11	16	36
M1 (20-40 cm)	20	28	65

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.1	235
M1 (20-40 cm)	6.2	410


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación baja tendiendo a regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es buena en la zona mas superficial (el valor registrado en la tabla de CO₂ es producto de una alta mineralización, mas no debido a la actividad biológica), mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 401%, además, el proceso de humificación es deficiente en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 506%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 80% con respecto a la fracción mas superficial; El pH aumenta ligeramente 0.1 puntos en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumenta en un 74% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles en proporción similar.
- **Compactación:** Se observa un gran aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

