

Establecimiento: Quiroz Luis.

Localidad: Pilar, Santa Fe.

Fecha: 31/10/2025



ANALISIS LOTE Campo Vialidad

Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	24	34	78
M1 (20-40 cm)	36	51	116

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
M1 (0-20 cm)	7.8	486
M1 (20-40 cm)	8.6	731


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



pH alcalino. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



pH alcalino. Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad regular. La emisión de CO₂ es regular en la zona mas superficial (mayormente debida al pH alcalino y no a la actividad biológica en si), mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** No se observa variación significativa, pero el proceso de humificación disminuye, siendo deficiente en la muestra de 20-40 cm y bajo en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** No se observa variación significativa en el porcentaje de esta fracción. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 50% debido a la lixiviación de los mismos; El pH aumenta 0,8 puntos en su escala, presentando valores que bloquean la biodisponibilidad de los nutricionales básicos en ambas profundidades, siendo mayor el bloqueo en la muestra de 20-40 cm; la conductividad eléctrica aumento un 50% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se correlaciona con el aumento de NPK.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación moderada en la mas profunda. Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

ANALISIS LOTE Chenin Levrino

Nutricionales básicos biodisponibles


MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	6	9	22
M1 (20-40 cm)	47	66	153

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μ S/cm)
M1 (0-20 cm)	6.9	139
M1 (20-40 cm)	7.9	960


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica adecuada. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación regular. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.




M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



pH alcalino. Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad adecuada. La emisión de CO₂ es adecuada en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica de forma despreciable, pero se observa un bajo proceso de humificación en la muestra de 20-40 cm, mientras que en la muestra de 0-20 cm el proceso de humificación es regular.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 3%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 700% debido a la lixiviación de los mismos; El pH aumenta 1 punto en su escala, presentando valores que bloquean la biodisponibilidad de los nutricionales básicos en la muestra de 20-40 cm; la conductividad eléctrica aumentó un 700% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se corresponde con el aumento de NPK biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento notable de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



ANALISIS LOTE Chenin Levrino Norte

Nutricionales básicos biodisponibles


MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	27	38	87

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μ S/cm)
M1 (0-20 cm)	6.6	550


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



Establecimiento: Quiroz Luis.

Localidad: Aurelia Sud.

Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE Cañada, Espartillo

Nutricionales básicos biodisponibles


MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	63	89	204

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μ S/cm)
M1 (0-20 cm)	6.9	1272


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



ANALISIS LOTE Cañada, Norte

Nutricionales básicos biodisponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	45	63	146

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
M1 (0-20 cm)	6.9	911


M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

