

Establecimiento: Chautemps Mario.

Localidad: Sa Pereira, Santa Fe.

Fecha: 16/06/2026.

ANALISIS LOTE Campo Buffa

Nutricionales básicos biodisponibles

MUESTRA	M 0-20	M 20-40
N (ppm)	6 	16 
P (ppm)	9 	23 
K (ppm)	21 	53 

Referencias Nutricionales basicos	
	Muy bajo
	Bajo
	Medio
	Adecuado
	Alto

Biodisponibilidad del potasio (K): su disponibilidad depende de varios factores que intervienen en su liberación, los valores bajos están relacionados a deficiencias en esos factores y no precisamente a una ausencia en el suelo.


Ph y Conductividad

MUESTRA	M 0-20	M 20-40
pH	5.4	5.2
EC (µS/cm)	136	340

En el analisis de cromatografias, los valores de analisis van de 0 a 5, siendo 0 el valor mas bajo y 5 el mas alto.
De los valores individuales de analisis se obtiene un valor promedio, indicativo del estado de agregacion del suelo

M 0-20

Estructura estadística de Compuestos

**Calificación del suelo:** 1,9.

Estado de conservación: carente con toxicidad química. pH ácido.



Dosis recomendada: 120 gr/ha Humi-k Gel.

Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biológica			2.6		
Humificación de la materia orgánica			2.5		
Mineralización de la materia orgánica			2.2		
Sustancias básicas esenciales		1			
Compactación		1.5			
Respiración		1.5			

M 20-40

Estructura estadística de Compuestos

**Calificación del suelo:** 0,4.

Estado de conservación: carente con toxicidad por sales. pH ácido.

Dosis recomendada: 120 gr/ha Humi-k Gel.

Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biológica	0.4				
Humificación de la materia orgánica	0.2				
Mineralización de la materia orgánica	0.2				
Sustancias básicas esenciales	0.4				
Compactación	0.7				
Respiración	0.3				

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad regular.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 41%, además, el proceso de humificación disminuye en gran medida, siendo deficiente en la muestra de 20-40 cm y regular en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 96%. Además, el proceso de mineralización aumenta notablemente aumentando más la brecha entre este proceso y el de humificación. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 160%; El pH disminuye 0.2 puntos en su escala, siendo acido en ambas profundides; la conductividad eléctrica aumentó en un 150% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se correlaciona con el aumento de NPK.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación moderada en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.